

2024 湖北省《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题王牌题库及参考答案 (A 卷)

第 I 部分 单选题 (100 题)

1. 二巯丙醇用于解救的是 ()

- A: 有机磷中毒
- B: 氰化物中毒
- C: 汞中毒
- D: 三唑仑中毒

答案: C

2. 简化治疗方案是提高患者依从性的有效方法，以下方案中最符合此原则的是

- A: 少用药的方案
- B: 使用半衰期较长的药物或缓、控释制剂，每日 1 次给药
- C: 短疗程的方案
- D: 注射给药方案

答案: B

3. 大多数慢性汞中毒患者中毒的主要原因是 ()

- A: 被投毒
- B: 饮食
- C: 环境污染
- D: 长期吸入汞蒸气

答案: D

4. 美国食品药品监督管理局 (FDA) 根据药物对胎儿的危害将妊娠用药分为 A、B、C、D、X 五个级别，并要求制药企业应在药品说明书上标明等级。A~X 级致畸系数递增。有些药物有两个不同的危险度等级，一个是常用剂量的等级，另一个是超常剂量等级。

A: 氯霉素

B: 红霉素

C: 链霉素

D: 青霉素

答案: C

5. 给药时间、给药途径或剂型错误，归属于

A: 患者经济拮据

B: 管理缺失

C: 产品缺陷

D: 操作失误

答案: D

6. 患者, 女, 49 岁, 近日因发热、咳嗽、咳黄痰就诊, 临床诊断为下呼吸道细菌性感染, 处方如下:

A: 维生素 C 片

B: 氨溴索片

C: 阿司匹林泡腾片

D: 左氧氟沙星片

答案: C

7. (2019 年真题) 可使乳儿出现易激惹、尖叫、惊厥等神经系统症状, 哺乳期妇女不宜选用的药物是

- A: 依那普利
- B: 链霉素
- C: 氯霉素
- D: 左炔诺孕酮

答案：D

8. 临床用药实践表明，人类正常饮食中的一些品种将影响某些药物的药理作用。酒是人类饮食中对药物疗效影响最大的品种。酒的主要成分为乙醇，饮用后人体先是兴奋，随之其对中枢神经产生抑制作用，并扩张血管，刺激或抑制肝药酶代谢系统；另外，有些药也可延迟酒的代谢和分解。总体上，药与酒的相互作用结果有两个：一是降低药效；二是增加不良反应发生率。

- A: 依替米星
- B: 呋喃唑酮
- C: 克林霉素
- D: 庆大霉素

答案：B

9. 黏膜保护剂

- A: 铝碳酸镁
- B: 埃索美拉唑
- C: 法莫替丁
- D: 多潘立酮

答案：A

10. 《国家非处方药目录》收录的缓泻药不包括

- A: 聚乙二醇粉剂
- B: 硫酸镁

C: 替加色罗

D: 比沙可啶

答案: C

11. 常用于碱化尿液，促进毒性药物排泄的是

A: 苯巴比妥

B: 麻黄碱

C: 磺胺醋酰

D: 碳酸氢钠

答案: D

12. 中国药学会医院药专业委员会推荐的国内药历格式不包括

A: 用药记录

B: 正文

C: 基本情况

D: 病历摘要

答案: B

13. 患者通过电话、网络或信件询问是

A: 质问方式

B: 被动方式

C: 指令方式

D: 主动方式

答案: B

14. 作为预防用药错误策略，制定新药新知识培训制度，归属于

A: 人员知识培训

B: 科学发展

C: 管理规范到位

D: 环境与流程的优化与持续改进

答案：A

15. 患者，女，40 岁，既往有风湿性心脏病病史，近 2 年来出现劳累性呼吸困难，1 天前因受凉出现发热、咳嗽，咳粉红色泡沫样痰，不能平卧。查体：半卧位，口唇发绀，两肺大量水泡音及哮鸣音。

A: 急性左心衰竭

B: 急性心肌炎

C: 支气管哮喘

D: 大叶性肺炎

答案：A

16. 药物不良反应报告的描述项目

A: 患者疾病发病时间

B: 采取措施干预不良反应的时间

C: 患者用药记录

D: 药品不良反应动态变化的相关症状体征、检查及干预措施结果

答案：D

17. 急性肾小球肾炎时，尿中可见()。

A: 血红蛋白尿

B: 红细胞管型

C: 白细胞管型

D: 乳糜尿

答案：B

18. 缺铁性贫血、肾性贫血可呈现

- A: 淋巴细胞增多
- B: 白细胞增多
- C: 红细胞计数减少
- D: 血小板减少

答案：C

19. 有关汞中毒的解救措施，错误的是

- A: 可以用二巯丙醇驱汞，并应酸化尿液以促进排泄
- B: 可以用二巯丙磺钠驱汞
- C: 口腔出现炎症时，可以用 2% 碳酸氢钠或氯己定含漱
- D: 可以用青霉胺驱汞

答案：A

20. 为氧化剂，不能用于乐果中毒的洗胃液是

- A: 3% 鞣酸溶液
- B: 活性炭混悬液
- C: 1: 5000 高锰酸钾
- D: 淀粉溶液

答案：C

21. 以下维生素类药物中，可能导致尿液酸碱度降低的是

- A: 维生素 B
- B: 维生素 D
- C: 维生素 E
- D: 维生素 C

答案：D

22. 下列药物中使用前无需皮试的是

- A: 抑肽酶注射剂
- B: 紫杉醇注射剂
- C: 抗狂犬病病毒血清注射剂
- D: 苄星青霉素注射剂

答案：B

23. 严重肝功能减退者服用经肝、肾两种途径清除的药物时

- A: 须谨慎使用，必要时减量给药
- B: 避免使用
- C: 一般无需调整剂量
- D: 必须减量应用

答案：D

24. 患者，男，60 岁，身高 170cm，体重 85kg。既往有伴血浆同型半胱氨酸升高的高血压、糖尿病、高脂血症及心肌梗死病史。近日因夜间咳嗽并伴有粉红色泡沫样痰就诊。查体：心率 100 次 / 分、血压 160 / 100mmHg，血总胆固醇及三酰甘油均高于正常。诊断：伴血浆同型半胱氨酸升高的高血压、心力衰竭。

- A: 利尿剂
- B: ACEI 或者 ARB 和 β 受体阻断剂
- C: ACEI 与 ARB 联合应用
- D: 强心苷类和维拉帕米联合应用

答案：B

25. (2017 年真题) 下列关于抗抑郁药的合理应用与药学监护的说法，错误的是 ()

- A: 应尽可能单一用药，足量、足疗程治疗
- B: 当单药治疗无效时可考虑联合使用两种作用机制不同的抗抑郁药

C: 抗抑郁药起效较快，使用 1 周后可判疗效

D: 剂量递增尽可能采用最小有效剂量使不良反应减至最小

答案：C

26. 应用华法林抗凝治疗时，INR 的安全有效范围在我国通常为

A: 2.0~3.0

B: >3.0

C: 2.0~2.5

D: <2.0

答案：A

27. 易风化的药物是()。

A: 硝酸甘油

B: 硫酸镁

C: 胃蛋白酶

D: 青霉素

答案：B

28. 以下抗生素中，最适宜小儿使用的是

A: 氯霉素

B: 青霉素

C: 链霉素

D: 米诺环素

答案：B

29. 鲜血便主要见于（）

A: 霍乱

B: 小肠炎症

C: 慢性菌痢

D: 下消化道出血

答案: D

30. 尿酸减少提示

A: 肾小管重吸收障碍

B: 痛风

C: 肾功能不全

D: 核蛋白代谢增强

答案: C

31. 每日分泌量相近，清晨始升高，午后达高峰，凌晨跌低谷，是

A: 糖皮质激素的分泌

B: 肝脏合成胆固醇

C: 胃酸的分泌

D: 胰岛 B 细胞

答案: D

32. 含铁量高，服用后起效快的药品是

A: 富马酸亚铁

B: 硫酸亚铁

C: 葡萄糖酸亚铁

D: 乳酸亚铁

答案: A

33. 用于治疗前列腺增生症的高选择性 α_1A 受体阻断剂为

A: 坦索罗辛

B: 索利那新

C: 特拉唑嗪

D: 托特罗定

答案: A

34. (2019 年真题) 儿童退热的用药选择和单次用量，正确的是

A: 对乙酰氨基酚 25~50mg/kg

B: 阿司匹林 30~60mg/kg

C: 对乙酰氨基酚 10~15mg/kg

D: 布洛芬 0.4-0.6g (12 岁以上儿童)

答案: C

35. 下列选项中，关于老年人患病的叙述，错误的是()。

A: 机体适应能力低下，一旦发病，病情常迅速恶化

B: 患病时一般不容易出现意识障碍和精神症状

C: 常常是多系统同时发病或同一脏器、同一系统发生多种疾病

D: 自觉症状常较轻微，临床表现往往不典型

答案: B

36. 根据《药品召回管理办法》，药品召回的主体是

A: 药品经营企业

B: 药品研究机构

C: 药品监督管理部门

D: 药品生产企业

答案: D

37. 能促使体格强壮、肌肉发达、增强爆发力，并缩短体力恢复时间的兴奋剂

A: β -受体阻断剂

- B: 精神刺激剂
- C: 利尿剂
- D: 蛋白同化激素

答案：B

38. 硫酸镁用于救治中毒导泻，适宜

- A: 口服给药
- B: 肌肉注射
- C: 直肠给药
- D: 吸入给药

答案：A

39. 可用于治疗沙眼的处方药是

- A: 磺胺醋酰钠
- B: 硫酸锌
- C: 红霉素眼膏
- D: 酞丁安滴眼剂

答案：A

40. 主要用于丙烯腈、氟化物、一氧化碳等中毒的解毒剂是

- A: 盐酸烯丙吗啡
- B: 亚硝酸钠
- C: 谷胱甘肽
- D: 双解磷

答案：C

41. 用药错误 I 级（9 级）的标准

- A: 差错导致患者死亡

- B: 客观环境或条件可能引发差错
- C: 差错导致患者永久性伤害
- D: 发生差错但未发给患者，或已发给患者但未使用

答案：A

42. (2016 年真题) 服药期间饮酒，最容易出现肝损伤的药物是 ()。

- A: 伪麻黄碱
- B: 氯苯那敏
- C: 布洛芬
- D: 对乙酰氨基酚

答案：D

43. 第一类精神药品处方印刷用纸的颜色是

- A: 淡橙色
- B: 淡红色
- C: 淡绿色
- D: 淡黄色

答案：B

44. 高致吐性化疗药物所引起的恶心、呕吐，宜选用的止吐治疗方案是

- A: 化疗联合使用昂丹司琼和地塞米松，化疗结束后给予地塞米松或昂丹司琼
- B: 化疗前使用阿瑞吡坦，化疗后需要继续使用止吐药
- C: 化疗前使用昂丹司琼，化疗后不需要继续使用止吐药
- D: 化疗前联合使用昂丹司琼、地塞米松和阿瑞吡坦，化疗结束后给予阿瑞吡坦和地塞米松

答案：D

45. 无水乙醇 5ml 加入 10%葡萄糖注射液 100ml 中静滴，用于解救

- A: 氟乙酰胺中毒
- B: 氰化氢中毒
- C: 有机磷杀虫药中毒
- D: 瘦肉精中毒

答案：A

46. 患者，女，40 岁，既往有风湿性心脏病病史，近 2 年来出现劳累性呼吸困难，1 天前因受凉出现发热、咳嗽，咳粉红色泡沫样痰，不能平卧。查体：半卧位，口唇发绀，两肺大量水泡音及哮鸣音。

- A: 心房颤动
- B: 室性期前收缩
- C: 心室颤动
- D: 阵发性室上性心动过速

答案：A

47. 患儿，女，5 岁，误服香豆素灭鼠药，可选用的解救药物是（）

- A: 纳洛酮
- B: 亚甲蓝
- C: 维生素 K
- D: 二巯丙醇

答案：C

48. 下列药物中，患胸膜炎伴胸痛的咳嗽患者宜选用的药物是

- A: 苯丙哌林
- B: 可待因
- C: 喷托维林
- D: 羧甲司坦

答案：B

49. #NAME?

A: #NAME?

B: #NAME?

C: #NAME?

D: #NAME?

答案：D

50. 可确诊为甲状腺功能减退症的医学检查指标是

A: TSH 升高、TT4、FT4 降低

B: 三酰甘油、总胆固醇、低密度脂蛋白胆固醇增高，高密度脂蛋白胆固醇降低

C: TSH 降低，TT4、FT4 升高

D: TSH、TT4、FT4 升高

答案：A

51. 用于治疗厌食、脚气合并糙皮病，服用后尿液可能呈黄色的药品是

A: 复合维生素 B 片

B: 维生素 C 片

C: 维生素 AD 复方制剂

D: 维生素 A 片

答案：A

52. （2015 年真题）欲用 95%乙醇和蒸馏水配制 70%乙醇 1000ml，所取 95%乙醇体积约为（ ）。

A: 700ml

B: 737ml

C: 665ml

D: 500ml

答案：B

53. 易造成人体严重脱水、肾衰竭

A: 蛋白同化激素

B: 精神刺激剂

C: β -受体阻断剂

D: 利尿剂

答案：D

54. 患者，男，38 岁，身高 175cm，体重 70kg。3 日前自觉全身肌肉酸痛、头疼，轻微咳嗽，自服抗感冒药物效果不佳，近 1 日觉畏寒，发热，体温 37.7℃，遂来本院就诊。检查结果：患者神清，查咽喉部红肿，扁桃腺（-），双肺呼吸音清，心脏听诊无异常，腹检无异常。血象 WBC 正常，其他正常。诊断为：上呼吸道感染（感冒）。

A: 密切接触会有传播普通感冒的可能

B: 手卫生是预防上呼吸道感染的最有效的方式

C: 感冒一般为自限性，病程多在 1 周左右

D: 流感疫苗是最有效预防流感及其并发症的手段，需每五年接种一次

答案：D

55. 可导致男性乳房发育的降压药是

A: 氯沙坦

B: 螺内酯

C: 硝苯地平

D: 利血平

答案：B

56. 需与脂餐同服，以增加其口服吸收生物利用度的痤疮治疗药是

- A: 米诺环素
- B: 过氧化苯甲酰
- C: 口服短效避孕药
- D: 维 A 酸

答案：D

57. 甲氨蝶呤归属

- A: B 级
- B: X 级
- C: C 级
- D: D 级

答案：B

58. 某患者，女，27 岁，多汗、多食、消瘦、心悸、烦躁 3 个月。血 FT

- A: 白细胞
- B: 心率
- C: 体重
- D: 血压

答案：D

59. 冠状动脉粥样硬化性心脏病患者，如没有用药禁忌证，欲服用阿司匹林作为一线预防，最佳剂量范围是

- A: 25~50mg/d
- B: 75~150mg/d
- C: 150~300mg/d

D: 25~75mg/d

答案：B

60. 以高 TC 为主血症首选

A: 氟伐他汀

B: 非诺贝特

C: 阿昔莫司

D: 依折麦布

答案：A

61. 门诊处方一般不超过几日

A: 15 日常用量

B: 3 日常用量

C: 1 日常用量

D: 7 日常用量

答案：D

62. 患者，男，50 岁，身高 167cm，体重 85kg，痛风病史 6 年。近日因多饮、多尿就诊。实验室检查：空腹血糖 7.8mmol/L（正常值：3.9~6.1mmol/L），餐后血糖 14.8mmol/L；血尿酸 580 μmol/L（正常值：男性 180~440 μmol/L），低密度脂蛋白胆固醇 3.7mmol/L（正常值：2.1~3.1mmol/L），肌酐清除率 100ml/min。颈动脉彩超提示：动脉粥样硬化，有混合性脂质斑块。临床诊断为 2 型糖尿病、痛风、高脂血症、动脉粥样硬化症。

A: 控制体重

B: 适量运动

C: 低嘌呤饮食

D: 应用阿司匹林

答案：D

63. 可治疗原发性痛经的药物是

- A: 肾上腺糖皮质激素
- B: 前列腺素类似物
- C: 钙通道阻滞剂
- D: 非甾体抗炎药

答案：D

64. 为使药物作用与胆固醇合成高峰期同步，普伐他汀等适宜

- A: 餐后服用
- B: 清晨服用
- C: 餐前服用
- D: 睡前服用

答案：D

65. 痛风急性发作期选用的抗痛风药物

- A: 秋水仙碱
- B: 别嘌醇
- C: 阿司匹林
- D: 呋塞米

答案：A

66. 某男性患者，57 岁，既往高血压病史 10 年，与儿子吵架后突然起病，言语不清，左侧肢体无力，意识不清，查体：BP220/120mmHg，中度昏迷，瞳孔不等大，对光反射消失，强痛刺激，左侧肢体不活动，左侧巴宾斯基征阳性。

- A: 短暂性脑缺血发作

B: 缺血性脑卒中

C: 脑出血

D: 脑血栓形成

答案：C

67. 患者男,78 岁实施右侧髋关节置换术,术后第 10 日,患侧下肢出现肿胀、疼痛,诊断为深静脉血栓。该患者应选用的药物是 ()

A: 血凝酶

B: 依诺肝素

C: 氯吡格雷

D: 阿司匹林

答案：B

68. 高血压病的治疗原则中危患者 ()

A: 立即进行抢救治疗

B: 观察相当一段时间,再决定是否进行药物治疗

C: 先观察 (血压及危险因素) 数周,然后决定是否进行药物治疗

D: 立即使用抗高血压药物

答案：C

69. 下列药学服务的重要人群中,特殊人群是指

A: 药物治疗窗窄、需要做监测者

B: 应用特殊剂型者

C: 肝肾功能不全者

D: 需要重新选择药品或调整用药方案者

答案：C

70. 应用麻醉药利多卡因时宜

- A: 少食盐
- B: 不吸烟
- C: 不饮酒
- D: 少食醋

答案：B

71. 食管癌患者应用顺铂+氟尿嘧啶+多柔比星+依托泊苷属于

- A: 超适应证用药
- B: 超剂量用药
- C: 非适应证用药
- D: 过度治疗用药

答案：D

72. 穿孔（消化性溃疡并发症）

- A: 餐后加重的上腹胀痛，呕吐物有隔夜食物
- B: 突发上腹剧痛，继而至全腹
- C: 规律性上腹痛
- D: 疼痛性质改变，明显消瘦、贫血

答案：B

73. 两种药物配伍容易形成白色沉淀的是()

- A: 头孢唑林钠与 0.9%氯化钠注射液
- B: 胰岛素与 0.9%氯化钠注射液
- C: 头孢曲松与复方氯化钠注射液
- D: 青霉素与 5%葡萄糖注射液

答案：C

74. 万古霉素 0.5g 加入 5%葡萄糖注射液 100ml 中静脉滴注要求滴注时间不得少于 1h，已知每毫升 15 滴，每分钟最多可滴注的滴数约是()

- A: 50 滴
- B: 25 滴
- C: 7 滴
- D: 15 滴

答案：B

75. 抗高血压药物的禁忌证二至三度房室传导阻滞、严重支气管哮喘患者()

- A: 美托洛尔
- B: 氢氯噻嗪
- C: 依那普利
- D: 维拉帕米

答案：A

76. 下列药物中，即使肾功能不全的病人也可使用原剂量或略减少的是

- A: 庆大霉素
- B: 卡那霉素
- C: 多粘菌素
- D: 氨苄西林

答案：D

77. 溃疡性结肠炎活动期的生化检查标志是

- A: 血沉
- B: 白细胞计数降低
- C: 凝血酶原时间缩短
- D: 血红蛋白升高

答案：A

78. 苯二氮（卓）类中毒血压下降时可给予

- A: 间羟胺
- B: 有机硫类
- C: 地西洋
- D: 阿托品

答案：A

79. 可引起 A/G 比值 <1 的是

- A: 慢性肝炎、肝硬化、肝实质性损害
- B: 各种原因脱水所致的血液浓缩
- C: 自身免疫性疾病如风湿热、红斑狼疮等
- D: 摄入不足、消化不良时

答案：A

80. 影响胎儿甲状腺功能，导致死胎的药物是

- A: 维生素 A
- B: 氯霉素
- C: 维生素 D
- D: 丙硫氧嘧啶

答案：D

81. 上市后因出现局部缺血性结肠炎，并有死亡病例报道而导致撤市的药物是

- A: 阿洛司琼
- B: 利巴韦林
- C: 甲氨蝶呤

D: 阿昔洛韦

答案：A

82. 患者，男，62 岁，以“咳嗽、咳痰、胸闷、呼吸困难”为主诉就医，问诊“有吸烟史 30 年，2 年前从水泥厂退休”。肺功能检查 FEV1 占预计值 35%。诊断为慢性阻塞性肺疾。针对该患者，治疗方案应选择

A: 单一、规律使用沙丁胺醇气雾剂

B: 单一、规律使用布地奈德吸入粉雾剂

C: 单一、规律口服泼尼松片

D: 联合使用福莫特罗+倍氯米松

答案：D

83. 属于治疗荨麻疹的过敏活性物质阻释剂的是

A: 赛庚啶

B: 异丙嗪

C: 酮替芬

D: 去氯羟嗪

答案：C

84. 患者女，64 岁，10 天来夜间咳嗽，痰多，诊断为急性支气管炎，除了抗感染治疗外，在选服右美沙芬时应加用的药品是

A: 洛贝林

B: 氨溴索

C: 氨茶碱

D: 可待因

答案：B

85. (2020 年真题) 患者，女，65 岁，间断腹胀、纳差 6 年，因病情加重伴精神恍惚 3 天为主诉入院，实验室检查:ALT200UL，AST320UL，诊断为肝硬化失代偿期、肝性脑病。患者乙肝病史 20 年，间断服用中药（具体不详）治疗。糖尿病史 10 年，便秘多年，3~4 天排便一次。

- A: 水溶性维生素
- B: 多烯磷脂酰胆碱
- C: 维生素 B1
- D: 辅酶 A

答案: B

86. 患者，男，72 岁，近期出现入睡困难，诊断为失眠症，处方给予扎来普隆治疗，适宜的剂量范围是

- A: 20~50mg
- B: 3~6mg
- C: 5~10mg
- D: 0.25~0.5mg

答案: C

87. 脂溶性最低，作用慢而长的是

- A: 戊巴比妥
- B: 硫喷妥
- C: 巴比妥
- D: 苯巴比妥

答案: C

88. 可主要引起嗜酸性粒细胞增多的疾病为

- A: 胃溃疡

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

B: 糖尿病

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/898077010042007022>