

2024 江苏省浦口区《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必刷 200 题大全附答案（培优 A 卷）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. （2015 年真题）治疗抗肿瘤药引起的恶心、呕吐等不良反应，可选用的止吐药是（ ）。

- A: 奥美拉唑
- B: 维生素 B6
- C: 昂丹司琼
- D: 雷尼替丁

答案：C

2. 以延长患者生命时间为指标开展的药物经济学评价方法属于（ ）

- A: 成本-效果分析
- B: 成本-效用分析
- C: 最小成本分析
- D: 成本-效益分析

答案：A

3. 嗜酸性粒细胞增多可能提示的疾患是

- A: 病毒感染性腹泻
- B: 铅、钡中毒
- C: 感染性疾病如肺结核
- D: 过敏性疾病如荨麻疹

答案：D

4. 高血压伴高钾血症患者慎用的药物是()

- A: 美托洛尔
- B: 氢氯噻嗪
- C: 氨氯地平
- D: 依那普利

答案: D

5. (2021 年真题) 患者,男,45 岁,因消化不良(上腹饱胀,餐后明显)来药店咨询。下列说法错误的是()

- A: Hp 感染是引起消化不良的常见原因
- B: 进餐时不要摄入过多的液体
- C: 可用助消化药对症治疗
- D: 应除外器质性疾病

答案: A

6. 抗类风湿关节炎药物中,服用 4~8 周后起效的是

- A: 氯喹
- B: 柳氮磺吡啶
- C: 来氟米特
- D: 青霉胺

答案: B

7. 作为预防用药错误策略,制定新药新知识培训制度,归属于

- A: 环境与流程的优化与持续改进
- B: 管理规范到位
- C: 人员知识培训
- D: 科学发展

答案：C

8. 用药与反应发生时间关系密切，有文献资料佐证；但引发 ADR 的药品不止一种，或原患疾病病情进展因素不能除外；ADR 因果关系可评价为

- A: 可能
- B: 可能无关
- C: 待评价
- D: 很可能

答案：A

9. 非甾体抗炎药的典型不良反应是

- A: 胃肠道刺激出血
- B: 肝毒性
- C: 血液系统毒性
- D: 肾毒性

答案：A

10. IV 期临床试验是在广泛使用的条件下考察药品疗效和不良反应，样本数常见病不少于

- A: 100 例
- B: 1000 例
- C: 2000 例
- D: 300 例

答案：C

11. 抑制胃酸分泌作用的药物是

- A: 西沙必利

- B: 碳酸氢钠
- C: 莫沙必利
- D: 奥美拉唑

答案：D

12. 稳定型心绞痛的临床表现不包括

- A: 胸痛
- B: 多持续 3~5 分钟
- C: 针刺或刀扎样锐性痛
- D: 压迫、发闷

答案：C

13. 合用维生素 B12 与陈皮，可以达到的效果是

- A: 加快维生素 B12 的排泄
- B: 促进维生素 B12 的吸收
- C: 抑制维生素 B12 的代谢
- D: 减少维生素 B12 的氧化

答案：B

14. 肺结核最常见的传播方式为

- A: 垂直传播
- B: 消化道
- C: 呼吸道传播
- D: 血液传播

答案：C

15. 除解热镇痛药外，可推荐给长期精神紧张的头痛患者应用的处方药是

- A: 地西泮
- B: 氟西汀
- C: 卡马西平
- D: 谷维素

答案：A

16. 脑出血

- A: 2~3 周
- B: 4~5 周
- C: 1~2 周
- D: 2~4 周

答案：D

17. 某女性，32 岁，2 天前无明显诱因出现尿频、尿急、尿痛，伴腰痛；查体：T38℃，肾区叩击痛；血常规见 WBC15X10⁹ / L，中性粒细胞百分比 85%，尿常规见尿液混浊，尿蛋白阳性，镜检白细胞满视野。

- A: 急性膀胱炎
- B: 慢性肾盂肾炎
- C: 急性肾小球肾炎
- D: 急性肾盂肾炎

答案：A

18. （2018 年真题）某口服避孕药复方制剂，其成分为：每片含屈螺酮 3mg 和炔雌醇 0.03mg。说明书部分内容节选如下，请回答问题。

- A: 到 21 日 20:00 再同时服用两片药，然后在常规时间继续服药
- B: 尽快补服一片，然后在常规时间继续服药
- C: 尽快同时服用两片药，然后在常规时间继续服药，在以后的 7 天内要加用屏障避孕法

D: 不再继续服用此周期药物,经过一个 7 天的停药期,再开始继续服用下一周期的药物

答案: B

19. 属于 5 α -还原酶抑制剂,可抑制前列腺生长的药品

A: 黄酮哌酯

B: 非那雄胺

C: 阿夫唑嗪

D: 氟他胺

答案: B

20. 对于围手术期抗菌药物的预防性应用原则,说法错误的是

A: 针对革兰阴性杆菌可用氨曲南、磷霉素或氨基糖苷类

B: 若术前发现有耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(MRSA)定植的可能或者该医疗机构 MRSA 发生率高,可选用氨曲南预防感染

C: 应尽量选择单一抗菌药物预防用药,避免不必要的联合使用

D: 对于清洁手术(I类切口),通常不需预防用抗菌药物

答案: B

21. 用于解救苯二氮草类药物中毒的特殊解毒剂是

A: 乙酰半胱氨酸

B: 氟马西尼

C: 纳洛酮

D: 亚甲蓝

答案: B

22. 患者男,65 岁,身高 170cm,体重 60kg,经血糖检测、糖耐量试验和肾功能检测(肌酐清除率 45ml/min),诊断为 2 型糖尿病、肾功能不全,该患者应首选的药物是

- A: 格列齐特
- B: 格列喹酮
- C: 格列吡嗪
- D: 格列本脲

答案: B

23. 向患者提供的用药咨询的主要内容是

- A: 服药后预计疗效起效时间及维持时间
- B: 输液药物稳定性和配伍的理化性质变化
- C: 有否替代药物或其他疗法
- D: 漏服后的补救方法

答案: B

24. 药学服务的具体工作不包括

- A: 治疗药物监测
- B: 处方审核
- C: 关注特殊人群
- D: 参与临床药物治疗

答案: C

25. 用于胆石症的非手术治疗,属于钙通道阻滞剂,不可掰开嚼碎,避免卧位服用的药物是()

- A: 鹅去氧胆酸片
- B: 匹维溴铵片
- C: 山莨菪碱片

D: 熊去氧胆酸片

答案：B

26. 静脉滴注过程中药液必须避光的药物是

A: 培氟沙星

B: 青霉素

C: 万古霉素

D: 两性霉素 B

答案：A

27. (2017 年真题) 高血压伴高钾血症患者慎用的药物是 ()

A: 氨氯地平

B: 美托洛尔

C: 依那普利

D: 氢氯噻嗪

答案：C

28. 患者，女，42 岁，因成骨肉瘤使用环磷酰胺甲氨蝶呤联合化疗，用药过程中，者出现出血性膀胱炎。适宜的处理措施是 ()

A: 给予糖皮质激素冲击治疗

B: 停药，给予亚叶酸钙治疗

C: 停药，给予糖皮质激素

D: 停药，水化，给予美司钠治疗

答案：D

29. 糖尿病患者一旦出现尿酮体阳性，可以提示患者

A: 伴甲状腺功能亢进

B: 病情尚未控制

C: 胰岛素分泌过度

D: 生长激素分泌过度

答案：B

30. 主要侵犯生殖器、肛门等部位及新生儿的是（单纯疱疹病毒的分型）

A: HSV-IV 型

B: HSV-III 型

C: HSV-II 型

D: HSV-I 型

答案：C

31. 即在体内有抗凝作用，又在体外有抗凝作用的药物是

A: 肝素

B: 尿激酶

C: 噻氯匹定

D: 华法林

答案：A

32. 下列药学服务的对象中，不属于药学服务特殊人群的是

A: 特殊体质者

B: 住院患者

C: 血液透析者

D: 小儿、老年人

答案：B

33. 清晨 5 时至中午 11 时最低，下午 2 时至次日凌晨 1 时最高，是指

A: 胰岛 B 细胞的分泌规律

- B: 肝脏合成胆固醇的规律
- C: 糖皮质激素的分泌规律
- D: 胃酸的分泌规律

答案：D

34. 尿隐血检查阳性的病人中，最可能导致尿血红蛋白阳性的药物是

- A: 酒精中毒
- B: 阿司匹林
- C: 海洛因
- D: 巴比妥类

答案：B

35. 患者，男，35 岁，髋关节置换术后 7 天，患者右侧下肢肿胀、疼痛，抬高患肢后可好转。

- A: 下肢深静脉血栓形成
- B: 下肢动脉栓塞
- C: 肺动脉栓塞
- D: 病理性骨折

答案：A

36. （2019 年真题）患者，男，68 岁，既往体健，因受凉后咳嗽、咳黄脓痰，伴发热 2 天入院。查体：体温 39.1℃，血压 138/80mmHg，心率 102 次/分，呼吸 32 次/分，左肺可闻及湿性啰音。化验结果：白细胞计数 $11.2 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞百分比 85%。胸部 X 线左肺下叶浸润性阴影。痰培养结果待归。入院诊断：社区获得性肺炎。

- A: 多西环素
- B: 阿莫西林克拉维酸钾+阿奇霉素
- C: 左氧氟沙星+阿奇霉素

D: 阿奇霉素

答案: B

37. 硫脲类最严重的不良反应是

A: 粒细胞缺乏

B: 甲状腺功能低下

C: 甲状腺功能亢进

D: 中枢抑制

答案: A

38. 患者，男，59 岁，哮喘病史 8 年，近日因急性脑梗死就诊，住院治疗 2 周后出院。对于该患者脑血管病的二级预防，宜选用的抗血小板药物是

A: 阿司匹林

B: 华法林钠

C: 氯吡格雷

D: 对乙酰氨基酚

答案: C

39. 患者，女，31 岁，产后 3 个月，哺乳期。因“尿路感染”需给予抗生素治疗，首选的药物是

A: 复方磺胺甲噁唑

B: 阿米卡星

C: 头孢曲松

D: 左氧氟沙星

答案: C

40. (2019 年真题) 患者，男，47 岁，2 型糖尿病史，饮食不规律，近期因口服降糖药疗效不佳欲改为三餐前即刻使用胰岛素或胰岛素类似物控制血糖，应选用的药物是

- A: 低精蛋白锌胰岛素
- B: 精蛋白锌胰岛素
- C: 门冬胰岛素
- D: 普通胰岛素

答案：C

41. 毒物中毒的严重程度与后果往往取决于作用毒物的剂量、作用的时间以及诊断和救治是否准确与及时等。对于急性中毒者，必须迅速做出准确判断，及时果断地采取有效的救治措施，以挽救生命、减轻损害程度。

- A: 吸氧
- B: 催吐、洗胃
- C: 导泻与洗肠
- D: 静脉补液

答案：B

42. 患者，男性，55 岁，近期感觉乏力、疲倦、心悸、气短，经常头晕、头疼、困倦。经医生检查发现，患者皮肤干燥、指甲扁平。实验室检查示 Hb72g / L。诊断为缺铁性贫血，处方为乳酸亚铁口服。

- A: 胃肠道反应
- B: 肾毒性
- C: 心脏相关风险
- D: 肝毒性

答案：A

43. 治疗大肠埃希菌所致的尿路感染，不宜选用的抗菌药物是

- A: 头孢呋辛
- B: 阿奇霉素
- C: 阿莫西林
- D: 左氧氟沙星

答案：B

44. 下列药物信息源中，国家食品药品监督管理局网站是

- A: gov. cn
- B: <http://www.cmt.com.cn>
- C: <http://www.CFD>
- D: <http://www.nstl.gov.cn>

答案：C

45. 以下有关高血压的药物治疗方案的叙述中，不正确的是

- A: 采用最小有效剂量，根据需要可考虑逐渐增加
- B: 首先选用血管扩张剂和中枢性抗高血压药
- C: 可采用两种或两种以上药物联合用药
- D: 药物治疗高血压时要考虑患者的合并症

答案：B

46. 属于非核苷类逆转录酶抑制剂的是（）

- A: 利托那韦
- B: 齐多夫定
- C: 依非韦伦
- D: 利巴韦林

答案：C

47. 患儿男,2 岁,误服水银后应选用的洗胃液是 ()

- A: 淀粉溶液
- B: 1:5000 高锰酸钾溶液
- C: 鸡蛋清
- D: 牛奶与水等量混合

答案: C

48. 接种乙肝疫苗后, 血清免疫学检查可呈阳性反应的指标是

- A: 乙型肝炎病毒 e 抗原
- B: 乙型肝炎病毒表面抗原
- C: 乙型肝炎病毒表面抗体
- D: 乙型肝炎病毒 e 抗体

答案: C

49. 可引起血清尿素氮降低的是

- A: 胃溃疡
- B: 肾衰竭
- C: 急性胰腺炎
- D: 严重肝病

答案: D

50. 适用于伴有前列腺体积增大的良性前列腺增生症的是 ()

- A: 奥昔布宁
- B: 非那雄胺
- C: 米多君
- D: 特拉唑嗪

答案: B

51. 患者，女，35 岁，部分发作性癫痫病史 12 年，最初使用苯妥英钠单药治疗，6 个月前因癫痫病情控制不佳，提高苯妥英钠剂量，因不能耐受不良反应换用卡马西平联合丙戊酸钠治疗，癫痫得到控制。患者近期出现体重增加及严重脱发，到神经内科复诊。患者同时患有 2 型糖尿病，长期口服二甲双胍、阿卡波糖治疗。此外患者长期服用复合维生素 B。

- A: 停用了苯妥英钠
- B: 糖尿病病情进展
- C: 卡马西平的不良反应
- D: 丙戊酸钠的不良反应

答案：D

52. 氰化氢中毒呈现

- A: 呼出气体中可有苦杏仁气味
- B: 抽搐、进行性加重
- C: 出血、凝血时间延长
- D: 恶心、呕吐、口内有金属味

答案：A

53. 妊娠早期是胚胎器官和脏器的分化时期，最易受外来药物的影响引起胎儿畸形。胎儿形成期，器官形成过程已经大体完成并继续发育，某些药物可导致胎儿发育异常。

- A: 妊娠 1~2 周
- B: 妊娠 1~3 周
- C: 妊娠 3~4 周
- D: 妊娠 3~5 周

答案：D

54. 用于诊断肝脏疾病时，下列哪组酶的检测最恰当

- A: ACP、AST、LDH
- B: ALT、AST、ALP
- C: CK、GT、ALP
- D: AMY、LDH、a-HB

答案：B

55. 患者，男，36 岁，因发热、咳嗽就诊，查血常规：白细胞计数

$6.28 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞百分比 65.7%，淋巴细胞百分比 15.1%。诊断为感冒。医生处方：阿奇霉素片 0.5g qd po. 该处方属于()

- A: 有禁忌证用药
- B: 有配伍禁忌
- C: 用法、用量不适宜
- D: 无适应证用药

答案：D

56. 同时使用 2 种药物，药物不良事件的发生率为

- A: 0.68
- B: 0.13
- C: 0.5
- D: 0.38

答案：B

57. 杨某，女，19 岁，咳嗽、有脓性痰，并伴有胸痛；发热 39°C ；肺闻及湿性罗音； $\text{WBC} > 13 \times 10^9/L$ 。

- A: 链霉素
- B: 利福霉素
- C: 红霉素

D: 左氧氟沙星

答案: D

58. 营养性巨幼细胞性贫血主要因为缺乏

A: 鞣酸

B: 维生素 C

C: 白细胞

D: 叶酸和(或)维生素 B

答案: D

59. 帕金森病患者跌倒的最常见原因为

A: 姿势反射障碍

B: 不宁腿综合征

C: 体位性低血压

D: 神经精神障碍

答案: A

60. 血栓性疾病女性患者的凝血酶原时间可能短于

A: 10 秒

B: 16 秒

C: 18 秒

D: 11 秒

答案: D

61. 患者，女性，46 岁。半年来食欲减退、易疲劳，查体发现多处淋巴结肿大，尤以颈部淋巴结为甚。骨髓抽取及切片、放射线检查（X 线、淋巴摄影）后诊断为恶性淋巴瘤。

A: 环磷酰胺

- B: 卡莫司汀
- C: 奥沙利铂
- D: 他莫昔芬

答案：A

62. 乳母服用青霉素，乳汁中青霉素的量低于总用药量 1% 的机制是其

- A: 呈弱酸性
- B: 呈弱碱性
- C: 在母体血浆中处于结合状态
- D: 解离度大

答案：A

63. 苯妥英钠可能导致的多种不良反应中, 不包括()

- A: 共济失调
- B: 视物模糊
- C: 低血糖
- D: 牙龈增生

答案：C

64. 若空腹服药，则胃排空快，药物在短时间内进入十二指肠与小肠；餐后服用可延缓胃排空，使药物在胃中较充分地吸收，且能够减少或避免药物对胃粘膜的刺激。因此，一般药品适宜餐后服用。

- A: 清晨服用
- B: 餐后服用
- C: 餐前服用
- D: 餐中服用

答案：C

65. 患者男,70 岁高血压病史 14 年,服用依那普利 20mg/日,平时血压控制不佳今晨大便时突然出现头疼、头晕,随即出现右侧肢体活动不利。血压为 190/100mmHg,头颅 CT 检查结果为左侧脑出血,出血量约 10ml,拟采用内科治疗,该患者首先应采取的治疗措施是 ()

- A: 口服氨氯地平片
- B: 静脉滴注硝酸甘油注射液
- C: 肌肉注射利血平注射液
- D: 静脉滴注甘露醇注射液

答案: D

66. 左心衰竭最早出现的症状是

- A: 端坐呼吸
- B: 劳力性呼吸困难
- C: 夜间阵发性呼吸困难
- D: 粉红色泡沫样痰

答案: B

67. 便秘可选用的非处方药是

- A: 盐酸小檗碱
- B: 莫沙必利
- C: 乳果糖
- D: 酚酞

答案: C

68. 氯喹与伯氨喹合用

- A: 加重神经肌肉接头抑制作用
- B: 诱发癫痫
- C: 根治间日疟

D: 引起心脏房室传导阻滞

答案：C

69. 抗肿瘤药物中，影响核酸合成的药物是

A: 依托泊苷

B: 放线菌素

C: 顺铂

D: 甲氨蝶呤

答案：D

70. 某女性，32 岁，2 天前无明显诱因出现尿频、尿急、尿痛，伴腰痛。查体：T38℃，肾区叩击痛，血分析见 WBC $15 \times 10^9/L$

A: 选用肾毒性小、副作用少的抗菌药物

B: 首选针对革兰阳性菌的药物

C: 如该患者为妊娠期，可选用氨苄西林

D: 抗菌药物在尿和肾内的浓度要高

答案：B

71. 治疗胃食管反流病，艾司奥美拉唑的正确服药时间是

A: 早餐前 30min

B: 症状发作时、餐后 1.5h 和睡前

C: 餐后、睡前

D: 三餐前 30min

答案：A

72. 患者，男，67 岁，患带状疱疹，皮疹愈合后出现持续 1 个月左右疼痛，可给予的止痛药物是

A: 加巴喷丁

B: 山莨菪碱

C: 布洛芬

D: 吗啡

答案: A

73. 以下医学检查项目中，主要用于诊断急性胰腺炎的是

A: 尿淀粉酶

B: 肌酸激酶增高

C: 淀粉酶增高

D: 血淀粉酶

答案: C

74. 患者，男，52 岁，诊断为高血压、冠心病。医师处方：

A: 雷米普利

B: 左旋氨氯地平

C: 氟伐他汀

D: 比索洛尔

答案: D

75. (2015 年真题) 下列药品宜冷处贮存但不宜冷冻的是 () 。

A: 双歧三联活菌制剂

B: 甘露醇注射液

C: 氯化钾注射液

D: 卡前列甲酯栓剂

答案: A

76. 告知"人促红素可引起纯红细胞再生障碍性贫血"属于

A: 新药信息

- B: 禁忌证
- C: 药物相互作用
- D: 药品不良反应

答案：D

77. 慢性汞中毒患者的首发症状是（）

- A: 神经衰弱
- B: 口腔炎
- C: 剥脱性皮炎
- D: 易兴奋症

答案：A

78. 处方中外文缩写 p

- A: 微克
- B: 必要时
- C: 临睡时
- D: 代表（）

答案：C

79. 对慢性中重度铅中毒患者给予

- A: 糖皮质激素
- B: 补充蛋白质
- C: 驱铅治疗
- D: 卫生教育

答案：C

80. 下列治疗痤疮的药物中，患者在治疗期间及治疗结束后 1 个月应避免献血的是：

- A: 克林霉素
- B: 红霉素
- C: 过氧甲苯酰
- D: 异维 A 酸

答案：D

81. 可用于氰化物中毒的药物是

- A: 碘解磷定
- B: 乙酰胺
- C: 亚硝酸钠
- D: 维生素 K1

答案：C

82. 低盐饮食、避免情绪大波动，最适合于

- A: 高血压
- B: 糖尿病
- C: 骨质疏松
- D: 焦虑障碍

答案：A

83. 餐后血糖升高为主，伴餐前血糖轻度升高的 2 型糖尿病患者首选

- A: 阿卡波糖
- B: 比格列酮
- C: 二甲双胍
- D: 格列喹酮

答案：B

84. 服用氨基糖苷类药时应该禁用的饮食是

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

A: 食盐

B: 酒

C: 脂肪

D: 食醋

答案：D

85. 包括索引、文摘和题录等，查阅非常方便

A: 期刊论文

B: 三级信息源资料

C: 二级信息源资料

D: 网站信息

答案：C

86. (2018 年真题) 患者, 女, 71 岁, 2 型糖尿病史 10 年。化验结果糖化血红蛋白 (HbA1c) 9.2%, 空腹血糖 10.5mmol/L, 餐后血糖 15.5mmol/L。目前服用二甲双胍片 0.5gtidpo, 格列美脲片 2mgtidpo, 罗格列酮片 2mgbidpo, 甲钴胺片 0.5mgtidpo, 羟苯磺酸钙胶囊 250mgbidpo。

A: 甲钴胺片 0.5mgtidpo

B: 格列美脲片 2mgtidpo

C: 二甲双胍片 0.5gtidpo

D: 罗格列酮片 2mgbidpo

答案：B

87. 接种乙型肝炎疫苗后，血清免疫学检查可呈阳性反应的指标是：

A: 乙型肝炎病毒表面抗原

B: 乙型肝炎病毒表面抗体

C: 乙型肝炎病毒 e 抗原

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

D: 乙型肝炎病毒 e 抗体

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/898142033042007022>