君子忧道不忧贫。——孔丘

肝脏疾病诊疗专项考核试题

一、选择题

1.关于肝性脑病的发病机制，下列错误的是（）[单选题]*

A.色氨酸增多

B.肝脏对酪氨酸的清除发生障碍

C.肝脏对谷氨酸的清除发生障碍 √

D.血氨增高

E.脑星形胶质细胞对苯二氮卓（艹）类受体表达上调

2.肝硬化患者最严重的并发症是（）[单选题]*

A.食管胃底静脉曲张破裂出血

B.肝性脑病 √

C.低钾血症

D.原发性肝癌

E.自发性腹膜炎

3.治疗酒精性肝病的关键是（）[单选题]*

A.营养支持

B.戒酒 √

C.肝移植

D.给予保肝药

E.给予利胆药

4.下列表现中，符合肝脏解毒功能下降的是（）[单选题]*

A.黄疸

B.食管静脉曲张

C.氨中毒 √

D.凝血因子减少

E.男性乳腺发育

5.门静脉高压症时受影响最早的侧支血管为（）[单选题]*

A.脐静脉

B.胃冠状静脉 √

C.直肠上静脉

D.腹膜后静脉

E.腹壁上静脉

6.门静脉高压症的交通支不包括（）[单选题]*

A.胃底、食管下端交通支

B.直肠下端交通支

C.腹壁交通支

D.肠系膜血管交通支 √

E.腹膜后交通支

7.小结节性肝硬化的特征错误的是（）[单选题]*

A.起病多隐匿

B.进展较缓慢

C.多由血吸虫病引起 √

D.症状不明显

E.结节大小均匀，最大不超过 1.0cm

8.原发性肝癌早期转移途径为（）[单选题]*

A.肺外转移

B.淋巴转移

C.直接浸润转移

D.肝内进行转移 √

E.骨转移

9.原发性肝癌的临床特点不正确的是（）[单选题]*

A.肿块增长迅速，肝包膜被牵拉引起疼痛

B.门脉内癌栓可导致门脉高压

C.门脉外癌栓可以产生血管杂音 √

D.癌块侵犯肝门胆管引起黄疸

E.肿瘤生长缓慢，可以无痛

10.与原发性肝癌发病最密切的因素是（）[单选题]*

A.肝硬化

B.病毒性肝炎 √

C.黄曲霉毒素

D.饮用水污染

E.寄生虫

11.原发性肝癌按大体形态分型下述哪项不正确（）[单选题]*

A.巨块型癌直径>10cm

B.孤立的直径≤2cm 的癌结节称为微小肝癌

C.巨块型易发生坏死引起肝破裂

D.结节型易发生癌结节破裂出血 √

E.弥漫型往往因肝功能衰竭而死亡

12.原发性肝癌肝外血行转移最常见的部位是（）[单选题]*

A.脑

B.骨髓

C.肺 √

D.肾上腺

E.肾

13.原发性肝癌经淋巴转移最常见的部位是（）[单选题]*

A.锁骨上淋巴结

B.主动脉旁淋巴结

C.胰腺旁淋巴结

D.肝门淋巴结 √

E.脾门淋巴结

14.引起细菌性肝脓肿的主要原因是（）[单选题]*

A.皮肤化脓感染

B.胆道蛔虫 √

C.坏疽性阑尾炎

D.痔核感染

E.开放性肝损伤

饭疏食，饮水，曲肱而枕之，乐亦在其中矣。不义而富且贵，于我如浮云。——《论语》

15.肝脓肿的特点正确的是（）[单选题]*

A.细菌性肝脓肿常为单发，较大

B.阿米巴肝脓肿起病急，伴寒战、高热

C.阿米巴肝脓肿较少，多为多发性

D.阿米巴肝脓肿脓液为褐色，无臭味 √

E.阿米巴肝脓肿病人粪便中可找到阿米巴原虫

16.肝性脑病的诱因不包括（）[单选题]*

A.消化道出血

B.高钾性酸中毒 √

C.便秘

D.低血糖

E.缺氧

17.最主要产氨场所是（）[单选题]*

A.肾脏

B.肠道 √

C.肝脏

D.大脑

E.骨骼肌

18.关于肝昏迷，下述哪项是错误的（）[单选题]*

A.血中 NH3　易入血脑屏障

B.低钾性碱中毒时 NH3　易入脑组织

C.肠道 pH 在 6 以下易使 NH4+　变为 NH3　√

D.肠道 pH 在 5 时，NH3 不易被吸收

E.缺氧和高热增加氨的毒性

19.关于肝性脑病的氨代谢，下述哪项不正确（）[单选题]*

A.大多数门腔分流术患者血氨及脑脊液中氨含量都增高

B.暴发性肝功能衰竭时血氨往往明显增高 √

C.动脉血和脑脊液中氨含量明显相关

D.便秘时会引起血氨增高

E.结肠呈碱性环境时产氨增多

20.肝昏迷前期最突出的表现是（）[单选题]*

A.表情欣快，昼睡夜醒

B.精神错乱

C.肌张力增高

D.行为异常、吐词不清

E.意识模糊、扑翼震颤 √

21.肝性脑病前驱期的临床表现有（）[单选题]*

A.可有扑翼样震颤 √

B.脑电图异常

C.定向力减退

D.昏睡

E.计算力下降

22.缓慢发生的肝昏迷其最早出现的症状为（）[单选题]*

A.昏迷

B.肝臭

C.行为异常，欣快 √

D.定向力障碍

E.意识模糊

23.肝性脑病昏迷期哪项不正确（）[单选题]*

A.昏迷

B.可有抽搐

C.扑翼样震颤阳性 √

D.脑电图异常

E.反射可消失

24.肝硬化并发肝肾综合征是（）[单选题]*

A.肝硬化失代偿期合并肾小管坏死

B.肝硬化失代偿期发生氮质血症及少尿等肾功能损害 √

C.肝硬化晚期合并急性肾炎

D.肝硬化代偿期并慢性肾炎

E.肝硬化失代偿期并慢性肾炎

25.关于肝硬化自发性腹膜炎，正确的描述是（）[单选题]*

A.一般起病急，伴高热、寒战，剧烈腹痛，出现板状腹、反跳痛

B.致病菌多为金黄色葡萄球菌

C.易出现顽固性腹腔积液 √

D.治疗时应加强利尿治疗

E.应进行腹腔积液培养，待培养结果出来后有针对性应用抗生素治疗

26.反映肝纤维化的血清学指标是（）[单选题]*

A.胆固醇

B.乳酸脱氢酶（LDH ）

C. γ-谷氨酰转肽酶(γ-GGT ）

D.透明质酸（HA ） √

E.胆汁酸

27.对肝硬化有确诊价值的是（）[单选题]*

A.肝肿大质地偏硬

B.脾肿大

C.丙种球蛋白升高

D.肝穿刺活检有假小叶形成 √

E.食管吞钡 X 线检查有虫蚀样充盈缺损

28.鉴别肝内胆汁淤滞性黄疸与肝外梗阻性黄疸最确切的方法是（）[单选题]*

A.尿三胆测定及总胆红素测定

B.十二指肠镜逆行胆管造影 √

C.碱性磷酸酶测定

D.氨基比林试验

E.谷丙转氨酶测定

29.肝硬化早期诊断最可靠的方法是（）[单选题]*

A.肝功能检查

B.B 型超声

C.腹腔镜直视下活检 √

D.CT

E.食管钡餐透视

30.对判断肝硬化患者预后意义不大的指标是（）[单选题]*

A.腹腔积液

B.清蛋白

C.血尿素氮 √

D.凝血酶原时间

E.肝性脑病

31.肝硬化腹腔积液治疗。一般不主张采用（）[单选题]*

A.限制蛋白饮食

B.低盐饮食

C.卧床休息

D.强烈利尿 √

E.腹腔积液浓缩回输

32.门静脉高压症的临床表现主要有（）[单选题]*

A.消瘦

B.肝肿大、肝功能异常

C.肝掌

D.腹水 √

E.肝性脑病

33.门脉高压的特异性表现是（）[单选题]*

A.腹腔积液

B.脾肿大

C.脾功能亢进

D.侧支循环开放 √

E.肝掌，蜘蛛痣

34.诊断脂肪肝首选的检查方法是（）[单选题]*

A.CT

B.MRI

C.体格检查

D.B 超 √

E.病理学检查

35.非酒精性脂肪性肝病的发生主要与下列哪种因素相关（）[单选题]*

A.肥胖 √

B.遗传

C.胰岛素抵抗

D.病毒感染

E.乙型肝炎

36.治疗早期原发性肝癌疗效最好的非手术疗法是（）[单选题]*

A.放射治疗

B.肝动脉化疗栓塞治疗 √

C.肝动脉灌注化疗

D.经皮穿刺酒精注射疗法

E.生物治疗

37.辅助诊断原发性肝细胞癌最早的指标是（）[单选题]*

A.肝脏 B 超

B.肝 CT

C.AFP √

D.AP

E.γ-GT

38.原发性肝细胞性肝癌最理想的肿瘤标记物是（）[单选题]*

A.AFP √

B.GGT2

C.CA19-9

D.CA125

E.CEA

39.除原发性肝癌，哪种疾病能引起 AFP>500 μg/L（）[单选题]*

A.多囊肝

B.慢性肝炎

C.生殖腺胚胎瘤 √

D.肾脏胚胎瘤

E.肝硬化

40.有关 AFP 升高的临床意义，正确的是（）[单选题]*

A.AFP>200 μg/L 时可诊断肝细胞癌

B.肝转移癌患者 AFP 常显著增高

C.肝功异常伴有 AFP 增高常提示合并肝癌

D.消化道其他肿瘤 AFP 不会升高

E.肝细胞癌术后 AFP 又升高提示复发 √

41.亚临床肝癌是指（）[单选题]*

A.肝细胞 DNA 代谢异常

B.AFP 检出而无任何症状和体征的肝癌 √

C.B 超检出<2cm 的肝癌

D.CT 检出<2cm 的肝癌

E.患者仅有肝区疼痛的肝癌

42.原发性肝癌定位诊断下述哪个方法最敏感（）[单选题]*

A.X 线

B.CT

C.CT 肝动脉造影 √

D.放射性核素肝显像

E.X 线门静脉造影

43.下列哪项有助于鉴别肝癌和良性活动性肝病（）[单选题]*

A.HBsAg 阳性

B.AFP 阳性

C.AFP 阴性

D.肝功能明显损害

E.AFP 和 ALT 动态曲线 √

44.对肝癌的临床诊断最具特异性的是（）[单选题]*

A.肝区疼痛

B.进行性肝大，质硬 √

C.恶病质

D.梗阻性黄疸

E.肺部转移病灶

45.治疗较大的单发性细菌性肝脓肿，主要治疗措施为（）[单选题]*

A.全身应用抗生素

B.输血，应用抗生素

C.穿刺抽脓，应用抗生素 √

D.全身支持疗法，应用抗生素

E.手术切开引流

46.下列哪些情况适宜作肝穿刺检查（）[单选题]*

A.肝功能异常伴有血友病

B.肝血管瘤

C.大量腹水

D.阿米巴肝脓肿 √

E.肝昏迷

47.症状出现之前肝性脑病的早期检测方法是（）[单选题]*

A.血氨

B.脑电图

C.诱发电位 √

D.空腹血糖

E.肝功能

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/905121102302012113