

外科护理技术考试题库与答案

1、患者，男性，30 岁。因外伤须注射破伤风抗毒素（TAT），在做皮试时，皮试结果：局部红润直径大于 5cm，此时护士应

- A、报告医生，改用其他药物
- B、按常规注射 TAT
- C、将 TAT 稀释分 4 次量注射，注射量由少到多
- D、将 TAT 稀释，剂量平均，分 4 次注射
- E、按常规注射 TAT 再注射盐酸肾上腺素

答案：C

2、腹部手术后开始进流质饮食的时间是

- A、腹痛消失后
- B、病人有食欲时
- C、恶心，呕吐消失后
- D、肛门排气后
- E、体温降至 37.5℃

答案：D

3、呼吸性酸中毒的主要发病机制是

- A、H⁺排出有障碍
- B、H⁺产生过多
- C、CO₂排出障碍
- D、HCO₃⁻排出过多
- E、机体不能保留 Na⁺

答案：C

4、手术区铺盖无菌布单，正确的是

- A、无菌巾先铺相对不洁区或操作者的对侧
- B、无菌巾铺下后不可由内向外再移动
- C、开腹手术的术野区至少铺单 2 层
- D、无菌单下垂手术台边缘至少 10cm
- E、术中手术巾单湿透时，应撤去重铺

答案：A

5、病人，男性，34 岁，体重 60kg，因“急性肠梗阻”入院。诉口渴、软弱无力，尿少，昨日呕吐 8 次，总量 2000ml。一个检查：脉搏 98 次/min，血压 12.8/8.0kPa（96/60mmHg），皮肤弹性差，眼窝凹陷。尿液检查呈酸性，血钾 3.5mmol/L。该病人的水钠代谢平衡失调的类型及程度为

- A、轻度高渗性缺水

不飞则已，一飞冲天；不鸣则已，一鸣惊人。——《韩非子》

- B、中度高渗性缺水
- C、中度低渗性缺水
- D、轻度等渗性缺水
- E、中度等渗性缺水

答案：E

6、病人男即将进行阑尾切除术，巡回护士的职责不包括

- A、核对病人姓名
- B、向病人做解释和安慰
- C、安置病人手术体位
- D、管理器械台
- E、清点手术器械

答案：D

7、男性，20岁，腹部闭合损伤2小时。血压52/40mmHg，P150次/分钟，R35次/分钟。病人神志淡漠，口唇发绀。Hb68g/L，腹部穿刺抽出不凝血。快速大量输血补液时，判断血容量补充充足与否的最可靠指标是

- A、血压和脉搏
- B、尿量和中心静脉压
- C、面色和肢端温度
- D、血压和中心静脉压
- E、意识和血压

答案：B

8、脑损伤病人出现中间清醒期提示有

- A、脑挫裂伤
- B、脑震荡
- C、硬脑膜外血肿
- D、颅底骨折
- E、脑内血肿

答案：C

9、患者男，60岁，咽食物时有梗噎感，初步诊断为食道癌，为确诊不需做下列哪项检查

- A、钡餐X线检查
- B、食管脱落细胞学检查
- C、B超
- D、纤维食管镜检查
- E、CT检查

答案：C

10、下列手术后切口感染的表述错误的一项是

- A、术后 24 小时高热
- B、手术 3 日后切口疼痛加剧
- C、切口红、肿、热、痛
- D、手术 3 日后体温仍在 38 度以上
- E、术后血白细胞持续升高

答案：A

11、李某，男，50 岁。上午在全麻下行二尖瓣置换术未醒测血压、脉搏的间隔时间为

- A、. 5~10 分钟
- B、1-30 分钟
- C、. 30~60 分钟
- D、60 分钟
- E、. 90 分钟

答案：B

12、脓肿形成后的处理原则是

- A、局部热敷
- B、外敷鱼石脂软膏
- C、抗菌药治疗
- D、切开引流
- E、患肢抬高，制动

答案：D

13、以下不是休克早期临床表现的是

- A、神志清楚
- B、面色苍白
- C、. 少尿
- D、血压下降
- E、烦躁不安

答案：D

14、男性 22 岁右胸刺伤 2h, 创口与胸腔相通, 病人极度呼吸困难, 急救措施是

- A、迅速封闭胸壁伤口
- B、立即手术
- C、输血、输液

D、胸腔闭式引流

E、吸氧

答案：A

15、下列有关感染问题，错误的是

A、疖是单个毛囊及其所属皮脂腺的急性化脓性炎症

B、痈是多数散在的不相关联的疖病

C、丹毒是皮内网状淋巴管的炎性病变

D、急性蜂窝织炎是皮下、筋膜下、深部疏松结缔组织的感染

E、脓肿是急性感染后局部脓液积聚

答案：B

16、女性, 38 岁, 诊断为巨大结节性甲状腺肿, 在颈丛麻醉下行一侧甲状腺次全切除术, 术后第 2 天突然发生手足持续性痉挛。此时首要处理原则为

A、检查引流管通畅与否

B、气管切开

C、立即喉镜检查

D、立即静脉注射 10%氯化钙 20ml

E、拆除颈部伤口缝线, 检查有无积血

答案：D

17、一侧开放性气胸时造成循环系统功能衰竭的主要原因是

A、创口失血

B、伤侧压力持续升高心脏向健侧移位

C、吸气时, 心脏移向伤侧

呼气时, 又移向健侧

D、吸气时, 心脏移向健侧

呼气时, 又移向伤侧

E、有效循环血量不足

答案：D

18、俯卧位适用于

A、腹部、乳房手术

B、胸部手术

C、脊柱及背部手术

D、肛门直肠手术

E、肾脏手术

答案：C

19、急性外科感染一般指病程在多长时间以内

百川东到海，何时复西归？少壮不努力，老大徒伤悲。——汉乐府

- A、1 周
- B、2 周
- C、3 周
- D、1 个月
- E、2 个月

答案：C

20、脓性指头炎典型的临床表现是

- A、手指发麻
- B、搏动性跳痛
- C、寒战，发热
- D、晚期疼痛加剧
- E、晚期指头明显发红，肿胀

答案：B

21、指出手术人员无菌准备中错误之处

- A、紧急抢救手术，来不及按常规洗手，用碘酊和酒精消毒双手和前臂，应先戴手套，后穿手术衣，再戴一副手套
- B、戴湿手套，应先戴好手套，后穿手术衣
- C、戴干手套，应先穿好手术衣，后戴手套
- D、连台手术应先脱手套、后脱手术衣，再浸泡消毒，先穿手术衣，后戴手套
- E、. 感染手术后接台，必须重新刷手

答案：D

22、肺癌病理分型中哪中细胞类型手术切除治疗的效果最好

- A、鳞状细胞癌
- B、腺癌
- C、小细胞未分化癌
- D、大细胞癌
- E、腺鳞癌

答案：A

23、闭式引流术后应指导病人采取

- A、平卧位
- B、头高脚低位
- C、头低脚高位
- D、半卧位
- E、侧卧位

答案：D

24、食管癌病人有持续性胸背痛,多表示

- A、癌肿部位有炎症
- B、癌已侵犯食管外组织
- C、有远处血行转移
- D、癌肿较长
- E、食管气管瘘

答案：B

25、哪项不符合巡回护士的工作内容

- A、术前物品准备
- B、接受病人
- C、清点核对物品
- D、安置体位
- E、留取标本

答案：E

26、患者，男性，33 岁。输大量库存血后心率缓慢，手足抽搐、血压下降、伤口渗血，其原因是

- A、血钾升高
- B、血钾降低
- C、血钙升高
- D、血钙降低
- E、血钠降低

答案：D

27、刘某，男，56 岁。上腹部手术后第 6 日，出现顽固性呃逆，应警惕的是

- A、切口感染
- B、肺不张
- C、膈下感染
- D、急性胃扩张
- E、肠梗阻

答案：C

28、胃肠道术后病人开始进食时间是在

- A、恶心呕吐消失后
- B、腹痛消失后
- C、腹胀减轻后

太上有立德，其次有立功，其次有立言，虽久不废，此谓不朽。——《左传》

D、拆线后

E、肛门排气后

答案：E

29、蛛网膜下腔阻滞的病人取去枕平卧位 6~8 小时主要是预防

A、头痛

B、呕吐

C、低血压

D、切口痛

E、腹痛

答案：A

30、关于抗生素应用，错误的是

A、做好药物的贮存，配制，保证有效使用

B、及时用药，准确执行医嘱

C、严重感染应从静脉途径给药

D、静脉滴注时宜采取分次，分别给药法

E、体温降至正常时停用抗生素

答案：E

31、某女 50 岁，化脓性胆管炎手术后 10 天，多次下肢静脉输液并发血栓性静脉炎下列措施哪项是禁忌

A、停止在患处静脉输液

B、抬高患肢

C、局部制动

D、局部按摩

E、局部硫酸镁热敷

答案：D

32、脑疝急救错误的是

A、补足吸氧

B、腰穿放脑脊液尽快降低颅内压

C、迅速查明病因

D、快速静滴甘露醇

E、静注地塞米松 10mg

答案：B

33、关于手术中的无菌操作原则，下列哪种说法是错误的

A、分清有菌、无菌的概念

B、手术人员一经”洗手”，手臂即不准接触未经消毒的物品

- C、穿无菌手术衣及带好无菌手套后，腰部以下应视为有菌区
- D、穿无菌手术衣及带好无菌手套后，肩部以上可视为相对无菌区
- E、任何无菌包及容器的边缘均视为有菌，取用无菌物品时不可触及

答案：D

34、哪项不是低血钾的临床表现

- A、兴奋、谵妄
- B、肌肉软弱无力
- C、腹胀、恶心、呕吐
- D、心动过速、心律不齐
- E、心电图 T 波低平

答案：A

35、不符合枕骨大孔疝表现的是

- A、剧烈头痛
- B、反复呕吐
- C、意识改变出现早
- D、无瞳孔改变
- E、呼吸骤停发生早

答案：C

36、等渗性缺水时应

- A、先给适量高渗盐水，以缓解其电解质失调
- B、补给等量的生理盐水和葡萄糖溶液
- C、在缺水症状纠正后，给适量的电解质液
- D、先高渗盐水，再葡萄糖液
- E、先葡萄糖液，再生理盐水

答案：B

37、患者，女性，26 岁。破伤风患者，抽搐时引起呼吸困难，窒息，该患者急救应首先

- A、给予氧气吸入
- B、气管插管
- C、气管切开
- D、呼吸兴奋剂
- E、立即进行手术

答案：C

38、食管癌切除术后最严重的并发症是

- A、乳糜胸

- B、吻合口瘘
- C、吻合口狭窄
- D、心律失常
- E、肺不张

答案：B

39、食管癌的典型症状是

- A、进食时哽噎感
- B、胸骨后烧灼样痛
- C、食管内异物感
- D、胸骨后针刺样不适
- E、进行性吞咽困难

答案：E

40、杨某，男，58岁。患结肠癌，拟行左结肠癌根治术，开始服用肠道不吸收抗菌药物为术前

- A、1日
- B、2日
- C、3日
- D、4日
- E、5日

答案：C

41、用物理方法消灭细菌称

- A、消毒法
- B、抗毒法
- C、抗菌法
- D、无菌法
- E、灭菌法

答案：E

42、不属于低渗性缺水的临床表现是

- A、极度口渴
- B、尿量减少
- C、皮肤弹性差
- D、眼窝凹陷
- E、恶心呕吐

答案：A

43、李某，男，68岁。因颈部蜂窝织炎入院，医嘱予气管切开。操作前，护士向其解释该措施的目的是预防

- A、窒息
- B、肺不张
- C、全身感染
- D、减轻疼痛
- E、化脓性海绵状静脉窦炎

答案：A

44、患者，男性，27岁。2天前因左手小指刺伤后引起甲沟皮下红肿疼痛，有波动感，目前患者最主要的护理问题是

- A、组织灌注量改变
- B、皮肤完整性受损
- C、有出血的危险
- D、疼痛
- E、知识缺乏

答案：D

45、抗休克最基本的治疗措施是

- A、应用缩血管药物
- B、补充血容量
- C、纠正酸中毒
- D、使用抗菌药
- E、给予强心药

答案：B

46、杨某，男，40岁。急性肠梗阻入院。主诉口渴、尿少。体检示：眼球下陷、脉细速、BP100/60mmHg。估计其脱水的性质和程度为

- A、中度等渗性脱水
- B、中度高渗性脱水
- C、中度低渗性脱水
- D、重度高渗性脱水
- E、重度低渗性脱水

答案：A

47、高渗性缺水最早的临床表现是

- A、皮肤弹性降低
- B、口腔黏膜干燥
- C、口渴

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/905123320303012032>