

题目	A 选项	B 选项	C 选项	D 选项	E 选项	
我国现存最古老的一部方书是	伤寒论	备急千金要方	五十二病方	黄帝内经	肘后备急方	C
构成方剂的要素中，除了组成药味外，最重要的是要具备	药物用量	剂型	服用方法	功用	主治病证	E
判断一个方剂优劣的主要依据是	方中用药味数多	方中使用名贵药材	方中用药味数少且用量小	方中药物配伍与所主病证病机对应	出自于名人或源自名方	D
最早记载治则、治法、组方配伍及服药宜忌等理论的医学著作是	五十二病方	汤液经法	黄帝内经	伤寒论	伤寒明理·药方论	C
中国医学史上首创方论的医学家是	汉·张仲景	晋·王叔和	唐·孙思邈	金·成无己	明·吴鹤皋	D
第一部阐述方剂制方学理的方剂学专著是	黄帝内经	医方考	备急千金要方	伤寒明理·药方论	金匱要略方论	B
中国历史上第一部由政府编制的中成药典是	五十二病方	太平惠民和剂局方	太平圣惠方	肘后备急方	普济方	B
最早归纳并系统论述“八法”的医学家是	汉·张仲景	唐·王焘	明·张景岳	清·汪昂	清·程钟龄	E
“八法”内容不包括	汗法、吐法	下法、清法	宣法、通法	清法、补法	和法、温法	C
下列各项中，不属于消法范畴的是	消导食积	通导大便	消痞化积	化痰利水	消疮散痈	B
不适宜下法治疗的病证是	宿食内停	实火顽痰	积水停饮	下焦蓄血	燥屎内结	A
以下不属于“七方”内容的项是	大方和小方	缓方和急方	复方或重方	奇方与偶方	单方与复方	E
由中药“十种”逐渐演变为方剂“十剂”的医书是	圣济经	本草衍义	本草拾遗	太平圣惠方	太平惠民和剂局方	B
“十剂”的内容不包括	轻、重	升、降	滑、涩	宣、通	补、泻	B
下列表述中的正确项是	每方必君、臣、佐、使俱全	方中每味药各针对一个症状	方中须有引经药味	君药在全方总药量中所占比例最大	方剂配伍应主次有序，分工合作，相与宣摄	E

能较好体现出中医组方原则内涵的表述是	辨证审因，随证立法，依法制方	方中诸药，主次有序，分工合作	方中“君臣佐使”四部分俱全	君药在方中必不可少	依法选药，主次有序，辅反成制，方证相应	E
下列与佐药含义不相关的项是	协助君臣药以加强其治疗作用的药物	用以消除或减低君臣药毒性的药物	直接治疗次要症状的药物	引导诸药至病所的药物	减低或缓和君臣药峻烈之性的药物	D
“君臣佐使”中臣药的含义涉及	治疗主证或主症	消除或减低君药的毒副作用	治疗次要症状	引经报使	治疗兼证	E
涉及“佐助药”含义的表述是	缓和君、臣药之峻烈	消除或减低君、臣药之毒性	协助君臣药治疗兼病或兼证	针对某些次要症状发挥治疗作用	引领全方药力达于病所	D
关于“君臣佐使”理论的正确理解是	“君臣佐使”是临证组方必须遵循的原则	“君臣佐使”要求组方中应力求君臣佐四部俱全	“君臣佐使”概括了典型方剂的基本结构及其药味的配伍关系	“君臣佐使”是由方中药物的性能来决定的	“君臣佐使”是由方证病机来决定的	C
君药分量大的含义是指君药	用药味数多	较方中其他药物的剂量大	占全方药量的较大比重	较之自身常用量大	药力或作用大	D
调和药性的含义是指	缓和君、臣药之峻烈	引领全方药力达于病所	和胃护中	在方中起矫味作用	协调方中不同药物的性能避免其相互牵肘	E
下列各项中属于方剂学“反佐”范畴的是	治热以寒	壮水制火	治寒以热	火郁发之	寒药热服	E
下列各项中不属于方剂学“相反相成”配伍范畴的是	制偏减毒	散敛同用	补泻并施	升降互用	刚柔相济	A
下列各项中属于方剂学“相反相成”配伍范畴的是	以泻代清	阴中求阳	补气生血	升阳散火	寓升于降	E
下列各项中不属于方剂学“异类相使”配伍范畴的是	麻黄配伍桂枝	青蒿配伍鳖甲	桂枝配伍芍药	柴胡配伍黄芩	黄芪配伍防己	A
下列与“方证相关”内涵不甚相关的项是	方剂的功效与方剂的主治病证有关	方内药味及其配伍关系与其所主病证的病机相对应	方剂与其主治证候不可分离	不同的方证之间具有关联性	方证的病机是组方用药的依据	D

治法对于方剂的重要性主要是因为	治法是方剂发展到一定阶段的产物	治法内容需要通过具体的方剂来体现	治法指导临床选方和组方用药	治法先于方剂而产生	治法与方剂的分类有关	C
方剂对于治法的关系表现为	成方的形成源自治法	方剂是治法的具体体现	方剂的分类常以治法为依据	临床根据治法选用成方	临床根据治法组方用药	B
方药关系的内涵可以概括为	方药离合	方以药成	方药相关	方药异同	先药后方	A
在下面有关方剂分类的各法中，与治法分类关系密切的是	病证分类	功效分类	临床科别分类	剂型分类	主方分类	B
活血祛瘀剂一般属于八法中的	消法	汗法	补法	下法	和法	A
下列各项中不符合传统丸剂特点的项是	不易变质	服用方便	吸收较为缓慢	药力比较持久	一般适用于慢性虚弱性病证	A
一般而言，服用解表发散方药的时间安排宜选择	空腹服用	餐前服用	餐后服用	晚睡前服用	晨起空腹	C
以下各类方剂中，适宜于制成水丸的是	补益剂	解表剂	泻下剂	祛痰剂	治燥剂	D
宜用武火煎煮的方剂类是	补益剂	解表剂	安神剂	治燥剂	和解剂	B
制备汤药最宜选择的器具是	银制器具	铝制器具	铁制器具	搪瓷器具	陶制或砂锅	E
麻黄汤组成中含有的药物是	桂枝、杏仁、炙甘草	防风、桂枝、炒白术	桂枝、荆芥、炙甘草	生姜、大枣、紫苏叶	生姜、大枣、炙甘草	A
九味羌活汤组成中不包含的药物是	防风、苍术	细辛、白芷	荆芥、秦艽	细辛、生地	川芎、甘草	C
小青龙汤组成中含有的药物	芍药、甘草、杏仁	杏仁、半夏、茯苓	茯苓、麻黄、桂枝	桂枝、甘草、生姜	干姜、细辛、五味子	E
银翘散组成中包含的药物有	菊花、桔梗、甘草	甘草、杏仁、荆芥	荆芥、豆豉、芦根	芦根、桑叶、杏仁	杏仁、甘草、薄荷	C
桑菊饮的组成药物包括	杏仁、桔梗、竹叶、薄荷	薄荷、连翘、葛根、芦根	芦根、银花、连翘、桔梗	桔梗、豆豉、荆芥、甘草	甘草、桔梗、芦根、葛根	A

银翘散组成中增强全方透表散邪作用的药味是	苦杏仁、淡竹叶	荆芥穗、淡豆豉	牛蒡子、生甘草	金银花、苦桔梗	薄荷、芦根	B
银翘散和桑菊饮的组成药物中均含有	连翘、杏仁、桔梗	银花、杏仁、桔梗	连翘、薄荷、芦根	豆豉、薄荷、芦根	桑叶、竹叶、桔梗	C
柴葛解肌汤的组成药物中不含有	羌活、白芷	白芷、桔梗	桔梗、黄芩	黄芩、芍药	芍药、升麻	E
升麻葛根汤的组成中含有的药物是	芦根、淡竹叶	知母、薄荷叶	芍药、炙甘草	蝉蜕、西河柳	桔梗、牛蒡子	C
败毒散中不涉及解表散邪意义的配伍药物是	柴胡、薄荷	川芎、前胡	羌活、独活	枳壳、人参	川芎、生姜	D
参苏饮与败毒散的组成中均含有的药物是	前胡、茯苓、炙甘草	羌活、独活、川芎	柴胡、川芎、葛根	木香、枳壳、桔梗	半夏、茯苓、人参	A
加减葳蕤汤的组成药物中不含有	玉竹、桔梗、炙草	炙草、薄荷、红枣	红枣、葛根、白薇	白薇、葱白、豆豉	豆豉、桔梗、薄荷	C
麻黄汤的功用是	解肌散邪，止咳平喘	解表宣肺，化痰平喘	宣肺降气，止咳化痰	宣肺化痰，止咳平喘	辛温发汗，宣肺平喘	E
桂枝汤的功用是	散寒解表，宣肺止咳	解肌散邪，调和营卫	发汗解表，透营达卫	发汗解表，宣肺平喘	解表散寒，祛风除湿	B
九味羌活汤的功用是	解肌发汗，调和营卫	宣肺散寒，通痹止痛	解表散寒，祛风除湿	发汗祛湿，兼清里热	祛风散寒，除湿止痛	D
小青龙汤的功用是	温肺化饮，止咳平喘	宣肺止咳，化痰平喘	解表散寒，宣肺平喘	解表散寒，兼清里热	解表散寒，温肺化饮	E
银翘散的功用是	解肌发表，清热解毒	疏散风热，宣肺止咳	辛凉透表，清热解毒	疏风解表，止咳化痰	辛凉宣泄，清肺平喘	C
桑菊饮的功用是	辛凉宣泄，清肺解毒	疏风解表，清肺化痰	疏风散热，宣肺止咳	宣肺利咽，化痰止咳	辛凉透表，清热解毒	C
银翘散与桑菊饮功用的主要差别是	解表散邪与宣肺止咳	透表清热与疏风宣肺	清热生津与解表散邪	透表散邪与清热解毒	辛凉透表与疏散风热	B
麻杏甘石汤的功用是	辛温发汗，宣肺平喘	辛凉透表，清热解表	辛凉宣泄，清肺平喘	疏风散热，宣肺止咳	清肺泻热，止咳平喘	C
柴葛解肌汤功用是	解肌发汗	解表透疹	解肌清热	疏风解表	辛凉解表	C

升麻葛根汤的功用是	疏散风热，养血活血	疏风宣肺，清热解毒	辛凉透表，清热利咽	疏风活血，解毒消疮	解肌散邪，清热透疹	E
九味羌活汤的功用是	温阳解表，祛风散寒	解肌散邪，调和营卫	辛温解表，兼清里热	滋阴解表，兼清虚热	益气解表，散寒除湿	C
败毒散的功用是	峻下热结，泻火解毒	清热泻火，凉血解毒	疏风散邪，清热解毒	解毒消痈，清热化痰	益气解表，散寒除湿	E
参苏饮的功用是	益气解表，祛风散寒	解肌发表，透疹解毒	扶正解表，祛风除湿	益气解表，理气化痰	助阳解表，祛风除湿	D
再造散的功用是	益气解表，祛风散寒	解肌发表，益气养血	助阳益气，解表散寒	滋阴益气，发汗解表	辛温散寒，祛风除湿	C
加减葳蕤汤的功用是	滋阴解表	养血解表	养阴润肺	滋阴养血	养阴清热	A
外感风寒，恶寒发热，头痛项强，肢体疼痛，无汗喘咳，舌苔薄白，脉浮紧者，治宜选用	麻黄汤	败毒散	大青龙汤	羌活胜湿汤	九味羌活汤	A
九味羌活汤主治病证的病因病机是	外感风寒湿邪，兼有气虚	外感风寒湿邪，内有蕴热	外感风寒，内停寒饮	外感风寒，内兼气滞	外感风寒，内伤湿滞	B
素有寒饮，复感风寒，水寒相搏，以致肺寒气逆，喘咳痰多者，治宜选用	苏子降气汤	三子养亲汤	定喘汤	小青龙汤	苓甘五味姜辛汤	D
桑菊饮主治病证的主要临床表现是	头痛身热，微恶风寒，无汗或有汗不多，口渴咽痛，舌尖红，脉浮数	风湿初起，但咳，身热不甚，口微渴	头痛发热，汗出恶风，鼻鸣干呕，脉浮缓	身热，咳逆气急，鼻翼扇动，心烦口渴，脉滑数	以上都不是	B
升麻葛根汤适用于	麻疹初起，未发或发而不透者	麻疹内陷，伴汗出肢冷，脉微者	麻疹透发不出，恶寒无汗，烦闷口渴者	麻疹紫赤暗滞，身灼热而烦渴谵语者	麻疹疹色淡红，隐而不透者	A
用以治疗外邪陷里所致之痢疾，并被喻嘉言称之为“逆流挽舟法”的方剂是	葛根芩连汤	黄芪建中汤	人参败毒散	防风通圣散	补中益气汤	C
再造散适用于	阳气虚弱，复感风寒者	气虚痰滞，外感寒湿者	气血不足，感冒风寒者	营血亏虚，外感风寒者	素体阴虚，外感风热者	A

桂枝汤中具有调和营卫作用的主要配伍是	桂枝与生姜	桂枝与芍药	大枣与甘草	生姜与甘草	芍药与大枣	B
桂枝汤原方服法要求“服已须臾，啜热稀粥一升余”，其意义在于	护中以防伤胃	助汗以促祛邪	防止过汗伤阴	防止过汗伤阳	扶正防邪内溃	B
小青龙汤中起温肺化饮作用的主要药物是	麻黄、桂枝	桂枝、细辛	细辛、干姜	干姜、五味子	芍药、五味子	C
小青龙汤中配伍干姜、细辛的主要用意是	温肺散寒	温肺化饮	散寒解表	温脾散寒	散寒通窍	B
下列各项中，不属于小青龙汤的配伍特点的是	辛散与酸收并用	温肺与散寒同施	解表与化饮相配	宣肺与降气并行	散寒与清里兼顾	E
银翘散中配伍荆芥穗、淡豆豉的意义是	宣郁发表、疏风泄热	解郁除烦、疏散风热	辛散解表、透邪外出	疏散风热、宣肺止咳	辛温解表，发散风寒	C
九味羌活汤中主要针对表寒病机的配伍的药物是	白芷、防风	防风、苍术	苍术、川芎	川芎、白芷	羌活、细辛	E
桂枝汤方中配伍芍药的意义在于	益营敛汗	养阴泄热	缓急止痛	平抑肝阳	补血养肝	A
升麻葛根汤中配伍升麻的主要意义是	疏散风热	升举清阳	清胃解毒	解肌透疹	引药上行	D
人参败毒散中配伍少量人参的主要用意是	益气生津以资汗源	健脾益气以助肺气	大补元气以扶虚衰	扶助正气助邪外出	使祛邪而不伤正气	D
人参败毒散的君药是	人参、柴胡	柴胡、川芎	前胡、茯苓	枳壳、桔梗	羌活、独活	E
麻杏甘石汤能宣泄肺热，其中麻黄与生石膏的配伍属于	相须为用	相使为用	相杀为用	相畏为用	相制为用	B
患者发热头痛，汗出恶风，鼻鸣干呕，苔薄白，脉浮缓。治宜选用	玉屏风散	防己黄芪汤	补中益气汤	桂枝汤	桑菊饮	D
患者素有寒饮，复感风寒，症见恶寒发热，无汗，喘咳痰多而稀，身体重痛，头面四肢浮肿，舌苔白滑，脉浮紧。治宜选用	苏子降气汤	麻黄汤	定喘汤	小青龙汤	苓甘五姜辛汤	D
素体阴虚，感受外邪，证见头痛发热，少汗，微恶风寒，咳嗽心烦，口渴咽干，舌红苔少，脉细浮数。治宜选用	升麻葛根汤	银翘散	败毒散	桑菊饮	加减葳蕤汤	E

患者感冒风寒后未及时治疗，次日恶寒渐轻而身热增盛，无汗头痛，并见目疼鼻干，心烦不眠，咽干耳聋，眼眶及眉棱骨痛，舌苔薄黄，脉浮微洪。治宜选用	麻黄杏仁甘草石膏汤	小柴胡汤	九味羌活汤	柴葛解肌汤	防风通圣散	D
患者某，男，4岁。咳嗽、精神不振二、三日，继而头面及胸部疹出隐隐，身热恶风，目赤羞明，眼泪汪汪，口渴，舌红脉数。治宜选用	桑菊饮	银翘散	柴葛解肌汤	加减葳蕤汤	升麻葛根汤	E
患者某，男，50岁。昨日起憎寒壮热，头项强痛，肢体痠痛，无汗，鼻塞声重，咳嗽有痰，胸膈痞闷，舌淡苔白，脉浮而按之无力。治宜选用	参苏饮	败毒散	再造散	柴葛解肌汤	九味羌活汤	B
患者某，外感风寒，恶寒发热，无汗肢冷，倦怠嗜卧，舌淡苔白，脉沉无力。用辛温发表药后汗不出，病情未见好转。治宜选用	四逆加人参汤	四逆汤	参苏饮	再造散	败毒散	D
患者身热不解，喘咳气逆，鼻翼扇动，微恶风寒，汗出不畅，心烦口渴，苔黄脉数。治宜选用	桑菊饮	银翘散	柴葛解肌汤	麻杏甘石汤	升麻葛根汤	D
下列有关辛凉解表剂组方不适宜的描述为	当首选疏散风热药	不宜配伍辛温药物	应适当配伍清热药	宜选配宣肺止咳药	稍佐以生津养液药	B
下列对扶正解表方的组方思路的描述中，最恰当的是	补益扶正+宣肺止咳+祛湿化痰	解表散邪+补益扶正+兼调里证	解表散邪+宣肺利咽+补益扶正	滋阴养血+疏风散邪+兼清虚热	温阳益气+解表散寒+温里祛寒	B
透疹解表方的配伍思路可概括为	解毒+清热+宣降肺气+止咳化痰+活血	透疹+宣肺+清泄里热+养阴生津+和中	解表+透疹+清泻肺热+养阴生津+和中	疹+宣肺+泻热通腑+和中+清热解毒	解表+透疹+养阴生津+和中+活血透络	B
按方证病机演变的规律，最有可能依序选用的方剂是	桂枝汤—麻黄汤—小青龙汤	银翘散—桑菊饮—麻杏甘石汤	麻黄汤—大青龙汤—麻杏甘石汤	大青龙汤—小青龙汤—麻杏甘石汤	桂枝汤—九味羌活汤—人参败毒散	C
方证病机中涉及风寒湿邪犯表的方剂有	麻黄汤与小青龙汤	银翘散与桑菊饮	大青龙汤与小青龙汤	加减葳蕤汤与七味葱白饮	九味羌活汤与人参败毒散	E
泻下剂通常宜选用的剂型是	汤剂	散剂	丸剂	酒剂	膏剂	A
泻下剂一般不宜用于	表证未解	肠燥便秘	热实风动	水热互结	邪实正虚	A

由大承气汤化裁为小承气汤属于	药味加减的变化	药量增减的变化	剂型更换的变化	药味加减与药量增减的合用	药味加减与剂型更换的合用	D
大黄附子汤的组成药物含有	桂枝	细辛	干姜	炮姜	甘草	B
温脾汤的组成药物中不包含	大黄	甘草	附子	人参	厚朴	E
三物备急丸的组成药物是	大黄、附子、细辛	大黄、干姜、细辛	巴豆、大黄、芒硝	附子、干姜、人参	巴豆、干姜、大黄	E
济川煎的组成药物中含有	生地、玄参	大黄、芒硝	麦冬、白芍	当归、苁蓉	麻仁、杏仁	D
麻子仁汤的组成药物中不含有	枳实	当归	杏仁	芍药	大黄	B
黄龙汤与增液承气汤的组成均含有的药物是	生地、人参	生地、麦冬	人参、当归	人参、甘草	大黄、芒硝	E
十枣汤的组成中含有	大黄、芒硝、甘遂	芒硝、甘遂、大戟	甘遂、大戟、芫花	大戟、芫花、大黄	芫花、大黄、牵牛子	C
大黄附子汤的功用是	逐寒通便，回阳救逆	温补脾阳，攻下冷积	温阳散寒，逐瘀通腑	温里散寒，通便止痛	温肾助阳，润肠通便	D
温脾汤的功用是	温中健脾，行气除满	攻下寒积，温补脾阳	温阳健脾，行气利水	温中散寒，健脾止泻	温脾暖胃，化湿和中	B
三物备急丸的功用是	峻泻热结	攻逐寒积	逐寒救逆	开窍醒神	回阳固脱	B
济川煎的功用是	温肾益精，润肠通便	滋阴增液，通便泻热	润肠泻热，行气通便	养阴清热，润肠通便	滋阴养血，润肠通便	A
麻子仁丸的功用是	温肾益精，润肠通便	滋阴增液，通便泻热	润肠泻热，行气通便	养阴清热，润肠通便	滋阴养血，润肠通便	C
黄龙汤的功用是	滋阴增液，泻热通便	泻热通便，益气滋阴	攻下热结，益气养血	温阳健脾，逐寒通便	补气养血，增液润肠	C
增液承气汤的功用是	滋阴增液，泻热通便	益气滋阴，泻热通便	滋阴养血，润肠通便	滋阴增液，润肠通便	润燥软结，泻热通便	A
十枣汤的功用是	补气健脾	益气补血	健脾养血	调养营卫	攻逐水饮	E

功用为攻下热结、益气养血的方剂是	增液承气汤	黄龙汤	济川煎	十枣汤	麻子仁丸	B
麻子仁丸、济川煎、增液承气汤都具有的功用是	滋阴	养血	行气	泻热	润肠	E
身热谵语，热结旁流，脐腹疼痛，按之坚硬有块，口干舌燥，舌苔黄燥起刺，脉滑实者，治宜选用	黄龙汤	大承气汤	增液承气汤	葛根芩连汤	新加黄龙汤	B
麻子仁丸适用于	阴虚便秘	血虚便秘	阳虚便秘	气虚便秘	燥热津亏便秘	E
胃肠燥热，津液不足，大便干燥而小便频数者，治宜选用	济川煎	增液汤	五仁丸	麻子仁丸	增液承气汤	D
热结里实，应下失下，气血大伤，症见大便秘结，脘腹胀满，硬痛拒按，身热谵语，身倦少气，口舌干燥，舌苔焦黑，循衣撮空，神昏肢厥者，治宜选用	大承气汤	小承气汤	调胃承气汤	黄龙汤	增液承气汤	D
阳阴温病，应下失下，气血大伤，阴液将竭，以致正虚不能运药，下之不通者，治宜选用	济川煎	增液汤	调胃承气汤	增液承气汤	新加黄龙汤	E
黄龙汤煎时加桔梗一撮的主要用意是	宣肺化痰	化痰利咽	宽胸利膈	引药力上行	宣肺以助通畅	E
黄龙汤的组成药物中含有	生地、玄参、麦冬	人参、当归、甘草	人参、当归、牛膝	当归、芍药、麦冬	生地、海参、玄参	B
患者日晡潮热，脐腹疼痛，按之坚硬有块，大便不通，偶可排出少许稀水，色青秽臭，口干舌燥，脉滑实。治宜选用	大柴胡汤	大承气汤	大建中汤	葛根芩连汤	大黄附子汤	B
患者腹痛便秘，胁下偏痛，发热，手足厥逆，苔白，脉弦紧。治宜选用	理中丸	四逆散	温脾汤	大黄附子汤	当归四逆汤	D
患者腹痛绕脐不止，大便秘而不通，手足欠温，苔白不渴，脉沉弦而迟。治宜选用	理中丸	温脾汤	大建中汤	小承气汤	大黄附子汤	B
患者某，女，35岁。平素月经过多，一月前分娩后，出现大便干燥，艰涩难解，小腹胀满，舌苔近常，脉稍细。治宜选用	小承气汤	济川煎	五仁丸	麻子仁丸	增液承气汤	C
患者某，男，65岁。腰膝酸软，大便干燥，艰涩难解，甚则秘结不通，小便清长，舌淡苔白，脉沉迟而弱。治宜选用	一贯煎	济川煎	五仁丸	六味地黄丸	麻子仁丸	B

患者多食易饥，大便干结难解，小便频数。治宜选用	济川煎	益胃汤	缩泉丸	清胃散	麻子仁丸	E
患者素体气血不足，新近外感数日，大便秘结，脘腹胀满，硬痛拒按，身热谵语，神倦少气，口舌干燥，舌苔焦黑。治宜选用	大承气汤	小承气汤	调胃承气汤	黄龙汤	增液承气汤	D
患者大便秘结，下之不通，脘腹胀满，口干唇燥，舌红苔黄，脉沉细数。治宜选用	济川煎	增液汤	麻子仁丸	调胃承气汤	增液承气汤	E
程氏，患结核性胸膜炎，症见咳唾胸胁引痛，心下痞硬，干呕短气，头痛目眩，脉沉弦。X线检查示右胸腔大量积液，纵隔左移。治宜选用	十枣汤	大陷胸汤	疏凿饮子	大承气汤	舟车丸	A
患者一身悉肿，尤以身半以下为重，腹胀喘满，二便不利，脉沉实有力。治宜选用	十枣汤	实脾散	五皮散	大陷胸汤	五苓散	A
五仁丸中用量较大的药味是	柏子仁	杏仁	郁李仁	陈皮	松子仁	D
下列方剂中，组成药物中含有薄荷、烧生姜的方剂是	逍遥散	银翘散	败毒散	柴葛解肌汤	加减葳蕤汤	A
小柴胡汤组成中含有的药物是	黄芩、干姜、大枣、茯苓、甘草、人参	党参、半夏、甘草、干姜、枳实、黄芩	黄芩、生姜、甘草、半夏、人参、大枣	黄连、甘草、党参、大枣、生姜、半夏	黄芩、黄芪、半夏、生姜、大枣、甘草	C
功用为透邪解郁、疏肝理脾的方剂是	四逆散	逍遥散	达原饮	小柴胡汤	柴葛解肌汤	A
功用为补脾泻肝、缓痛止泻的方剂是	温脾汤	逍遥散	四逆散	痛泻要方	当归芍药散	D
下列各项中，不属于四逆散证临床表现的是	胁肋胀闷	脘腹冷痛	泄利下重	小便不利	手足不温	B
生姜泻心汤的主治病证是	寒热错杂之痞证	水热互结之痞证	胃气虚弱之痞证	胃虚有热之痞证	痰热互结之痞证	B
小柴胡汤证的发热特征是	身热夜甚	入暮潮热	往来寒热	日晡潮热	夜热早凉	C
痛泻要方中配伍防风的主要用意是	祛风散寒	胜湿止痛	行气宽畅	补脾燥湿	散肝舒脾	E
逍遥散中配伍薄荷的用意是	疏肝散热	疏散风热	疏肝解郁	解毒利咽	清利头目	A

患者，男，43岁。患乙型肝炎半年余，症见两胁胀满，食欲不振，有时欲呕，口苦咽干，舌苔薄白，脉弦。治宜选用	四逆散	逍遥散	小柴胡汤	大柴胡汤	当归芍药散	C
患者，女，28岁。近患乳腺增生，乳房胀痛，两胁时痛，月经先后不定，头痛目眩，食少便溏，脉弦而虚。治宜选用	四逆散	逍遥散	小柴胡汤	柴胡疏肝散	当归芍药散	B
患者平时纳减腹胀，神疲乏力，近因恼怒生气，出现肠鸣腹痛，大便泄泻，泻必腹痛，舌苔薄白，脉两关不调，弦缓。治宜选用	四君子汤	参苓白术散	葛根芩连汤	痛泻要方	半夏泻心汤	D
患者，男，36岁。胃脘痛3个月，心下痞满，满而不痛，有时呕吐，肠鸣下利，舌苔微黄而腻，脉虚而缓。治宜选用	半夏泻心汤	小陷胸汤	吴茱萸汤	逍遥散	连朴饮	E
患者寒热往来，寒轻热重，胸胁胀痛，呕吐黄涎，小便黄少，舌红苔黄腻，脉弦滑数。治宜选用	达原饮	小柴胡汤	蒿芩清胆汤	大柴胡汤	加味道遥散	C
蒿芩清胆汤组成中含有的药物是	青蒿脑、淡竹叶	淡竹茹、薄荷脑	赤茯苓、生枳壳	白茯苓、陈广皮	仙半夏、益元散	C
普济消毒饮组成中含有的药物是	银花、连翘、竹叶	薄荷、玄参、丹皮	蝉蜕、柴胡、桔梗	僵蚕、陈皮、桔梗	升麻、马勃、青黛	D
下列方剂中，组成药物含有生地、知母的是	生脉散	玉女煎	九味羌活汤	犀角地黄汤	青蒿鳖甲汤	E
芍药汤与白头翁汤两方组成中均含有的药物是	甘草	黄芩	黄柏	黄连	大黄	D
下列方剂中，黄芩、黄连、黄柏同用的是	清营汤	凉膈散	黄连解毒汤	普济消毒饮	白头翁汤	C
当归六黄汤组成中用量需“加一倍”的药物是	生地	黄芪	当归	黄柏	熟地	B
竹叶石膏汤原方中麦冬与半夏的用量比例是	5:1	4:1	3:1	2:1	1:1	D
左金丸原方中黄连与吴茱萸的用量比例是	6:1	5:1	4:1	3:1	2:1	A
下列方剂中，具有清热解毒、疏风散邪功用的是	银翘散	凉膈散	升麻葛根汤	普济消毒饮	仙方活命饮	D
下列方剂中，具有清热生津、益气和胃功用的是	白虎汤	凉膈散	清络饮	竹叶石膏汤	清暑益气汤	D

导赤散的功用是	清心益气止淋	利水清热养阴	清心利水养阴	益气固表止汗	清热益气生津	C
青蒿鳖甲汤、清骨散、当归六黄汤三方都具有的作用是	清虚热	泻实火	通大便	利小便	散风热	A
芍药汤的功用是	清热解毒，凉血止痢	清热燥湿，调气和血	辛开苦降，调和寒热	发表散毒，升阳止痢	健脾益气，渗湿止泻	B
玉女煎的主治病证是	胃火上攻证	胃热阴虚证	脾胃伏火证	肝火犯胃证	脾胃湿热证	B
下列方剂中，可用治消谷善饥的是	一贯煎	玉女煎	健脾丸	六君子汤	黑逍遥散	B
下列方剂中，可用治蓄血发狂的是	玉女煎	清营汤	黄连解毒汤	清瘟败毒饮	犀角地黄汤	E
下列各项中，不属于竹叶石膏汤证临床表现的是	身热多汗	心胸烦闷	气逆欲呕	虚烦不寐	舌红苔腻	E
青蒿鳖甲汤证的发热特征是	午后低热	入暮潮热	身热夜甚	日晡潮热	夜热早凉	E
泻白散证的发热特征是	皮肤蒸热	入暮潮热	往来寒热	日晡潮热	夜热早凉	A
下列各项，不属于清营汤证临床表现的是	身热夜甚	时有谵语	斑疹隐隐	舌绛苔腻	脉细数	D
下列各项中，不属于龙胆泻肝汤证临床表现的是	耳聋	阴肿	筋痿	吞酸	口苦	D
下列方剂中，可用治黄疸的是	犀角地黄汤	蒿芩清胆汤	清瘟败毒饮	黄连解毒汤	仙方活命饮	B
龙胆泻肝汤中具有渗湿泄热作用的药物是	泽泻、车前子、茯苓	茯苓、车前子、木通	泽泻、车前子、木通	猪苓、茯苓、木通	茯苓、泽泻、猪苓	C
方药配伍体现“以泻代清”特点的方剂是	调胃承气汤	小承气汤	大承气汤	凉膈散	导赤散	D
下列方剂中，立法用药体现“行血则便脓自愈，调气则后重自除”的是	败毒散	温脾汤	芍药汤	白头翁汤	葛根芩连汤	C
白虎汤中配伍粳米、炙甘草的主要用意是	健脾益气	健脾止泻	益气和中	益胃生津	调和药性	D
清胃散中既有清热解毒作用，又寓“火郁发之”之意的药物是	黄连	生地	升麻	牡丹皮	当归身	C

玉女煎中配伍牛膝的主要用意是	导热下行	补肝柔筋	补肾壮骨	活血祛瘀	利水通淋	A
清营汤中体现“透热转气”配伍的药物是	银花、生地	连翘、黄连	银花、麦冬	银花、连翘	黄连、银花	D
方药配伍寓有“火郁发之”之意的方剂是	清胃散	玉女煎	白虎汤	清营汤	犀角地黄汤	A
方药配伍寓有“通因通用”之意的方剂是	玉女煎	清胃散	凉膈散	芍药汤	芩茎汤	D
患者高热不退，面色红赤，汗出恶热，渴欲饮水，舌红，脉洪大有力。治宜选用	白虎汤	银翘散	清营汤	竹叶石膏汤	麻黄杏仁甘草石膏汤	A
患者身热多汗，心胸烦闷，气逆欲呕，口干喜饮，虚烦不寐，舌红少苔，脉虚数。治宜选用	生脉散	白虎加人参汤	青蒿鳖甲汤	清暑益气汤	竹叶石膏汤	E
患者身热夜甚，神烦少寐，时有谵语，舌绛而干，脉细数。治宜选用	凉膈散	清营汤	黄连解毒汤	竹叶石膏汤	犀角地黄汤	B
患者大热烦躁，口燥咽干，错语不眠，衄血发斑，舌红苔黄，脉数有力。治宜选用	大承气汤	犀角地黄汤	黄连解毒汤	清瘟败毒饮	白虎汤	C
患者咳嗽气急，皮肤蒸热，日晡尤甚，舌红苔黄，脉细数。治宜选用	止嗽散	泻白散	定喘汤	九仙散	麻杏甘石汤	B
患者烦燥口渴，面赤唇焦，胸膈烦热，口舌生疮，便秘尿黄，舌红苔黄，脉滑数。治宜选用	凉膈散	导赤散	白虎汤	小承气汤	黄连解毒汤	A
患者牙痛牙宣，时有出血，面颊发热，口气热臭，口干舌燥，舌红苔黄，脉滑数。治宜选用	清胃散	玉女煎	凉膈散	调胃承气汤	黄连解毒汤	A
患者腹痛，里急后重，下痢脓血，赤多白少，肛门灼热，渴欲饮水，舌红苔黄，脉弦数。治宜选用	芍药汤	大承气汤	白头翁汤	黄连解毒汤	葛根芩连汤	C
患者大热渴饮，头痛如劈，干呕狂躁，谵语发斑，舌绛唇焦，脉浮大而数。治宜选用	白虎汤	清营汤	黄连解毒汤	犀角地黄汤	清瘟败毒饮	E
下列各项中，属于新加香薷饮组成药物的是	连翘、薏苡仁	连翘、白蔻仁	薄荷、白扁豆	厚朴、白扁豆	厚朴、鲜扁豆花	E
清暑益气汤（《温热经纬》）组成中含有的药物是	人参、麦冬	荷梗、黄连	连翘、竹叶	知母、党参	天冬、西洋参	B
六一散的功用是	清暑利湿	疏风解暑	清暑益气	清热解暑	清心解暑	A

下列各项中，属于清暑益气汤（《温热经纬》）功用的是	和胃止呕	化气利湿	养阴生津	解表化湿	除湿健脾	C
下列方剂中，主治证候阴暑证的是	杏苏散	桑杏汤	参苏饮	香薷散	益元散	D
感受暑热，身热心烦，体倦少气，汗多口渴，脉虚数，治宜选用	竹叶石膏汤	王氏清暑益气汤	李氏清暑益气汤	白虎加人参汤	清络饮	B
由蜀椒、干姜、人参、胶饴组成的方剂是	四逆散	四逆汤	小建中汤	大建中汤	当归四逆汤	D
下列方剂中，组成药物含有干姜的是	桂枝汤	吴茱萸汤	小建中汤	大建中汤	黄芪桂枝五物汤	D
小建中汤的君药是	白芍	饴糖	桂枝	生姜	大枣	B
下列方剂中重用生姜的是	桂枝汤	败毒散	吴茱萸汤	小建中汤	小柴胡汤	C
吴茱萸汤和理中丸两方组成中均含有的药物是	人参	干姜	大枣	白术	甘草	A
下列方剂组成中不含有生姜、大枣的是	桂枝汤	理中丸	吴茱萸汤	小建中汤	黄芪桂枝五物汤	B
小建中汤原方中芍药与桂枝的用量比例为	5:1	4:1	3:1	2:1	1:1	D
吴茱萸汤的功用是	温脾暖胃，降逆止呕	温脾和胃，降逆止痛	温脾补肾，缓急止泻	温肝补肾，行气止痛	温肝暖胃，降逆止呕	E
当归四逆汤的功用是	温阳补血，散寒通滞	益气温经，和血通痹	温经散寒，养血祛瘀	温经散寒，养血通脉	温经补虚，化瘀止痛	D
黄芪桂枝五物汤的主治病证是	丹毒	阴疽	暗痹	中风	血痹	E
下列方剂中，可用治阳虚失血证的方剂是	吴茱萸汤	大建中汤	小建中汤	理中丸	四逆汤	D
吴茱萸汤证的病位是	心肾	肝肾	脾肺	肝胃	脾胃	D
下列各项中，不属于理中丸主治病证的是	胸痹	失眠	崩漏	呕吐	小儿慢惊	B
下列各项，不属于四逆汤证临床表现的是	四肢厥逆	腹痛下利	面色苍白	神衰欲寐	脉弦而紧	E

理中丸的配伍特点是	培后天以养先天	温阳与补血并用	寓补益于温降之中	温补并用，以温为主	温补并用，以补为主	D
一女性患者，平素月经滞后，行经时小腹疼痛，喜温柔按，入冬后手足冻疮，肢冷畏寒，舌淡苔薄白，脉细迟。治宜选用	四逆汤	四逆散	逍遥散	当归四逆汤	小建中汤	D
患者腹中挛痛，喜温揉按，面色无华，时有心悸不宁，手足烦热，咽干口燥，舌淡苔白，脉细弦而缓。治宜选用	大建中汤	小建中汤	理中丸	吴茱萸汤	炙甘草汤	B
患者胃脘冷痛，胸膈满闷，食后欲呕，吞酸嘈杂，四肢不温，舌淡苔白滑，脉沉迟。治宜选用	大建中汤	小建中汤	理中丸	吴茱萸汤	四逆汤	D
患者素体阳气不足，汗出当风，遂致肌肤麻木不仁，脉微涩而紧。治宜选用	阳和汤	当归四逆汤	黄芪桂枝五物汤	桂枝汤	玉屏风散	C
患者倦怠乏力，食少便溏，四肢不温，皮下瘀斑，色淡暗，舌淡苔薄白，脉沉迟。治宜选用	归脾汤	参苓白术散	理中汤	当归四逆汤	胶艾四物汤	C
大柴胡汤与小柴胡汤中均含有的药物是	黄芩、半夏	人参、生姜	枳实、白芍	大黄、柴胡	大枣、炙甘草	A
集汗、下、清、补四法于一方的方剂是	大柴胡汤	防风通圣散	九味羌活汤	葛根芩连汤	调胃承气汤	B
组成中不含有黄芩的方剂是	痛泻要方	小柴胡汤	大柴胡汤	半夏泻心汤	防风通圣散	A
大柴胡汤重用生姜，是由于症见	呕不止	胸胁苦满	郁郁微烦	往来寒热	心下痞鞭	A
葛根芩连汤与小柴胡汤中均含有的药物是	大黄	人参	枳实	黄芩	半夏	D
葛根芩连汤的主治证是	表邪未解，邪热入里证	表邪未解，湿浊内阻证	表邪已解，邪热入里证	表邪未解，内伤食积证	表邪未解，寒热错杂证	A
患者症见身热下利，泻下秽臭大便，肛门灼热，胸脘烦热，口渴，汗多，舌红苔黄，脉滑数。治宜选用：	槐花散	四逆散	大柴胡汤	白头翁汤	葛根芩连汤	E
患者症见往来寒热，腹痛便秘，舌红苔黄，脉弦数，治宜选用	银翘散	桑菊饮	大柴胡汤	麻杏甘石汤	防风通圣散	C
补中益气汤和参苓白术散中均含有的药物是	茯苓、桔梗	当归、陈皮	黄芪、甘草	白术、人参	山药、升麻	D

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/905132143123011322>