北京住院医师儿外科Ⅰ阶段《小儿骨科测试题》模拟练习卷

姓名:_____ 年级:_____ 学号:_____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

1、单项选择题：50 岁，男性，外伤后致胫腓骨中下 1/3 开放性骨折，经治疗，3 个月后复查 X 线片见骨折端略有移位，骨折线清晰，你认为影响骨折愈合的最主要的原因是（　）。A.年龄较大

B.骨折段血液供血不足

C.伤口有感染

D.周围软组织挫伤严重

E.骨折复位不良

2、单项选择题：青年女性，左小腿被车轮轧伤，患肢明显肿胀，X 线片示，左胫骨中段骨折，行石膏托外固定，在观察早期骨筋膜室综合征时，哪项体征更有意义（　）。A.足背动脉搏动是否消失

B.小腿及足部的皮肤温度和颜色

C.患肢肿胀的程度

D.有无感觉障碍

E.患肢有无静息痛，足趾被动伸直有无障碍，伸趾时是否加剧疼痛

3、单项选择题：有关周围神经药物注射伤的机制，以下哪项不正确（　）。A.针刺可造成直接损伤

B.针刺可引起神经束内血肿压迫损伤

C.药物的毒性作用可引起神经粘连变性

D.药物注入神经束内导致压力升高压迫损伤

E.合并化脓性感染最为常见

4、单项选择题：骨与关节结核病因及病理哪项是不正确的（　）。A.抵抗力、免疫力差者易发生

B.95%以上继发于肺结核

C.是一种血行引起的慢性感染性疾病

D.股骨干血运差，易发生皮质骨结核

E.松质骨结核可分中央型和边缘型

5、单项选择题：男性 54 岁，车祸，右胫腓骨中 1/3 粉碎骨折，复位后夹板固定，因右小腿肿胀足趾剧烈疼痛伤后 36h 转诊，检查：右足趾明显肿胀，青紫，感觉麻木，足趾活动差，毛细血管充盈尚存在，取除夹板见右小腿肿胀甚，皮温较高且皮肤有水疱出现，考虑并发最可能为（　）。A.腓总神经损伤

B.胫前动脉损伤

C.胫后动脉损伤

D.胫动脉损伤

E.骨筋膜室综合征

6、单项选择题：患儿女性，4岁，因肘部外伤并肿胀，活动障碍急诊入院。查体：肘部肿胀明显，可见皮下淤斑。据X线片诊断为肱骨髁上骨折。患者手部尺侧皮肤感觉消失，拇指不能内收，余四指并指无力，考虑诊断为（　）。A.正中神经损伤

B.尺神经损伤

C.桡神经损伤

D.正中神经返支损伤

E.桡神经浅支损伤

7、单项选择题：化脓性关节炎与关节结核的关节液区别点在于（　）。A.黏稠度

B.臭味

C.白细胞总数及中性粒细胞所占比例

D.积液量的多少

E.红细胞量的多少

8、单项选择题：骨折整复的原则是（　）。A.近端对远端

B.远端对近端

C.两端互对

D.两端相互重叠

E.两端分离

9、单项选择题：有关骨折的愈合，下列哪项不正确（　）。A.多次手法复位不利于骨折愈合

B.手术比手法复位更能增加愈合机会

C.骨牵引过度可造成延迟愈合或不愈合

D.内固定和外固定不充分不利于愈合

E.适当功能练习有利于愈合

10、单项选择题：小儿股骨上端急性骨髓炎并发化脓性髋关节炎的主要途径是（　）。A.血行感染

B.脓肿穿破骺板进入关节

C.脓肿穿破干骺端骨皮质进入关节

D.骨膜下脓肿破入关节

E.软组织脓肿破入关节

11、单项选择题：脊柱侧弯的程度进展的危险因素不包括（　）。A.青春期前少年

B.双主侧弯

C.神经麻痹型侧弯

D.Risser指数5级

E.胸椎侧弯进展可能性一般大于腰椎侧弯

12、单项选择题：桡骨上1/3骨折手术注意不要损伤以下哪个神经（　）。A.桡神经深支

B.桡神经浅支

C.正中神经

D.尺神经

E.以上都不正确

13、单项选择题：钴铬钼合金的最显著特点是（　）。A.价格低

B.耐蚀性好

C.耐磨性好

D.生物相容性好

E.耐疲劳性好

14、单项选择题：膝关节前交叉韧带损伤，以下正确的是（　　）。A.主诉膝关节有疼痛性弹响

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/906054033021010123