2024河南省淇县《执业药师之西药学专业二》资格考试大全及1套完整答案

第Ⅰ部分 单选题（100题）

1.可与抗凝药发生相互作用的是

A：丙酸睾酮

B：伐地那非

C：呋塞米

D：坎利酮

答案：A

2.用于单纯饮食控制及体育锻炼治疗无效的2型糖尿病的降糖药物是

A：阿卡波糖

B：二甲双胍

C：格列本脲

D：罗格列酮

答案：B

3.蛋白结合率较高（>70%）的头孢菌素类是

A：头孢噻肟

B：头孢吡肟

C：头孢曲松

D：头孢呋辛

答案：C

4.精神紧张、情绪恐惧所致的失眠宜选用

A: 谷维素
B: 氟西泮
C: 氯美扎酮
D: 夸西泮
答案：C

5.（2019 年真题）长期大量使用可致泌尿系统尿酸盐、半胱氨酸盐或草酸盐结石的维生素是（）
A: 维生素 A
B: 维生素 B6
C: 维生素 B2
D: 维生素
答案：D

6.喷托维林与水合氯醛合用会出现
A: 支气管平滑肌痉挛
B: 精神症状
C: 反射亢进，异常发热、昏睡
D: 中枢神经系统和呼吸系统抑制作用增强
答案：D

7.下列属于二磷酸腺苷 P2Y12 受体阻断药的是()
A: 阿替普酶
B: 双嘧达莫
C: 阿司匹林
D: 氯吡格雷
答案：D

8.糖皮质激素对血液系统的影响不包括

A：使血小板数量下降

B：减少淋巴细胞

C：使红细胞含量增加

D：提高纤维蛋白原浓度

答案：A

9.患者，男性，26岁，因“咳嗽、咳痰伴间断发热1周”入院，查体：T38．9℃，P90次／分，R21次／分，BP110／70mmHg，血常规：白细胞16．9×109／L，中性粒细胞百分比84．6%；胸部CT示右下肺炎症。诊断为“右侧肺炎”，入院后使用莫西沙星和氨溴索治疗。

A：替考拉宁

B：阿米卡星

C：头孢哌酮

D：头孢曲松

答案：A

10.治疗绝经后妇女的骨质疏松选用

A：阿法骨化醇

B：奥利司他

C：鲑降钙素

D：阿仑膦酸钠

答案：D

11.主要经肝脏代谢，受肾功能影响小，可用于肾功能不全患者的强心苷是

A：洋地黄毒苷

B：去乙酰毛花苷（西地兰D）

C: 毛花苷丙（西地兰C）

D: 地高辛

答案：A

12.空腹血糖较高者可选用()

A: 格列喹酮

B: 格列齐特

C: 格列吡嗪

D: 胰岛素

答案：B

13.铜绿假单胞菌性结膜炎常用

A: 多黏菌素B滴眼液

B: 金霉素眼膏

C: 夫西地酸滴眼剂

D: 1%泼尼松滴眼液

答案：A

14.静脉滴注过快易发生红人综合征的是()

A: 阿奇霉素

B: 庆大霉素

C: 万古霉素

D: 克林霉素

答案：C

15.可致前庭、耳蜗神经功能障碍，妊娠期妇女和新生儿禁用的抗菌药物是

A: 酰胺醇类(氯霉素)

B：氨基糖苷类

C：四环素类

D：林可霉素类

答案：B

16.药粉误入眼内可能引起或加重窄角型青光眼、眼睛疼痛或不适、短暂视物模糊、视觉晕轮或彩色影像的是

A：沙丁胺醇

B：喷托维林

C：氨溴索

D：噻托溴铵

答案：D

17.（2016年真题）耐甲氧西林金黄色葡萄菌感染宜首选的抗菌药物是

A：利奈唑胺

B：头孢他啶

C：罗红霉素

D：头孢曲松

答案：A

18.需要内因子辅助吸收的维生素是

A：维生素B12

B：维生素B6

C：叶酸

D：烟酸

答案：A

19.下述关于抗皮肤寄生虫感染药物的描述中，不正确的是

A: 苯甲酸苄酯高浓度可杀灭疥虫

B: 升华硫具有杀灭细菌、真菌及杀虫的作用

C: 克罗米通具有局部麻醉作用

D: 林旦是杀灭疥虫的有效药物，但不能灭虱卵

答案：D

20.（2019年真题）对磺胺类药物有严重过敏史的患者可选择的利尿剂是（）

A: 托拉塞米

B: 布美他尼

C: 依他尼酸

D: 呋塞米

答案：C

21.长期、大剂量服用维生素D，可能引起的不良反应是

A: 高钙血症

B: 血栓性静脉炎

C: 颅内压升高

D: 高胆红素血症

答案：A

22.对胰岛素产生耐受者选用

A: 胰岛素

B: 二甲双胍

C: 丙硫氧嘧啶

D: 格列本脲

答案：D

23.关于维生素用药时间的说法正确的是

A：水溶性维生素应该在餐后服用，脂溶性维生素应该在餐中服用

B：水溶性维生素应该在餐前服用，脂溶性维生素应该在餐后服用

C：水溶性维生素和脂溶性维生素都应该在餐后服用

D：水溶性维生素和脂溶性维生素都应该在餐前服用

答案：A

24.减鼻充血药通常用于缓解鼻塞症状其所激动的受体是（）

A：α 受体

B：M 受体

C：N 受体

D：H 受体

答案：A

25.用于抗艾滋病病毒的药物是

A：利巴韦林

B：更昔洛韦

C：拉米夫定

D：阿昔洛韦

答案：C

26.下述不属于质子泵抑制剂的是

A：法莫替丁

B：泮托拉唑

C：雷贝拉唑

D：奥美拉唑

答案：A

27.关于普萘洛尔抗心律失常作用的描述，错误的是()

A：对一般室性心律失常无效

B：对室性和室上性心律失常都有效

C：主要通过阻断 β 受体对心脏产生作用

D：用于治疗与交感神经兴奋有关的心律失常

答案：A

28.可增强吗啡对平滑肌的松弛作用的药物是

A：纳洛酮

B：苯甲酸钠咖啡因

C：氟马西尼

D：阿托品

答案：D

29.患者，男，80 岁。因慢性心功能不全、同时伴有双下肢水肿住院。能充分控制心衰患者液体潴留的药物是

A：血管紧张素转换酶抑制剂

B：肾素抑制剂

C：利尿剂

D：β 受体阻断剂

答案：C

30.对耐药金黄色葡萄球菌感染有效的 β-内酰胺类抗生素是()

A：苯唑西林

B：喹诺酮类

C：甲硝唑

D：四环素

答案：A

31.（2016 年真题）哮喘急性发作首选的治疗药物是

A: 短效 β2 受体激动剂

B: 白三烯受体阻断剂

C: 磷酸二酯酶抑制剂

D: 吸入性糖皮质激素

答案：A

32.可使双膦酸盐的吸收下降，服用双膦酸盐后 2 小时内避免食用的是

A: 沙利度胺

B: 高钙食品

C: 萘普生

D: 抗血管生成药

答案：B

33.属于阴道杀精药的是

A: 左炔诺孕酮

B: 壬苯醇醚

C: 氯地孕酮

D: 米非司酮

答案：B

34.分子中含有强碱性基团，可与肝素分子中的硫酸根迅速结合，形成无活性的稳定复合物，使肝素失去抗凝活性的是

A: 维生素 K1

B: 酚磺乙胺

C: 氨甲环酸

D: 鱼精蛋白

答案：D

35.下列药物与甲氧氯普胺合用，可增加锥体外系不良反应风险的是

A：阿昔洛韦

B：干扰素

C：奥司他韦

D：金刚烷胺

答案：D

36.变异型心绞痛不宜选用的是

A：普萘洛尔

B：胍乙啶

C：硝酸甘油

D：硝苯地平

答案：A

37.（2016年真题）患者，女，56岁，血清总胆固醇和低密度脂蛋白胆固醇异常，初诊医师建议首先改变生活方式（控制饮食、增加运动）。一个月后复查血脂水平仍未达标，医师处方辛伐他丁片20mg/d治疗

A：CK

B：Cr

C：BUN

D：Hcy

答案：A

38.可加速硝基咪唑类药物清除，使血药浓度下降的是

A：替硝唑+苯巴比妥

B：奥硝唑+乙醇

C：甲硝唑+乙醇

D：替硝唑+华法林

答案：A

39.为避免继发真菌感染，使用后应立即漱口的药物是

A：羧甲司坦口服液

B：沙丁胺醇气雾剂

C：孟鲁司特片

D：布地奈德福莫特罗吸入剂

答案：D

40.（2015年真题）干扰肿瘤细胞转录过程和阻止RNA合成的抗肿瘤药是（）。

A：多西他赛

B：氟尿嘧啶

C：多柔比星

D：伊立替康

答案：C

41.铁剂用于治疗

A：再生障碍性贫血

B：巨幼红细胞性贫血

C：溶血性贫血

D：小细胞低血红蛋白性贫血

答案：D

42.可用维生素B6防治的异烟肼的不良反应是

A：肝损伤
B：胃肠道反应
C：周围神经炎
D：过敏反应
答案：C

43.（2015年真题）我国研制的没有“金鸡纳”反应的抗疟药是（）。
A：伯氯喹
B：青蒿素
C：氯喹
D：奎宁
答案：B

44.正常成人一次口服20mg/kg，1小时后血清中浓度达到最高，血浆半衰期为2小时，连续服药7日未见蓄积倾向，进入体内后在骨及肾脏中浓度最高，随尿液排出8%～16%，随粪便排出82%～94%的是
A：依替膦酸二钠
B：唑来膦酸
C：阿仑膦酸钠
D：帕米膦酸二钠
答案：A

45.（2017年真题）可以引起耳蜗神经、肾损害的药物是（）
A：加替沙星
B：甲砜霉素
C：多西环素
D：庆大霉素
答案：D

46.脂溶性较高，起效快，属于巴比妥类的镇静催眠药是()。

A: 佐匹克隆

B: 异戊巴比妥

C: 阿普唑仑

D: 地西泮

答案：B

47.有机磷酸酯中毒的解救宜选用

A: 多潘立酮

B: 阿托品

C: 纳洛酮

D: 鱼精蛋白

答案：B

48.主要治疗双相情感障碍躁狂发作，宜选用的药物是

A: 氯氮平

B: 阿立哌唑

C: 利培酮

D: 碳酸锂

答案：C

49.下述属于外周性多巴胺D2受体阻断剂的是

A: 西沙必利

B: 莫沙必利

C: 甲氧氯普胺

D: 多潘立酮

答案：D

50.可与吸入性糖皮质激素合用的长效 M 胆碱受体阻断剂是

A: 孟鲁司特

B: 噻托溴铵

C: 多索茶碱

D: 沙美特罗

答案：B

51.（2015 年真题）属于凝血因子 Xa 直接抑制剂的抗凝药是（）。

A: 依诺肝素

B: 肝素

C: 利伐沙班

D: 华法林

答案：C

52.依普黄酮可用于

A: 低钙血症者

B: 儿童及青少年

C: 妊娠期及哺乳期妇女

D: 绝经期超过 2 年以上的妇女

答案：D

53.（2015 年真题）属于膨胀性泻药的是（）。

A: 酚酞

B: 甘油（开塞露）

C: 聚乙二醇 4000

D: 乳果糖

答案：C

54.头孢哌酮的主要清除途径是

A：主要经肝脏清除

B：经肝、肾双途径清除

C：主要经肾脏排泄

D：主要经呼吸道排泄

答案：B

55.（2018年真题）可与PPI、铋剂联合使用治疗幽门螺杆菌感染的药物是（）

A：大观霉素

B：替考拉宁

C：美罗培南

D：克拉霉素

答案：D

56.半合成青霉素类中，属于广谱青霉素类的是()

A：甲氧西林

B：羧苄西林

C：替莫西林

D：氨苄西林

答案：D

57.舒张支气管作用比β2受体激动剂弱且慢，但不易产生耐受性，适用于有吸烟史的老年哮喘患者的药物是

A：吸入性糖皮质激素

B：沙丁胺醇

C：噻托溴铵

D: 孟鲁司特

答案：C

58.茶碱浓度 20μg/ml 时会出现

A: 呼吸、心跳停止

B: 心动过速、心律失常

C: 为有效的治疗浓度

D: 恶心、呕吐、失眠

答案：B

59.（2016 年真题）抗乙型肝炎病毒的药品是

A: 拉米夫定

B: 伊曲康唑

C: 奥司他韦

D: 利巴韦林

答案：A

60.硫酸亚铁的适应症是

A: 产后大出血

B: 恶性贫血

C: 巨幼细胞贫血

D: 缺铁性贫血

答案：D

61.（2017 年真题）患者，男，62 岁。高血压病史 10 年，既往有骨关节炎和血脂异常，轻度心功能不全。近期体检发现血压 162mmHg，心率 72 次/分。该患者目前服用药物除抗高血压药外有辛伐他汀、双氯芬酸、氨基葡萄糖、甲钴胺及碳酸钙 D。

A：硝酸甘油+美托洛尔

B：氨氯地平+氢氯噻嗪

C：特拉唑嗪+氢氯噻嗪

D：利血平+氨苯蝶啶

答案：B

62.患者，男，63岁，2型糖尿病病史20年，现服用二甲双胍0．5g，一日3次；阿卡波糖0．1g，一日3次；吡格列酮30mg，一日1次。既往高血压病史5年，冠心病病史5年，心功能Ⅰ级轻度肾功能不全，长期服用贝那普利和阿司匹林。

A：肠道外用药宜静脉给药，不主张肌内注射

B：应用前应询问药物过敏史，对磺胺药过敏者不宜使用

C：静脉用药剂量为口服的1／2时即可达到同样疗效

D：静脉注射时宜用葡萄糖注射液稀释

答案：D

63.维A酸类药物不能用于下述哪种疾病()

A：光敏性皮肤病

B：扁平疣

C：银屑病

D：角化性皮肤病

答案：A

64.氟替卡松吸入气雾剂用于中度哮喘时的用法和用量为

A：一次500～1000μg，一日2次

B：一次50～100μg，一日2次

C：一次100～250μg，一日2次

D：一次250～500μg，一日2次

答案：D

65.下列药物中属于抗纤维蛋白溶解药的是

A：卡巴克络

B：维生素K

C：氨甲环酸

D：酚磺乙胺

答案：C

66.依诺沙星与华法林合用

A：药理作用拮抗

B：不良反应叠加

C：后者血药浓度升高，不良反应增加

D：后者血药浓度下降，药效降低

答案：C

67.单独应用时止吐作用相对较弱，主要作为辅助药物，用于减轻地塞米松所致焦虑和甲氧氯普胺所致静坐不能，也可用于减少预期性的化疗所致恶心呕吐的是

A：帕洛诺司琼

B：甲氧氯普胺

C：氯丙嗪

D：劳拉西泮

答案：D

68.下列属于重组人促红素的禁忌证的是()

A：心律失常

B：中性粒细胞减少

C：低血压

D：难以控制的高血压

答案：D

69.需慎用司坦唑醇的是()

A：肝、肾病患者

B：高血压患者

C：代谢性酸中毒患者

D：低血压患者

答案：A

70.可增加溶血性尿毒症的发生危险的是

A：红霉素

B：他莫昔芬

C：氯丙嗪

D：维生素C

答案：B

71.患者，男，24岁，诊断为右睾丸非精原细胞瘤术后，治疗方案为依托泊苷+顺铂+博来霉素。

A：骨髓功能抑制者

B：心肝肾功能严重障碍者

C：慢性胃炎

D：妊娠期妇女

答案：C

72.（2021年真题）一对年轻夫妇计划出国旅游，出发前，准备选购以下治疗腹泻的药物备用，包括蒙脱石、口服补液盐、双歧杆菌三联活菌、洛哌丁胺，小檗碱。

A: 口服补液盐是复方制剂，II、II代表不同的配方

B: 口服补液盐使用方便、价格低廉，发生腹泻时如能口服，应尽早使用

C: 腹泻导致重度脱水时首选静脉补液，情况稳定后可更换为口服补液盐治疗

D: 口服补液盐II是等渗性口服补液盐

答案：D

73.伴有前列腺增生的哮喘患者不宜选用的药物是

A: 白三烯受体阻断剂

B: M胆碱受体阻断剂

C: 长效B2受体激动剂

D: 磷酸二酯酶抑制剂

答案：B

74.阿莫罗芬属于

A: 吗啉类

B: 抗生素类

C: 唑类

D: 丙烯胺类

答案：A

75.促进钙剂吸收可选用

A: 葡萄糖酸钙

B: 阿法骨化醇

C：阿仑膦酸钠

D：依降钙素

答案：B

76.降低肾素活性最强的药物是

A：硝苯地平

B：普萘洛尔

C：卡托普利

D：可乐定

答案：B

77.属于植物制剂，用于治疗前列腺增生的药物是()

A：特拉唑嗪

B：非那雄胺

C：十一酸睾酮

D：普适泰

答案：D

78.治疗耐药金黄色葡萄球菌所致的感染或β-内酰胺类过敏患者的G+菌严重感染，首选药物是

A：克林霉素

B：万古霉素

C：红霉素

D：替硝唑

答案：B

79.为预防大剂量环磷酰胺引起的膀胱毒性，在充分水化，利尿的同时，还应给予的药物是（）

A: 美司钠
B: 氯化钾
C: 螺内酯
D: 二甲双肌
答案：A

80.不属于抗乙型肝炎病毒的药品
A: 干扰素
B: 恩替卡韦
C: 拉米夫定
D: 泛昔洛韦
答案：D

81.患者，男，35岁，农民。感觉头昏乏力入院。查体：粪中钩虫卵(+++)，血红蛋白60g/L，诊断为钩虫感染、缺铁性贫血。
A: 琥珀酸亚铁
B: 叶酸
C: 蔗糖铁
D: 硫酸亚铁
答案：C

82.天然的雌激素是()
A: 戊酸雌二醇
B: 雌二醇
C: 黄体酮
D: 炔雌醚
答案：B

83.苯巴比妥与口服抗凝药合用()

A：子宫内膜突破性出血

B：代谢加速而导致意外怀孕

C：抑制排酸作用

D：代谢加快而失效

答案：D

84.延长动作电位时程的广谱抗心律失常药物是()

A：胺碘酮

B：维拉帕米

C：美西律

D：奎尼丁

答案：A

85.下列关于吉非替尼的描述，错误的是

A：用于治疗经含有铂类或多西他赛治疗失败的晚期非小细胞肺癌患者

B：与传统化疗药存在交叉耐药

C：用药期间应监测肝肾功能

D：常见典型不良反应是皮肤毒性、腹泻

答案：B

86.（2021年真题）患者，男，54岁。拟行膝关节置换术，围手术期宣选用的预防用抗菌药物（）

A：头孢唑林

B：头孢噻肟

C：头孢他啶

D：头孢曲松

答案：A

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：
https://d.book118.com/906104213055011030