

2023-24 年江苏省句容市《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必背 200 题王牌题库（必刷）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. （2021 年真题）患者，男，69 岁，BMI27.8kg/mr，既往有骨性关节炎病史。近期爬山后，再次出现膝关节疼痛，患者热敷后疼痛未缓解，前来咨询如何选用“止痛药”。

- A: 遵医嘱，不得自行增加剂量
- B: 注意关节保暖
- C: 疼痛加重时，可将止痛药嚼碎服用
- D: 应适当减轻体重

答案：C

2. 氟乙酰胺杀鼠药中毒呈现

- A: 出血、凝血时间延长
- B: 抽搐、进行性加重
- C: 恶心、呕吐、口内有金属味
- D: 呼出气体中可有苦杏仁气味

答案：B

3. 中危患者

- A: 立即使用抗高血压药物
- B: 立即进行抢救治疗
- C: 观察相当一段时间，再决定是否进行药物治疗
- D: 先观察（血压及危险因素）数周，然后决定是否进行药物治疗

答案：D

4. 为氧化剂，不能用于乐果中毒的洗胃液是

- A: 淀粉溶液
- B: 3%鞣酸溶液
- C: 活性炭混悬液
- D: 1: 5000 高锰酸钾

答案：D

5. 就餐时随第一、二口食物给药的是

- A: 瑞格列奈
- B: 二甲双胍
- C: 胰岛素
- D: 阿卡波糖

答案：D

6. 强腐蚀剂中毒

- A: 不能导泻
- B: 不能用强利尿剂
- C: 禁止洗胃
- D: 不能催吐

答案：C

7. 采用华法林进行抗凝治疗时，国际标准化比值（INR）的有效安全范围是

- A: 1.5~2.0
- B: 2.0~3.0
- C: 0.8~1.5

D: 3.0~4.0

答案：B

8. 下列不属于尿液检查项的是

A: PRO

B: LEU

C: ALT

D: BL

答案：C

9. 抑制磷酸二酯酶，增加细胞内 cAMP 含量，缓解慢性心衰症状的是

A: 多巴酚丁胺

B: 地高辛

C: 氨力农

D: 硝普钠

答案：C

10. 下列用于解热镇痛的处方药是

A: 阿司匹林

B: 布洛芬

C: 对乙酰氨基酚

D: 安乃近

答案：D

11. 解热镇痛药用于退热属于对症治疗，因此两次用药的间隔时间应该是

A: 5~7 小时

B: 4~6 小时

C: 2~4 小时

D: 3~5 小时

答案: B

12. (透析患者常用药物)可消除便秘，避免腹腔感染和腹膜透析液引流不畅的药物是

A: 对乙酰氨基酚

B: 铁剂

C: 阿法骨化醇

D: 乳果糖

答案: D

13. (2018 年真题) 婴幼儿腹泻,服用地衣芽孢杆菌活菌制剂,正确的使用方法是 ()

A: 应同时碱化尿液

B: 清晨服用

C: 用温水调服

D: 舌下含服

答案: C

14. 原发性失眠首选

A: 阿戈美拉汀

B: 氯氮

C: 米氮平

D: 唑吡坦

答案: D

15. 对目标适应证患者治疗作用的初步评价是指

- A: II 期临床试验
- B: III 期临床试验
- C: 临床预试验
- D: I 期临床试验

答案：A

16.（2019 年真题）患者，女，57 岁，BMI31.2，诊断为 2 型糖尿病，经生活方式干预未能有效控制血糖，肝肾功能未见异常，初始治疗首选的药物是

- A: 吡格列酮
- B: 格列齐特
- C: 阿卡波糖
- D: 二甲双胍

答案：D

17. 宜溶解于温开水中后服用

- A: 泡腾片
- B: 粉剂
- C: 糖浆剂
- D: 胶囊剂

答案：A

18. 男性高血压患者应

- A: 停用 ACEI 或减量
- B: 慎用甲基多巴
- C: 给予硫酸亚铁
- D: 联用他汀类

答案：B

19. 解救有机磷中毒的是

- A: 单价抗毒血清
- B: 二巯丁二钠
- C: 盐酸戊乙奎醚
- D: 亚硝酸异戊酯

答案：C

20. (2016 年真题) 患者，女，35 岁，临床诊断为高甘油三酯血症，临床上给予非诺贝特进行治疗，该药正确的用量为 ()。

- A: 0.5g, qd
- B: 0.1g, tid
- C: 0.5g, tid
- D: 0.2g, qd

答案：B

21. (常用的特殊解毒剂的适应证)，丙烯腈、氟化物、一氧化碳、重金属等中毒的特殊解毒剂

- A: 二巯丁二钠
- B: 谷胱甘肽
- C: 乙酰半胱氨酸
- D: 纳洛酮

答案：B

22. (2020 年真题) 药品说明书中提及“两种药物在吸收过程中, 会发生相互影响, 不能同时服药”, 但没有明示服药间隔时间, 通常建议的间隔时间是 ()

- A: 2 小时

B: 3 小时

C: 0.5 小时

D: 1 小时

答案：A

23. 奎尼丁与地高辛合用可导致

A: 地高辛中毒

B: 奎尼丁中毒

C: 尖端扭转型室性心动过速

D: 明显的心动过缓

答案：A

24. 无并发症的普通感冒一般几天后可痊愈

A: 5~7 日

B: 3~4 日

C: 5~10 日

D: 2~3 日

答案：A

25. 患者，女，65 岁，今日因天气骤变出现急性支气管炎症状，出现喘息困难，无其他基础疾病，可给予的治疗药物是

A: 沙丁胺醇气雾剂 1~2 喷 q6h

B: N-乙酰半胱氨酸片 600mgbid

C: 喷托维林 25mg tid

D: 马来酸氯苯那敏片 4~8mg tid

答案：A

26. 有家族血栓栓塞性疾病史人群禁用的痤疮药是

- A: 维 A 酸
- B: 米诺环素
- C: 口服短效避孕药
- D: 过氧化苯甲酰

答案：C

27. 引起急性支气管炎的常见病原体是

- A: 结核杆菌
- B: 呼吸道合胞病毒
- C: 铜绿假单胞菌
- D: 肺炎链球菌

答案：B

28. 用于癌性胸水

- A: 肌肉注射
- B: 动脉注药
- C: 腔内注射
- D: 静脉注射

答案：C

29. 肾脏功能主要是分泌和排泄尿液、废物、毒物和药物，调节和维持体液容量和成分，维持机体内环境（血压、内分泌）的平衡。变态反应、感染、肾血管病变、代谢异常、先天性疾病、全身循环和代谢性疾病、药物、毒素对肾脏的损害，均可影响肾功能。

- A: $45 \sim 84 \mu\text{mol} / \text{L}$
- B: $53 \sim 97 \mu\text{mol} / \text{L}$
- C: $18 \sim 35 \mu\text{mol} / \text{L}$
- D: $18 \sim 62 \mu\text{mol} / \text{L}$

答案：C

30. (2019 年真题) 患者，女，59 岁，绝经后 3 年，近日出现腰背疼痛，负重时疼痛加剧，骨密度 T 值为-3.5，诊断为骨质疏松，每天补充维生素 D800IU，元素钙 500mg，同时给予唑来膦酸治疗。唑来膦酸正确的给药方案是

- A: 10mg 口服，每日一次
- B: 4mg 静脉滴注，每日次
- C: 5mg 静脉滴注，每周一次
- D: 5mg 静脉滴注，每年一次

答案：D

31. 解救有机磷中毒的是 ()

- A: 盐酸戊乙奎醚
- B: 二巯丁二钠
- C: 单价抗毒血清
- D: 亚硝酸钠

答案：A

32. 属于胆固醇吸收抑制剂的药物是

- A: 辛伐他汀
- B: 非诺贝特
- C: 甲基多巴
- D: 依折麦布

答案：D

33. 属于 A 型单胺氧化酶抑制剂的是

- A: 吗氯贝胺

- B: 氟西汀
- C: 文拉法辛
- D: 阿米替林

答案：A

34. 被认为是动脉粥样硬化的主要致病因子的是

- A: 极高密度脂蛋白胆固醇
- B: 低密度脂蛋白胆固醇
- C: 三酰甘油酯
- D: 总胆固醇

答案：B

35. 复方樟脑酊中毒时，宜首选的特殊解毒剂为

- A: 硫酸铜
- B: 碳酸氢钠
- C: 纳洛酮
- D: 氟马西尼

答案：C

36. 开发药品计算机管理系统，自动检测药品剂量、过敏反应等用药信息，归属于

- A: 人员知识培训
- B: 科学发展
- C: 环境与流程的优化与持续改进
- D: 管理规范到位

答案：C

37. 患儿，男，1 岁 3 个月，因仍不能独立行走而就诊。经询问其母亲，该患儿一直睡眠不好，夜哭较多，非常容易出汗，数次罹患呼吸道感染。查体：头部有“枕秃”。实验室检查：血钙水平低于正常值。诊断为“佝偻病”。

A: 15 万—30 万 IU

B: 30 万—45 万 IU

C: 30 万~60 万 IU

D: 10 万—15 万 IU

答案：A

38. 患者，男，50 岁，身高 167cm，体重 85kg，痛风病史 6 年。近日因多饮、多尿就诊。实验室检查：空腹血糖 7.8mmol / L（正常值：3.9~6.1mmol / L），餐后血糖 14.8mmol / L；血尿酸 580 μmol/L（正常值：男性 180~440 μmol / L），低密度脂蛋白胆固醇 3.7mmol / L（正常值：2.1~3.1mmol / L），肌酐清除率 100ml / min。颈动脉彩超提示：动脉粥样硬化，有混合性脂质斑块。临床诊断为 2 型糖尿病、痛风、高脂血症、动脉粥样硬化症。

A: 阿卡波糖

B: 格列齐特

C: 二甲双胍

D: 甘精胰岛素

答案：A

39. 一般情况下，老年人应该控制总胆固醇测定值低于

A: 5.1mmol / L

B: 6.2mmol / L

C: 5.2mmol / L

D: 6.1mmol / L

答案：C

40. 能诱导肝药酶 CYP2C19 的药物是

- A: 卡马西平
- B: 苯妥英钠
- C: 地塞米松
- D: 西咪替丁

答案：C

41. 氢氯噻嗪所致的主要不良反应是

- A: 外周血肿
- B: 血尿酸升高
- C: 支气管痉挛
- D: 血钠升高

答案：B

42. 可提示肝细胞性黄疸的是

- A: STB $34.2\ \mu\text{mol/L}$ ~ $171\ \mu\text{mol/L}$
- B: STB $>342\ \mu\text{mol/L}$
- C: STB $17.1\ \mu\text{mol/L}$ ~ $171\ \mu\text{mol/L}$
- D: STB $17.1\ \mu\text{mol/L}$ ~ $34.2\ \mu\text{mol/L}$

答案：C

43. 选择合适药物的首要标准是

- A: 药物治疗的规范性
- B: 药物治疗的安全性
- C: 药物治疗的方便性
- D: 药物治疗的有效性

答案：D

44. 常见药源性疾病有药源性胃肠道疾病、肝脏疾病、肾脏疾病、血液疾病、神经系疾病、高血压病。

- A: 肾脏
- B: 肝脏
- C: 肺
- D: 胃肠系统

答案：B

45. 患者，男，67 岁，患有糖尿病、冠心病、高血压，服用的药物包括二甲双胍、阿卡波糖、美托洛尔、阿司匹林、福辛普利。近期使用优维显（碘普罗胺注射液，一种碘化对比剂）做腹部增强 CT 扫描，须告知患者检查前数日应停用的药物是

- A: 阿卡波糖
- B: 二甲双胍
- C: 福辛普利
- D: 美托洛尔

答案：B

46. 一旦误服中毒，必须用硫酸镁洗胃的是

- A: 急性汞中毒
- B: 香豆素类杀鼠药
- C: 急性铅中毒
- D: 磷化锌等杀鼠药

答案：C

47. 静脉滴注给予万古霉素，滴注时间应该控制的时间是

- A: 1 小时以上
- B: 4 小时以上
- C: 2 小时以上
- D: 6 小时以上

答案：C

48. 预激综合征伴房颤患者，控制心室率时须慎用的药物为

- A: 利伐沙班
- B: 去乙酰毛花苷
- C: 硝苯地平
- D: 胺碘酮

答案：B

49. (2017 年真题) 下列关于口服阿仑膦酸钠使用注意事项的说法，错误的是 ()

- A: 食管炎为典型不良反应
- B: 应避免同时使用两种双膦酸盐
- C: 随餐服用，并大量饮水，可增加吸收、减少胃肠道刺激
- D: 口服后 30 分钟内应保持立位或坐位

答案：C

50. 属于胃食管反流病的食管外症状的是 () (消化性溃疡病的治疗)

- A: 烧心
- B: 反流
- C: 上腹部烧灼感
- D: 哮喘

答案：D

51. 下列情况不宜选用的抗高血压药，直立性低血压不宜选用

- A: 非二氢吡啶类钙拮抗剂
- B: 利尿药
- C: ACEI
- D: 哌唑嗪

答案：D

52. 一医师为食管癌患者开方，给予顺铂、氟尿嘧啶、表柔比星、依托泊苷治疗。此处方应评定为

- A: 有禁忌证用药
- B: 过度治疗用药
- C: 不合理联合用药
- D: 无适应证用药

答案：B

53. 不良反应是口干、尿潴留

- A: 哌唑嗪
- B: 索利那新
- C: 度他雄胺
- D: 特拉唑嗪

答案：B

54. 以下所列药物中，推荐用于治疗三叉神经痛患者的首选处方药是

- A: 苯噻啶
- B: 卡马西平
- C: 山莨菪碱
- D: 地西泮

答案：B

55. 左心衰竭最早出现的症状是

- A: 劳力性呼吸困难
- B: 端坐呼吸
- C: 粉红色泡沫样痰
- D: 夜间阵发性呼吸困难

答案：A

56. 易经乳汁分泌的药物的特征是：

- A: 分子量大？
- B: 弱酸性？
- C: 脂溶性大？
- D: 蛋白结合率高？

答案：C

57. 患者，男，38 岁，因腹部受寒胃痉挛疼痛，应选用的药物是()

- A: 布洛芬
- B: 卡马西平
- C: 山莨菪碱
- D: 麦角胺咖啡因

答案：C

58. 下列药品中，最容易吸湿的是

- A: 甘油
- B: 维生素 D
- C: 乙醇
- D: 硫酸钠

答案：A

59. 药物不良反应胶体果胶铋（）

- A: 溢乳现象
- B: 性功能障碍
- C: 黑便
- D: 睡眠障碍

答案：C

60. 可引起药源性肾脏疾病的药物是

- A: 含有马兜铃酸的中药
- B: 三环类抗抑郁药
- C: 异烟肼
- D: 吡罗昔康

答案：A

61. 下列关于抗失眠药物治疗策略的说法，正确的是

- A: 药物治疗开始后应及时开展血药浓度监测
- B: 原发性失眠在非药物治疗无效时首选苯二氮革类抗失眠药
- C: 失眠继发于或伴发于其他疾病时，应同时治疗原发或伴发疾病
- D: 焦虑障碍患者存在失眠时，以抗失眠药物治疗为主

答案：C

62. 作用于 DNA 化学结构的药物是

- A: 顺铂
- B: 放线菌
- C: 依托泊苷
- D: 培美曲塞

答案：A

63. 支原体肺炎首选（）

- A: 甲氧西林
- B: 阿奇霉素
- C: 青霉素
- D: 多西环素

答案：D

64. 某男性，53 岁，参加婚礼后 5 小时突发左脚第 1 跖趾关节剧痛，3 小时后局部出现红、肿、热、痛和活动困难。实验室检查示血尿酸为 $500 \mu\text{mol/L}$ ；足部 x 线示非特征性软组织肿胀。

- A: 风湿性关节炎
- B: 类风湿关节炎
- C: 假性痛风
- D: 痛风

答案：D

65. 患者，男，48 岁，近日自感头晕、头痛、眼花、耳鸣、心悸、失眠、乏力等症状，就诊后测定血压 160 / 100mmHg。

- A: 硝酸甘油
- B: 阿奇霉素
- C: 依那普利
- D: 呋塞米

答案：C

66. 下列口腔溃疡治疗药物可降低毛细血管的通透性，减少炎症的渗出的是

- A: 甲硝唑含漱剂

B: 冰硼散

C: 地塞米松黏贴片

D: 维生素 C

答案: C

67. 服用磺胺甲噁唑时

A: 禁吸烟

B: 宜少饮水

C: 宜多饮水

D: 忌用热水送服

答案: C

68. 用于治疗二氮类药物中毒的特殊解毒剂是()

A: 纳洛酮

B: 氟马西尼

C: 青霉胺

D: 乙氟胺

答案: B

69. 酒的主要成分为乙醇，饮用后人体先是兴奋，随之对中枢神经出现抑制，并扩张血管，刺激或抑制肝药酶代谢系统；另外，有些药也可延迟酒的代谢和分解。总体上，药与酒的相互作用结果有两个：一是降低药效；二是增加发生不良反应的几率。

A: 克林霉素

B: 庆大霉素

C: 呋喃唑酮

D: 依替米星

答案: C

70. 巴比妥类药物重度中毒的表现是

- A: 意识障碍、昏迷
- B: 抽搐反复发作
- C: 恶心、呕吐、视力模糊
- D: 呼出气体中可有苦杏仁气味

答案：A

71. 服用胃动力药多潘立酮治疗消化不良，最佳用药时间是

- A: 餐后 1 小时
- B: 餐前 0.5~1 小时
- C: 餐前
- D: 餐后

答案：B

72. 除全身症状外，尚有恶心、呕吐、腹痛、腹泻等胃肠道症状

- A: 胃肠型
- B: 肺炎型
- C: 神经型
- D: 病毒型

答案：A

73. 最容易吸湿的药品是

- A: 甘油
- B: 乙醇
- C: 叶酸
- D: 鱼肝油乳

答案：A

74. 药师应具备的素质中，贯穿于药学服务全过程的是（）。

- A: 药历制订、修改
- B: 交流沟通能力
- C: 良好的教育背景
- D: 高尚的职业道德

答案：A

75. 在氯化钠注射液中可形成胶状不溶物是

- A: 青霉素
- B: 红霉素
- C: 氯化钾
- D: 苯妥英钠

答案：B

76. 可致直立性低血压的抗焦虑药物为（）

- A: 丁螺环酮
- B: 氟西汀
- C: 阿米替林
- D: 劳拉西泮

答案：C

77. 下列“给药时间是依据生物钟规律而设定”的事例中，最正确的是

- A: 餐前服用格列本脲
- B: 餐前服用阿莫西林
- C: 清晨服用硫酸镁
- D: 清晨服用帕罗西汀

答案：D

78. 原发性蛛网膜下腔出血常见病因为

- A: 动脉炎
- B: 脑血管畸形
- C: 高血压性动脉硬化
- D: 颅内动脉瘤

答案：D

79. III期临床试验

- A: 以患者为给药对象
- B: 以特殊人群为给药对象
- C: 以目标适应证患者为给药对象
- D: 以健康志愿者为给药对象

答案：C

80. 缓泻药连续使用的时间一般不应超过

- A: 3 日
- B: 5 日
- C: 7 日
- D: 10 日

答案：C

81. 下列哪种药物是 WHO 规定的第一阶梯镇痛药物

- A: 芬太尼
- B: 可待因
- C: 吗啡
- D: 阿司匹林

答案：D

82. 以餐后血糖升高为主，伴餐前血糖轻度升高，应该首选的降糖药是

- A: 格列本脲
- B: 二甲双胍
- C: 阿卡波糖
- D: 罗格列酮

答案：D

83. 用后不宜马上进食的剂型是()

- A: 软膏剂
- B: 滴眼剂
- C: 含漱剂
- D: 直肠栓剂

答案：C

84. 过敏性疾病患者可出现

- A: 红细胞/血红蛋白减少
- B: 中性粒细胞增多
- C: 嗜酸性粒细胞增多
- D: 血小板增多

答案：C

85. (2021 年真题) 治疗非心源性栓塞性缺血性脑卒中，宜选用的药物是()

- A: 尿激酶
- B: 依诺肝素钠
- C: 氯吡格雷
- D: 达比加群酯

答案：C

86. 患者，女，48 岁，因耐药菌引起的心内膜炎使用万古霉素治疗。

A: 皮下注射

B: 肌肉注射

C: 静脉滴注

D: 口服

答案：C

87. 酮康唑、氟康唑、伊曲康唑可导致

A: 药源性肝损害

B: 药源性神经损害

C: 药源性肾损害

D: 药源性血损害

答案：A

88. 紫外线加速一些药品的氧化、分解，归属于

A: 空气

B: 温度

C: 日光

D: 湿度

答案：C

89. 吩噻嗪类抗精神病药中毒出现

A: 心血管毒性

B: 谵妄、躁狂、幻觉

C: 明显的锥体外系症状

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必背 200 题题库，word 格式
可自由下载编辑，附完整答案！

D: 肌肉震颤、抽搐

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/906110031105011030>