

2024 年河北省容城县《执业药师之西药学专业二》考试题库（考点精编）

第 I 部分 单选题（100 题）

1.（2021 年真题）水溶性他汀类药物能够选择性抑制肝脏胆固醇合成，而对肾上腺、性腺、心脏、大脑等部位的胆固醇合成影响极低，既有效降低了血清胆固醇水平，又减少了肝脏以外组织不良反应的发生。水溶性较强的他汀类药物是（）

- A: 辛伐他汀
- B: 氟伐他汀
- C: 洛伐他汀
- D: 普伐他汀

答案：D

2. 丙戊酸钠的严重毒性是

- A: 抑制呼吸
- B: 肝功能损害
- C: 再生障碍性贫血
- D: 口干、皮肤干燥

答案：B

3. 用于防止排异反应、糖皮质激素不能长期缓解的多种自身免疫性疾病的是（）

- A: 环孢素
- B: 环磷酰胺
- C: 甲泼尼龙

D: 硫唑嘌呤

答案: B

4. 甲状腺素

A: 可导致血管神经性水肿、上呼吸道水肿及喉头水肿

B: 可导致粒细胞缺乏症

C: 可诱发心绞痛和心肌梗死

D: 可导致甲状腺功能低下

答案: C

5. 选择性地兴奋 β

A: 酮替芬

B: 沙丁胺醇

C: 奈多罗米

D: 扎鲁司特

答案: B

6. 肌肉注射 ACTH 作用达到高峰的时间是

A: 7~12 分钟

B: 4 小时

C: 8 小时

D: 10~25 分钟

答案: B

7. 具有缩小皮脂腺，抑制皮脂腺活性，减少皮脂分泌的药物()

A: 壬二酸

B: 异维 A 酸

C: 阿达帕林

D: 维 A 酸

答案: B

8. 长期频繁使用可致眼部真菌感染

A: 四环素可的松

B: 氯霉素

C: 利巴韦林

D: 更昔洛韦

答案: A

9. 患者,男,64 岁因“慢性肾脏病、肾性高血压”入院,血压 203/110mmHg,该患者宜首选(如果疗程超过 72 小时需密切监测血中硫酸盐水平)的降压药物是

A: 硝普钠

B: 贝那普利

C: 氨氯地平

D: 美托洛尔

答案: A

10. 成人使用阿托品最低致死量为

A: 50mg

B: 10mg

C: 5mg

D: 80mg~130mg

答案: D

11. 长期使用可引起听力减退、肾功能下降的抗结核药物是()

A: 链霉素

- B: 利福平
- C: 乙胺丁醇
- D: 吡嗪酰胺

答案：A

12. 患者，男，55 岁。1 小时前因右侧腰背部剧烈疼痛。难以忍受，出冷汗，服颠茄片不见好转，来院急诊。尿常规检查：可见红细胞。B 型超声波检查：肾结石。

- A: 增加镇痛作用
- B: 镇痛和解痉作用
- C: 防止成瘾
- D: 增加解痉作用

答案：B

13. 助消化药不包括

- A: 乳酸菌素
- B: 多潘立酮
- C: 乳酶生
- D: 胰酶

答案：B

14. 促胃肠动力药是()

- A: 甲氧氯普胺
- B: 肾上腺素
- C: 阿托品
- D: 熊去氧胆酸

答案：A

15. 治疗 MRSA 感染首选药物是

- A: 林可霉素
- B: 克林霉素
- C: 红霉素
- D: 万古霉素

答案：D

16. 叶酸主要用于治疗

- A: 妊娠期巨幼红细胞性贫血
- B: 溶血性贫血
- C: 缺铁性贫血
- D: 再生障碍性贫血

答案：A

17. 能抑制 T

- A: 甲巯咪唑
- B: 卡比马唑
- C: 甲硫氧嘧啶
- D: 丙硫氧嘧啶

答案：D

18. 关于氨基己酸的描述，错误的是

- A: 对慢性渗血效果较差
- B: 口服或静脉给药起效较快
- C: 高剂量直接抑制纤溶酶的蛋白溶解酶活性
- D: 低剂量抑制纤溶酶原的活化作用

答案：A

19. (2018 年真题) 耐甲氧西林金黄色葡萄球菌 (MRSA) 高检出率的医疗机构, 进行人工瓣膜置换术时, 为预防 MRSA 感染, 可选用 ()

- A: 青霉素 G
- B: 万古霉素
- C: 头孢唑林
- D: 氨曲南

答案: B

20. 小剂量用于妊娠期妇女预防胎儿神经管畸形的是

- A: 烟酸
- B: 维生素 B6
- C: 叶酸
- D: 维生素 B12

答案: C

21. 静脉滴注速度过快可能发生“红人综合症”的药品是

- A: 夫西地酸
- B: 莫西沙星
- C: 磷霉素
- D: 万古霉素

答案: D

22. 由于严重的肾毒性, 仅限于局部应用的是 ()

- A: 杆菌肽
- B: 万古霉素
- C: 替考拉宁
- D: 去甲万古霉素

答案: A

23. 抑制排卵避孕药的较常见不良反应是

- A: 多毛、痤疮
- B: 增加哺乳期妇女的乳汁分泌
- C: 肾功能损坏
- D: 子宫不规则出血

答案：D

24. 患者，男，24 岁，诊断为右睾丸非精原细胞瘤术后，治疗方案为依托泊苷+顺铂+博来霉素。

- A: 肺纤维化
- B: 出血性膀胱炎
- C: 骨髓抑制
- D: 药物性肝炎

答案：A

25. 下述利尿药中，可导致血钾升高的是()

- A: 氢氯噻嗪
- B: 呋塞米
- C: 氨苯蝶啶
- D: 乙酰唑胺

答案：C

26. 维生素 K

- A: 促进四氢叶酸类辅酶的循环利用
- B: 促进纤溶
- C: 抑制血小板聚集
- D: 促进凝血因子合成

答案：D

27. 抑制蛋白质合成的起始阶段，使核蛋白体分解

- A: 氟尿嘧啶
- B: 顺铂
- C: 高三尖杉酯碱
- D: 紫杉醇

答案：C

28. 属于第四代头孢菌素的药物的是()。

- A: 头孢哌酮
- B: 头孢吡肟
- C: 头孢拉定
- D: 头孢氨苄

答案：B

29. 引起女性男性化、男性乳房胀痛的是

- A: 多沙唑嗪
- B: 非那雄胺
- C: 舍尼通
- D: 十一酸睾酮

答案：D

30. 用于表面麻醉、阻滞麻醉的局部麻醉药是

- A: 普鲁卡因
- B: 西地碘
- C: 布地奈德
- D: 利多卡因

答案：D

31. 仅降低发热者体温，不降低正常体温，用于感冒发热的药物是

- A: 阿司匹林
- B: 地西泮
- C: 硫喷妥钠
- D: 氯丙嗪

答案：A

32. 唯一与青霉素类没有交叉反应的 β -内酰胺类，可用于青霉素和头孢菌素类过敏者的药物是

- A: 克拉霉素
- B: 红霉素
- C: 克林霉素
- D: 氨曲南

答案：D

33. 可选择性抑制 MAO-B，用于帕金森病对症治疗的药物是

- A: 恩他卡朋
- B: 苯海索
- C: 司来吉兰
- D: 左旋多巴

答案：C

34. 立克次体感染首选

- A: 头孢菌素
- B: 氯霉素
- C: 四环素

D: 多黏菌素

答案: C

35. 对小肠和结肠平滑肌无明显作用的促胃肠动力药是

A: 甲氧氯普胺

B: 西沙比利

C: 伊托必利

D: 多潘立酮

答案: D

36. 可引起慢性肺间质纤维化的药物是

A: 胺碘酮

B: 利多卡因

C: 普罗帕酮

D: 索他洛尔

答案: A

37. 可诱导肝药酶活性的抗结核病药是()

A: 对氨基水杨酸

B: 利福平

C: 异烟肼

D: 吡嗪酰胺

答案: B

38. (2020 年真题) 痛风急性发作时首选的药物是

A: 苯溴马隆

B: 碳酸氢钠

C: 非布司他

D: 秋水仙碱

答案：D

39. 刺激胰岛 B 细胞释放胰岛素的是

A: 磺酰脲类

B: A 和 B 均无效

C: 胰岛素

D: 二甲双胍

答案：A

40. 维生素 A 缺乏时引起

A: 坏血病

B: 角膜软化症

C: 成人佝偻病

D: 脚气病

答案：B

41. 特比萘芬临床上作为 () 的首选药

A: 曲霉病

B: 着色芽生菌病

C: 皮肤癣菌病

D: 孢子丝菌病

答案：C

42. 30 岁，农民，头昏乏力，粪中钩虫卵 (+++)，血红蛋白 60g/L。诊断：钩虫感染，缺铁性贫血。

A: 输血+注射右旋糖苷铁

B: 驱钩虫

C: 驱钩虫+注射右旋糖苷铁

D: 驱钩虫+口服铁剂

答案：D

43. (2018 年真题) 主要用于青光眼急性发作短期控制的药物是 ()

A: 依托塞米

B: 布美他尼

C: 乙酰唑胺

D: 依他尼酸

答案：C

44. 具有利胆作用的药物是 ()

A: 肾上腺素

B: 熊去氧胆酸

C: 阿托品

D: 甲氧氯普胺

答案：B

45. 对女性能促进和维持黄体功能使黄体合成孕激素，对男性能使垂体功能不足者的睾丸产生雄激素，促使睾丸下降和男性第二性征的发育，从妊娠期妇女尿中提取的促性腺激素类药物是

A: 溴隐亭

B: 绒促性素

C: 戈那瑞林

D: 双炔失碳酯

答案：B

46. 下列关于眼部抗菌药物的描述，错误的是

- A: 氟喹诺酮类及氨基糖苷类具有广谱抗菌活性
- B: 多黏菌素 B 对铜绿假单胞菌引起的感染有效
- C: 妥布霉素对铜绿假单胞菌引起的感染有效
- D: 夫西地酸不可用于治疗葡萄球菌感染

答案：D

47. 环孢素合用可使赛洛多辛血药浓度升高，这是因为环孢素抑制

- A: p-糖蛋白
- B: CYP3A4
- C: 血浆蛋白
- D: UGT287

答案：A

48. 患者，男，60 岁诊断为房性心律失常，医生给予胺碘酮治疗。近日，因胃溃疡开始用西咪替丁，出现窦性心动过缓症状。胺碘酮典型不良反应（）。

- A: ①②④⑤
- B: ②④⑤
- C: ①③⑤
- D: ③④⑤

答案：A

49. 扎那米韦的作用靶点是

- A: 神经氨酸酶
- B: HIV-1 和 HIV-2 蛋白酶
- C: 脱氧核糖核酸聚合酶
- D: HIV-1 反转录酶

答案：A

50. 下列对外用糖皮质激素的叙述，不正确的是

- A: 丁酸氢化可的松是中效外用糖皮质激素
- B: 氟轻松是强效外用糖皮质激素
- C: 醋酸氢化可的松是弱效外用糖皮质激素
- D: 糠酸莫米松是中效外用糖皮质激素

答案：D

51. 阿司匹林的主要适应证不包括()

- A: 预防血栓形成
- B: 急性心肌梗死
- C: 胃溃疡
- D: 不稳定型心绞痛

答案：C

52. (2018 年真题) 属于短效胰岛素或短效胰岛素类似物的是()

- A: 甘精胰岛素
- B: 低精蛋白锌胰岛素
- C: 普通胰岛素
- D: 地特胰岛素

答案：C

53. 强效(使 LDL-ch 水平降低 $\geq 50\%$)的他汀类调血脂药是()

- A: 大剂量阿托伐他汀
- B: 小剂量氟伐他汀
- C: 小剂量阿托伐他汀
- D: 依折麦布

答案：A

54. 临床上常用于溶解耵聍的药物是

- A: 5%碳酸氢钠
- B: 4%硼酸甘油
- C: 3%过氧化氢
- D: 1%新霉素

答案：A

55. 可导致神经毒性(手指、足趾麻木、腱反射消失)的抗肿瘤药是

- A: 长春新碱
- B: 紫杉醇
- C: 博来霉素
- D: 柔红霉素

答案：A

56. 氢氯噻嗪的药理作用是

- A: 与醛固酮受体结合
- B: 抑制近曲小管碳酸酐酶活性
- C: 抑制远曲小管 Na^+-Cl^- -共转运子的功能
- D: 提高血浆渗透性，产生组织脱水作用

答案：C

57. 不作为高血压治疗的首选药，临床适用于伴前列腺增生症的高血压患者或与其他药物联合用于顽固性高血压治疗的药物是()

- A: 可乐定
- B: 特拉唑嗪
- C: 肾素抑制剂
- D: 甲基多巴

答案：B

58. 止吐方案：每日化疗前，联合应用 5-HT

- A: 微弱致吐性化疗药所引起的恶心与呕吐
- B: 重度致吐性化疗药所引起的恶心与呕吐
- C: 低度致吐性化疗药所引起的恶心与呕吐
- D: 中度致吐性化疗药所引起的恶心与呕吐

答案：B

59. 阿托品引起便秘的原因是()

- A: 松弛肠道平滑肌
- B: 使括约肌兴奋
- C: 抑制排便反射
- D: 抑制胃肠道腺体分泌

答案：A

60. 吸入用布地奈德混悬液抗炎作用是氢化可的松的

- A: 100 倍
- B: 15 倍
- C: 40 倍
- D: 25 倍

答案：A

61. 避免同时使用“蜡质”脱毛方法的药物()

- A: 壬二酸
- B: 异维 A 酸
- C: 阿达帕林
- D: 维 A 酸

答案：C

62. 对于吗啡药动学特点的表述，错误的是

- A: 口服不易吸收
- B: 大部分经肝脏代谢、经肾排泄
- C: 皮下注射吸收快
- D: 可通过胎盘屏障

答案：A

63. 可与阿司匹林发生相互作用的是

- A: 呋塞米
- B: 坎利酮
- C: 伐地那非
- D: 丙酸睾酮

答案：B

64. 糖皮质激素的适应证，不包括

- A: 活动性肺结核
- B: 系统性红斑狼疮
- C: 风湿性关节炎
- D: 再生障碍性贫血

答案：A

65. 下述属于外周性多巴胺 D₂ 受体阻断剂的是

- A: 多潘立酮
- B: 甲氧氯普胺
- C: 西沙必利
- D: 莫沙必利

答案：A

66. 患儿，男，5 日。昨起拒食、反应差，今日皮肤明显黄染入院。体检：颈周、前胸多个小脓疱，心肺无异常，肝右肋下 2.5cm，脾肋下 1cm，诊断为新生儿败血症，给予头孢曲松治疗。

- A: 新生儿对头孢曲松不敏感
- B: 新生儿肝功能未发育完全，不宜使用头孢曲松
- C: 新生儿肾功能未发育完全，不宜使用头孢曲松
- D: 新生儿出现明显皮肤黄染时，不宜使用头孢曲松

答案：D

67. 强心苷中毒所致的心室纤颤宜选用()

- A: 利多卡因
- B: 普罗帕酮
- C: 地尔硫
- D: 胺碘酮

答案：A

68. 属于选择性 5-HT

- A: 莫沙必利
- B: 甲氧氯普胺
- C: 昂丹司琼
- D: 多潘立酮

答案：A

69. 关于利伐沙班注意事项的描述，不正确的是()

- A: 如伤口已止血，首次用药应于术后立即给药
- B: 对于不同的手术选择的疗程不同

C: 用药期间需定期测定血红蛋白

D: 用药过量可导致出血并发症

答案: A

70. 治疗间日疟和三日疟首选的联合方案是

A: 乙胺嘧啶+磺胺药

B: 静脉滴注奎宁

C: 咯萘啶或甲氟喹

D: 氯喹+伯氨喹

答案: D

71. 甲状腺功能亢进的内科治疗宜选用

A: 小剂量碘

B: 甲状腺素

C: 大剂量碘

D: 甲巯咪唑

答案: D

72. 用于阵发性室上性心动过速的钙通道阻滞药是

A: 利多卡因

B: 维拉帕米

C: 胺碘酮

D: 苯妥英钠

答案: B

73. 降压时常见干咳的不良反应，发生率约为 20% 的药物是

A: 硝苯地平

B: 烟酸

C: 卡托普利

D: 硝普钠

答案: C

74. 治疗伤寒、副伤寒的首选药物是

A: 青霉素

B: 磺胺嘧啶

C: 氯霉素

D: 红霉素

答案: C

75. (2020 年真题) 患者，男，66 岁。BMI24kg/m²，高血压病史 15 年，冠心病史 3 年，目前规律服用阿司匹林、贝那普利、氨氯地平、美托洛尔、阿托伐他汀、螺内酯、呋塞米、单硝酸异山梨酯治疗。患者饮酒饱餐后出现胸闷，心前区疼痛，自服 1 片硝酸甘油不能缓解，来急诊科就诊。查体: 血压 163/83mmHg，心率 80 次/分。临床诊断为: (1) 心绞痛急性发作; (2) 心功能不全、心功能 III 级; (3) 高血压病 3 级; (4) 高脂血症。

A: 硝酸甘油片被吞服，而不是舌下含服

B: 硝酸甘油片单次剂量不足，次数不足

C: 贝那普利、阿托伐他汀等拮抗硝酸甘油的疗效

D: 硝酸甘油片已经过期

答案: C

76. 下列属于窄谱抗菌药物的是

A: 阿莫西林

B: 头孢唑啉

C: 氨基糖苷

D: 环丙沙星

答案：C

77. 可使尿酸浓度升高，可引起痛风急性发作的是

A: 乙胺丁醇

B: 吡嗪酰胺

C: 异烟肼

D: 红霉素

答案：B

78. 属于 DPP-4 抑制剂的药物是

A: 那格列奈

B: 阿格列汀

C: 利拉鲁肽

D: 伏格列波糖

答案：B

79. (2016 年真题) 属于 5-HT₃ 受体阻断剂的止吐药是

A: 维生素 B₆

B: 阿瑞吡坦

C: 甲氧氯普胺

D: 托烷司琼

答案：D

80. 患者，女，54 岁，诊断为右侧乳腺浸润性导管癌术后，病理示：右乳浸润性导管癌 II 级，同侧腋下淋巴结 1 / 18，免疫组化：ER(-)，PR(-)，Her(+). 肝肾功能正常。化疗方案为环磷酰胺+多柔比星+多西他赛。

- A: 妊娠及哺乳期妇女
- B: 骨髓功能抑制
- C: 严重心脏病
- D: 腰椎间盘突出

答案：D

81. 奎尼丁对心肌细胞膜的作用主要是

- A: 促进 Ca^{2+} 内流
- B: 抑制 Ca^{2+} 外流
- C: 促进 K^{+} 外流
- D: 抑制 Na^{+} 内流

答案：D

82. 患者，女，54 岁，诊断为右侧乳腺浸润性导管癌术后，病理示：右乳浸润性导管癌 II 级，同侧腋下淋巴结 1 / 18，免疫组化：ER(-)，PR(-)，Her(+). 肝肾功能正常。化疗方案为环磷酰胺+多柔比星+多西他赛。

- A: 严重心脏病
- B: 腰椎间盘突出
- C: 妊娠及哺乳期妇女
- D: 骨髓功能抑制

答案：B

83. 一名癫痫大发作的患者，因服用过量的苯巴比妥而引起昏迷，呼吸微弱，送医院急救。请问不该采取哪项措施

- A: 静滴氯化铵
- B: 静滴碳酸氢钠
- C: 人工呼吸

D: 静滴呋塞米

答案: A

84. 高血压伴甲状腺功能亢进者宜选用

A: 硝苯地平

B: 利血平

C: 普萘洛尔

D: 尼莫地平

答案: C

85. 可以降低血尿酸水平，但升高尿尿酸水平而导致肾结石的抗痛风药是

A: 秋水仙碱

B: 别嘌醇

C: 丙磺舒

D: 呋塞米

答案: C

86. 患儿，男，7岁。长期偏食。近1个月面色渐苍白，自诉全身无力。体检：肝肋下4cm，脾肋下1cm。血常规：Hb70g/L，RBC3.

$0 \times 10^{12} / L$ ，Ret2.0%，WBC、Plt均正常，MCV74fl，MCH26pg，

MCHC30%，考虑为缺铁性贫血。

A: 血红蛋白测定

B: 血小板数量

C: 血清铁蛋白

D: 网织红细胞计数

答案: B

专业《执业药师之西药学专业二》考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/906110045102011030>