

# 2024 年广西壮族自治区《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必背 200 题完整题库含答案（研优卷）

## 第 I 部分 单选题（100 题）

1. 常用的抗肿瘤药给药途径有：动脉、静脉、肌内、腔内、口服五种途径最常用的给药途径

- A: 动脉注射
- B: 腔内注射
- C: 肌内注射
- D: 静脉注射

**答案：D**

2. 患者，男，体检发现血清尿素氮升高、血肌酐升高，其他生化指标正常，该患者最可能患有

- A: 肾脏疾病
- B: 心脏疾病
- C: 血液疾病
- D: 肝脏疾病

**答案：A**

3. 溃疡或胃酸过多的人不宜饮用

- A: 高盐饮食
- B: 吸烟
- C: 咖啡
- D: 饮茶

**答案：C**

4. 用药期间禁止饮酒否则可出现面部潮红、头痛、眩晕等“双硫仑样反应”的药品是

- A: 替硝唑?
- B: 青霉素钾?
- C: 庆大霉素?
- D: 克林霉素?

**答案：A**

5. 实施"用药列表", 能有效地

- A: 识别及管理多重用药
- B: 提高用药顺应性
- C: 健康生活方式的教育
- D: 转变疾病预防和保健观念

**答案：A**

6. 患者，男，48 岁。十二指肠溃疡病史 2 年，近感头痛、眩晕而就诊。查体：血压 160/100mmHg。经一段时间观察及定期检查后，医师诊断为高血压病。

- A: 胍屈嗪
- B: 利血平
- C: 可乐定
- D: 氢氯噻嗪

**答案：B**

7. 在应用碘解磷定时的注意事项中哪一项是错误的

- A: 用量过大、注射过快或未经稀释直接注射均可引起中毒

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

---

---

B: 对毒蕈碱样作用和防止呼吸中枢抑制的作用较差

C: 在碱性溶液中易水解为氰化物，故忌与碱性药物配伍

D: 对有机磷农药急、慢性中毒均有效

**答案：D**

8. (2015 年真题) 细菌感染腹泻患者宜选用 ( )。

A: 阿苯达唑

B: 乳果糖

C: 干酵母

D: 小檗碱

**答案：D**

9. 患者，女性，25 岁，因面色苍白、头晕、乏力 1 年余，加重伴心悸 1 个月来诊。经诊断为缺铁性贫血。

A: 餐后

B: 两餐间

C: 睡前

D: 餐前

**答案：A**

10. 应贮存在凉暗处的药物是

A: 托烷司琼注射剂

B: 硫酸亚铁片

C: 头孢拉定

D: 重组人促红细胞生成素

**答案：A**

11. 利尿降压药的常见不良反应是

- A: 水、电解质紊乱
- B: 咳嗽
- C: 体位性低血压
- D: 首剂现象

**答案：A**

12. 胃食管反流病患者应避免使用的药物是 ( )

- A: 阿仑膦酸钠
- B: 特拉唑嗪
- C: 美托洛尔
- D: 维生素 C

**答案：A**

13. 适用于 1-dopa 治疗伴发疗效减退、症状波动患者的是

- A: 左旋多巴
- B: 司来吉兰
- C: 苯海索
- D: 恩托卡朋

**答案：D**

14. 美国食品药品监督管理局 (FDA) 根据药物对胎儿的危害将妊娠用药分为 A、B、C、D、X 五个级别，并要求制药企业在药品说明书上标明等级。A~X 级致畸系数递增。有些药物有两个不同的危险度等级，一个是常用剂量的等级，另一个是超常剂量等级。

- A: 青霉素
- B: 氯霉素
- C: 链霉素
- D: 红霉素

**答案：C**

15. 容易在乳汁中排泄的药物的理化特性主要是

- A: 分子量<200
- B: 在脂肪中极易溶解
- C: 弱酸性
- D: 在水中容易溶解

**答案：A**

16. 患者，男，58岁，有高血压、冠心病、高脂血症、便秘、骨关节炎和胃溃疡病史，2年前接受冠脉支架植入术。近日，患者先后在心内科、消化科、骨科就诊，开具药品如下：

- A: 使用西地那非 24 小时内不可应用单硝酸异山梨酯片，避免引起严重低血压
- B: 单硝酸异山梨酯片每天早晚各服 1 片（20mg），应间隔 12 小时
- C: 规律使用硝酸酯类药物有助于预防心绞痛发作
- D: 单硝酸异山梨酯缓释片与普通片均不适于心绞痛急性发作的治疗

**答案：B**

17. 奥昔布宁用于治疗急迫性尿失禁，其主要不良反应是

- A: 体位性低血压
- B: 眼内压升高
- C: 性功能减退、乳房增大
- D: Q-T 间期延长

**答案：B**

18. 用药时须与食物同服的增强认知功能药物为（）

- A: 加兰他敏

- B: 多奈哌齐
- C: 卡巴拉汀
- D: 苯海索

**答案：C**

19. 癫痫患者禁用下列哪种抗焦虑药物（）

- A: 氯米帕明
- B: 曲唑酮
- C: 舍曲林
- D: 艾司唑仑

**答案：A**

20. 铁剂在胃肠道吸收的主要特点是

- A: 黏膜吸收
- B: 与储存量成正比
- C: 有自限现象
- D: 有黏膜自限现象

**答案：D**

21. 为细菌感染性腹泻患者开具小檗碱片、盐酸地芬诺酯片与双八面体蒙脱石散的处方，应评判为

- A: 无正当理由超适应证用药
- B: 过度治疗用药
- C: 联合用药不适宜
- D: 有禁忌证用药

**答案：C**

22. 脂溶性维生素 A 宜餐后服用的原理是

- A: 延长在胃肠道滞留时间
- B: 餐后胃酸分泌增多有利于吸收
- C: 减少被胃酸破坏
- D: 利用油脂增加其溶解

**答案：D**

23. 以下解救中毒措施中，正确的药物拮抗是

- A: 阿托品拮抗颠茄碱类中毒
- B: 二巯丙醇拮抗青霉胺
- C: 依地酸钙钠可"驱铅"
- D: 口服氯化铵促使苯丙胺排泄

**答案：C**

24. 以高 TG 为主血症首选

- A: 依折麦布
- B: 非诺贝特
- C: 氟伐他汀
- D: 阿昔莫司

**答案：B**

25. 某男性，27 岁，间断上腹痛 3 年，表现为餐后痛，约 1~2h 后缓解，以冬春季多发。

- A: PPI+克拉霉素+阿莫西林+铝碳酸镁
- B: PPI+西咪替丁+阿莫西林+铋剂
- C: 法莫替丁+克拉霉素+阿莫西林+铋剂
- D: PPI+克拉霉素+阿莫西林+铋剂

**答案：D**

26. 可引起药源性肾脏疾病的药物是

- A: 吡罗昔康
- B: 异烟肼
- C: 含有马兜铃酸的中药
- D: 三环类抗抑郁药

**答案：C**

27. 药师应及时向患者交待有关用药的注意事项，以避免误用药物，减轻患者不必要的恐慌，提高用药依从性。根据患者用药情况，发药时药师应有针对性的提示患者各类药物的应用注意事项。

- A: 患者二?
- B: 患者三?
- C: 患者一?
- D: 患者四?

**答案：A**

28. 饮酒后酒精除了影响神经系统、心血管系统的功能外，还会影响药物的疗效作用和毒副作用。因此，在服用药物时应该考虑酒精对药物的影响。

- A: 痛风急性发作
- B: 出现蛋白尿
- C: 血压升高
- D: 嗜睡

**答案：A**

29. 氯霉素可引起

- A: 再生障碍性贫血
- B: 听神经障碍

C: 锥体外系反应

D: 癫痫发作

**答案: A**

30. 脑梗死的分期恢复期

A: 2 周

B: 1 个月内

C: 1~3 个月

D: 1~6 个月

**答案: D**

31. 药物对孕妇的不良影响中，摄入过量泻药、利尿药可能引起()。

A: 溶血

B: 死胎

C: 流产

D: 畸形

**答案: C**

32. (2017 年真题) 治疗急性腹泻可选用 ( )

A: 双八面体蒙脱石散

B: 阿苯达唑

C: 聚乙醇 4000

D: 莫沙必利

**答案: A**

33. 服药后 1h 内限制饮水的药物是

A: 磺胺类药物

B: 镇静催眠药

C: 微生态制剂

D: 胃黏膜保护剂

**答案: D**

34. 美国食品药品监督管理局 (FDA) 根据药物对胎儿的危害将妊娠用药分为 A、B、C、D、X 五个级别，并要求制药企业应在药品说明书上标明等级。A~X 级致畸系数递增。有些药物有两个不同的危险度等级，一个是常用剂量的等级，另一个是超常剂量等级。

A: 青霉素

B: 链霉素

C: 红霉素

D: 氯霉素

**答案: B**

35. 伴有房扑、房颤的心力衰竭首选

A: 硝酸酯类

B: 地高辛

C: 普萘洛尔

D: 利多卡因

**答案: B**

36. 患者,女,45岁,6个月前因出现口吐白沫、意识变更、二便失禁,在专科医生指导下进行抗癫痫药物治疗,症状控制较好,近3个月服用西咪替丁,患者出现脱发、体重增加、胃肠道功能紊乱,该患者各地求医,服用各种药物,具体药物品种不详。围绕该病例,医师、药师、护士对抗癫痫药的安全用药和用药事项进行用药讨论。

A: 有条件的应测定药物血液浓度

B: 遵从联合治疗原则

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

---

C: 长期规律用药

D: 定期监测肝功能

**答案: B**

37. 抗凝，抗血小板治疗

A: 血凝酶

B: 硝苯地平

C: 华法林

D: 多非利特

**答案: C**

38. 处方中缩写含义不正确的

A: 每日，qd

B: 隔日 1 次，qnd

C: 每 4 小时，q4h

D: 每日 4 次，qid

**答案: B**

39. 医师书写处方时经常使用外文缩写，医师在指导用药时需要准确掌握和解释。0

A: 右眼

B: 左眼

C: 是()

D: 适量

**答案: C**

40. 红霉素

A: 与多种药物存在配伍禁忌，一般应单独给药

B: 与呋塞米合用可加重肾功能损害

C: 与氯霉素合用因竞争药物的结合位点而产生拮抗作用

D: 与丙戊酸钠合用可导致血药浓度过低而引发癫痫

**答案：C**

41. 患者，男，67 岁，患带状疱疹，皮疹愈合后出现持续 1 个月左右疼痛，可给予的止痛药物是

A: 加巴喷丁

B: 吗啡

C: 山莨菪碱

D: 布洛芬

**答案：A**

42. 以快速、准确地获得问题的答案是指

A: 形成答案并以口头形式提供给询问者

B: 对问题进行确定并归类

C: 对文献进行评价、分析和整理

D: 确立有效的检索方法、查阅文献

**答案：D**

43. 肝脏具有十分重要和复杂的生理功能。首先是人体内各种物质代谢和加工的中枢，其次是有生物转化和解毒功能，所有进入人体的药物或毒物，都会在肝脏发生氧化、还原、水解、结合等化学反应，最后以原形药或代谢物的形式排出体外。

A: 急性胰腺炎

B: 缺铁性贫血

C: 肝硬化

D: 糖尿病

**答案：C**

44. 患者，男性，36 岁，主因“反复上腹部疼痛 3 年，加重伴黑便 2 天”以“胃溃疡”收住入院。患者于入院 3 年前，餐后偶感上腹部隐痛不适，曾在当地医院做胃镜检查示“胃溃疡”。经住院给予对症治疗（具体药物及剂量不详）后症状有所好转。入院前 2 天开始，上述症状发作较为频繁，以胃灼痛为主，多以辛辣刺激及不良饮食为诱因，伴反酸及暖气，并伴有黑便，呈糊状，共排 3 次，每次约 250g 左右，同时伴有恶心。患者自发病以来，无头晕及头痛，有恶心但无呕吐，无胸闷及心慌，无咳嗽及咳痰，无腹泻，体重未见明显增减。查体：T36.2℃、P84 次/分、R20 次/分、BP110/70mmHg，腹平软，未见腹壁静脉显露及胃肠型和蠕动波，中上腹压痛但无反跳痛，肝、脾未扪及，肝、肾区无叩痛，移动性浊音阴性，肠鸣音 3~5 次/分。辅助检查：①便常规：红细胞满视野，隐血阳性；②胃镜检查：胃壁左侧有 1.5cm×2cm 椭圆形溃疡；③尿素酶试验（+）。诊断结论：胃溃疡合并上消化道出血，幽门螺杆菌感染。

A: 优先选择艾司奥美拉唑 20mgqd，疗程 6 周

B: 优先选择艾司奥美拉唑 20mgqd，疗程 4 周

C: 优先选择法莫替丁 20mgbid，疗程 8 周

D: 优先选择法莫替丁 20mgqn，疗程 8 周

**答案：B**

45. 对小动脉、小静脉和微静脉均有扩张作用，用于高血压危象、高血压脑病、恶性高血压等高血压急症的是

A: 硝普钠

B: 地高辛

C: 氨力农

D: 多巴酚丁胺

**答案：A**

46. 患者，男，50 岁，诊断为高血压、冠心病。医师处方：氨氯地平片 10mgpoqd；美托洛尔缓释片 47.5mgpoqd；贝那普利片 20mgpoqd；阿司匹林肠溶片 100mgpoqd；辛伐他汀片 40mgpoqd。

A: 对乙酰氨基酚片

B: 华法林片

C: 双嘧达莫片

D: 氯吡格雷片

**答案：D**

47. 服用含有盐酸伪麻黄碱的抗感冒药后，可导致的不良反应是

A: 血压升高

B: 蛋白尿

C: 栓塞

D: #NAME?

**答案：A**

48. 正常血涂片白细胞分类计数，中性粒细胞占白细胞总数的

A: 0.05~0.5

B: 0.5~0.7

C: 0.01~0.05

D: 0.02~0.04

**答案：B**

49. 常见老年人 ADR 的药物类别，大量应用可导致肠道菌群失调或真菌感染等严重并发症

A: 钙通道阻滞剂

B: 抗生素

C:  $\beta$  受体阻断剂

D: 抗胆碱药

**答案：B**

50. (透析患者常用药物)服用何种药物可以减轻透析患者出现骨和关节的疼痛或头痛

A: 铁剂

B: 阿法骨化醇

C: 对乙酰氨基酚

D: 乳果糖

**答案：C**

51. 餐后 0.5~1 小时给药的是

A: 二甲双胍

B: 瑞格列奈

C: 阿卡波糖

D: 胰岛素

**答案：A**

52. (2018 年真题) 患者,男,65 岁,临床诊断:2 型糖尿病、周围神经病变、冠心病。

A: 选用阿卡波糖片不合理

B: 瑞格列奈片用量不合理

C: 选用美托洛尔缓释片不合理

D: 单硝酸异山梨酯缓释片用量不合理

**答案：D**

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

---

---

53. 药品不良反应(ADR)的机制和影响因素错综复杂，遇到可疑 ADR 时，需要进行因果关系评价

- A: 肯定
- B: 很可能
- C: 可能无关
- D: 可能

**答案：B**

54. 常见的患者用药咨询内容不包括

- A: 药品名称
- B: 药物相互作用
- C: 药品适应证
- D: 国外新药动态

**答案：D**

55. “有助于建立、维持并增进药师与患者的专业性关系”的技能是

- A: 药历书写技能
- B: 自主学习能力
- C: 沟通技能
- D: 药品警戒技能

**答案：C**

56. 患儿，女，4 岁半。身高 110cm，体重 15kg。一天前发热（39.1℃），咽喉痛，无咳嗽，无吐泻，家长在家选用退烧药对症治疗，发病 20h 左右出现腹泻，约 2~5h，一次大便，量少，黄色粘液便，呕吐 1 次。体格检查：T38.8℃，P118 次/分，R28 次/分。咽位充血，出现轻微脱水症状。双肺呼吸音清，腹平软，肝脾未触及，肠鸣音活跃。实验室检查：WBC $18.5 \times 10^9/L$ （参考值  $4.0 \sim 10 \times 10^9/L$ ），粪便镜检可见红、白细胞。

- A: 腹泻可致电解质丢失，故须特别注意补充？
- B: 药用炭可以吸附细菌和毒素，可与抗生素同时服用？
- C: 首选口服补液，必要时静脉补液？
- D: 小檗碱和鞣酸蛋白不宜同时服用？

**答案：B**

57. 宜于清晨服用的药品是

- A: 洛伐他汀
- B: 阿卡波糖
- C: 糖皮质激素
- D: 甲氧氯普胺

**答案：C**

58. 患者，男，35 岁，髋关节置换术后 7 天，患者右侧下肢肿胀、疼痛，抬高患肢后可好转。

- A: 病理性骨折
- B: 下肢动脉栓塞
- C: 肺动脉栓塞
- D: 下肢深静脉血栓形成

**答案：D**

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

---

---

59. 伴有认知障碍的老年帕金森病患者，首选治疗药物为

- A: 复方左旋多巴
- B: 金刚烷胺
- C: 苯海索
- D: 司来吉兰

**答案：A**

60. 患者,女,35岁,因感冒所致流涕、咳嗽发热等症状到药店购药,药师应推荐的药品是()

- A: 萘甲唑啉滴鼻液
- B: 酚麻美敏片
- C: 氯苯那敏片
- D: 对乙酰氨基酚片

**答案：B**

61. 晚期肝硬化时,哌替啶和普萘洛尔生物利用度增加 2 倍,是指

- A: 药物分布
- B: 药物代谢
- C: 药物排泄
- D: 药物吸收

**答案：D**

62. 饮水冲淡药物对感受器的刺激是指

- A: 抗利尿药
- B: 利胆药
- C: 舌下片(丸)
- D: 苦味健胃药

**答案：D**

63. 解救经口急性铅中毒的洗胃液是

- A: 1%硫酸铜
- B: 1%氯化钠
- C: 1%硫酸镁

D: 3%过氧化氢

**答案：C**

64. (血常规检查异常的病症)骨髓增生病

A: 红细胞沉降率减慢

B: 淋巴细胞增多

C: 白细胞增多

D: 血小板增多

**答案：D**

65. 射击运动员使用后，可减慢心率、减少心肌耗氧量，消除比赛前紧张心理，因此被列入兴奋剂管理的药物是

A: 呋塞米

B: 硝苯地平

C: 普萘洛尔

D: 缬沙坦

**答案：C**

66. 患者，男性，30岁，确诊为支气管哮喘，入院治疗3周，经正规治疗病情缓解，仅偶有胸闷，出院时医生嘱咐了一些用药注意事项。

A: 钙通道阻滞剂

B: 抗胆碱能药物

C: B受体阻断剂

D: B受体激动剂

**答案：C**

67. (2019年真题)患者，男，72岁。诊断:高血压，心力衰竭，肋软骨炎。

- A: 应定期监测血压、心率
- B: 应注意观察是否有黑便
- C: 在患者症状好转后，应立即停用比索洛尔
- D: 应定期监测地高辛血药浓度

**答案：C**

68. 与左旋多巴合用，可提高疗效的是()

- A: 克拉维酸钾
- B: 奥美拉唑
- C: 叶酸
- D: 苄丝肼

**答案：D**

69. (2018 年真题) 使用肝素静脉滴注期间需监测的指标是 ()

- A: ALT
- B: INR
- C: APTT
- D: RBC

**答案：C**

70. 患者，女，55 岁，因反复发作胸骨后疼痛 2 年，伴反酸、胃灼热、间断积食来诊，食管测压提示食管下括约肌压力小于 6mmHg，结合胃镜检查检查结果，临床诊断为胃食管反流病。医师处方：奥美拉唑 20mgqd 强化抑酸治疗。

- A: 用药后可能出现头痛、便秘等不良反应
- B: 长期服用可能会出现维生素 K 缺乏
- C: 应整片吞服
- D: 适宜餐前 30 分钟服用

**答案：B**

71. 属于 A 级的药物是

- A: 葡萄糖
- B: 万古霉素
- C: 沙利度胺
- D: 阿莫西林

**答案：A**

72. 服用后容易引起结晶尿，药师在指导用药时应告知患者多饮水的药物是

- A: 磺胺甲噁唑
- B: 红霉素
- C: 阿奇霉素
- D: 头孢呋辛

**答案：A**

73. 属于延长动作电位时程给药（第Ⅲ类）的抗心律失常药是

- A: 胺碘酮
- B: 美西律
- C: 拉贝洛尔
- D: 维拉帕米

**答案：A**

74. 可引起嗜睡的是

- A: 东莨菪碱
- B: 抗过敏药
- C: 阿米洛利

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

---

D: 右美沙芬

**答案：B**

75. 丝裂霉素

A: 肺纤维化

B: 出血性膀胱炎

C: 心脏毒性

D: 溶血性尿毒症

**答案：D**

76. (2015 年真题) 中成药血脂康中含有的化学成分是 ( )。

A: 依折麦布

B: 阿托伐他汀钙

C: 洛伐他汀

D: 辛伐他汀

**答案：C**

77. 服用地西洋等苯二氮

A: 烟

B: 浓茶

C: 咖啡

D: 酒

**答案：A**

78. 患者,男,64 岁,因右足肿痛就诊。查体:右脚第一趾关节红肿,触痛明显。化验结果:血尿酸 581 $\mu$ mol/L。诊断为急性痛风性关节炎。患者合并高血压、高胆固醇血症、冠心病,目前正服用氢氯噻嗪片 25mgqd、美托洛尔缓释 47.5mgqd、赖诺普利片 20mgqd、辛伐他汀片 10mgqd、阿司匹林肠溶片 100mgqd。

- A: 阿司匹林片 (300mg)
- B: 别嘌醇片
- C: 双氯芬酸钠片
- D: 贝诺酯片

**答案: C**

79. 避免碘摄入过多,甲亢患者应尽量避免服用的药物是

- A: 胺碘酮
- B: 链激酶
- C: 阿托伐他汀钙
- D: 氯吡格雷

**答案: A**

80. 合并三度房室传导阻滞的高血压患者不宜选用

- A: 多沙唑嗪
- B: 维拉帕米
- C: 卡托普利
- D: 哌唑嗪

**答案: B**

81. 拮抗作用的配伍用药是

- A: 应用地高辛与氢氯噻嗪
- B: 纳洛酮用于解救吗啡中毒

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必背 200 题题库，word 格式  
可自由下载编辑，附完整答案！

---

---

C: 阿托品联用吗啡镇痛

D: 青蒿素与乙胺嘧啶或磺胺多辛联用延缓抗药性

**答案：B**

82. 属于 H<sub>2</sub> 受体拮抗剂的是 ( )

- A: 埃索美拉唑
- B: 多潘立酮
- C: 铝碳酸镁
- D: 法莫替丁

**答案: D**

83. 适用于各种类型的心绞痛

- A: 硝酸酯类
- B: 普萘洛尔
- C: 利多卡因
- D: 地高辛

**答案: A**

84. 秋水仙碱具有严重的毒副作用，痛风急性发作期使用秋水仙碱治疗时，出现严重中毒前驱症状应立即停药，停药指征是

- A: 血小板减少
- B: 紫癜
- C: 胃肠道反应
- D: 肌肉抽搐

**答案: C**

85. 同时使用 2 种药物，药物不良事件的发生率为

- A: 0.72
- B: 0.38
- C: 0.58

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必背 200 题题库，word 格式  
可自由下载编辑，附完整答案！

---

D: 0.13

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。  
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/906153035101011030>