

医学高级职称副高《妇产科学》试题精选（网友回忆版）（16）

[单选题]1. 与初潮后 3 年内月经周期不规（江南博哥）则无关的为

- A. 催乳激素低水平
- B. 雌激素尚不能引起 LH 高峰
- C. 卵巢功能尚不健全
- D. FSH 持续低水平
- E. 生殖系统功能尚不成熟

参考答案：A

参考解析：由于下丘脑与垂体促性腺激素分泌量增加及作用加强，使卵巢发育与性激素分泌逐渐增加，内、外生殖器进一步发育。青春期开始雌激素水平虽达到一定高度，但尚不足以引起黄体生成激素的高峰，故月经周期尚不规律且多为无排卵性。随后，卵泡刺激素水平上升，雌激素水平也上升达成人排卵前高峰水平，并持续一定时间，出现正反馈作用，诱发 LH 高峰而有排卵性的月经周期。此时虽已初步具有生育能力，但整个生殖系统的功能尚未臻完善。故选择 A。

[单选题]2. 妊娠期容易发生心衰的时间是

- A. 妊娠 20~24 周
- B. 妊娠 24~28 周
- C. 妊娠 28~30 周
- D. 妊娠 32~34 周
- E. 妊娠 34~38 周

参考答案：D

参考解析：心排出量的增加是妊娠期循环系统最重要的改变。心排出量自妊娠 8~10 周逐渐增加，妊娠 32~34 周达高峰，心脏每搏输出量平均约为 80ml。故妊娠 32~34 周心脏负荷较重，易发生心力衰竭。

[单选题]3. 女性生殖器三大恶性肿瘤指的是

- A. 外阴癌、宫颈癌、卵巢癌
- B. 宫颈癌、子宫内膜癌、绒癌
- C. 绒癌、宫颈癌、子宫肉瘤
- D. 宫颈癌、子宫内膜癌、卵巢癌
- E. 宫颈癌、卵巢癌、绒癌

参考答案：D

参考解析：宫颈癌是最常见的妇科恶性肿瘤。外阴鳞状上皮癌——是最常见的外阴恶性肿瘤，常继发与宫颈癌卵巢恶性肿瘤可发生于任何年龄，其发生率占女性生殖器恶性肿瘤的第三位恶性肿瘤以子宫颈癌、子宫内膜癌（宫体癌）及卵巢癌（卵巢恶性肿瘤）最常见，称为妇科三大恶性肿瘤，女性生殖器三大恶性肿瘤。

[单选题]4. 活跃期停滞是指进入活跃期后，宫颈口不再扩张的时间达到

- A. 30 分钟以上

- B. 1 小时以上
- C. 1.5 小时以上
- D. 4 小时以上
- E. 2.5 小时以上

参考答案：D

参考解析：活跃期停滞：当破膜且宫颈口扩张大于等于 6cm 后，若宫缩正常，宫颈口停止扩张大于等于 4 小时，若宫缩欠佳，宫颈口停止扩张大于等于 6 小时称为活跃期期停滞。

[单选题]5. 当测量坐骨结节间径值 7.5cm 时，应进一步测量哪条径线

- A. 坐骨切迹宽度
- B. 坐骨棘间径
- C. 对角结合径
- D. 出口前矢状径
- E. 出口后矢状径

参考答案：E

参考解析：当测量坐骨结节间径值 7.5cm 时，应进一步测量出口后矢状径，坐骨结节间径值+出口后矢状径大于 15cm 时，则骨盆出口狭窄不明显。

[单选题]6. 不能用于巨细胞病毒感染的诊断方法为

- A. 宫颈脱落细胞涂片行 Giemsa 染色
- B. 酶联免疫吸附试验检测孕妇巨细胞病毒 IgG、IgM
- C. 血培养
- D. DNA 分子杂交
- E. PCR 检测技术

参考答案：C

参考解析：确诊有赖于病原学和血清学诊断。常用方法有：①酶联免疫吸附试验检测孕妇血清巨细胞病毒 IgG、IgM；②孕妇宫颈脱落细胞或尿液涂片行 Giemsa 染色后，在光镜下检测脱落细胞核内嗜酸性或嗜碱性颗粒，见到巨大细胞包涵体，这种特异细胞称猫头鹰眼细胞，具有诊断价值；③DNA 分子杂交技术检测巨细胞病毒 DNA，此法简便、快速、敏感；④PCR 技术扩增巨细胞病毒 DNA，短时间内获满意结果。故选择 C。

[单选题]7. 下列关于胎儿循环系统特点的叙述，正确的是

- A. 有一条脐动脉，两条脐静脉
- B. 脐动脉内为含氧量高的动脉血
- C. 入右心的血为含氧量较低的静脉血
- D. 胎儿体内无动脉血
- E. 左右心房之间的卵圆孔于出生后数日开始关闭

参考答案：D

参考解析：胎儿有两条脐动脉，一条脐静脉，脐静脉来自胎盘，进入胎儿肝脏

和下腔静脉，含氧较充分，约 80%。脐动脉来自胎儿，注入胎盘与母体进行物质交换，所含血属静脉血。进入右心房的有来自脐静脉养分高的血液和来自胎儿下半身含氧量较低的混合血，胎儿体内无动脉血。左右心房之间的卵圆孔；于出生后数分钟开始关闭：出生后肺循环建立后动脉导管闭锁。

[单选题]8. 关于骨盆狭窄的诊断，哪项是错误的

- A. 入口前后径长小于 10cm 为骨盆入口狭窄
- B. 骨盆各径线比正常值小 1cm 为均小骨盆
- C. 坐骨棘间径 9cm 为中骨盆狭窄
- D. 耻骨弓小于 80° 可能为骨盆出口狭窄
- E. 骨盆出口横径+后矢状径=15cm 属于正常范围

参考答案：B

参考解析：骨盆入口、中骨盆及骨盆出口平面均狭窄，每个平面径线均小于正常值 2cm 或更多，称均小骨盆，多见于身材矮体型匀称的妇女。

[单选题]9. 正常分娩保护会阴的时间是

- A. 初产妇宫口开全时
- B. 初产妇胎头着冠时
- C. 初产妇宫口开大 4~5cm，宫缩规律有力时
- D. 经产妇宫口开全时
- E. 初产妇胎头拨露使阴唇后联合紧张时

参考答案：E

参考解析：初产妇宫口开全至 10cm，经产妇宫口开大 3~4cm 且宫缩好，可护送产房准备接生。当胎头拨露使阴唇后联合紧张时，开始保护会阴。

[单选题]10. 诊断中期妊娠，以下选项中最简易、可靠的方法是

- A. 闻及胎心
- B. 自觉胎动
- C. 子宫底平脐
- D. 扪诊胎头浮球感
- E. 胎儿心电图可见规律图形

参考答案：A

参考解析：中期妊娠孕妇可有不规律宫缩、胎动，但主观感觉不可靠；检查可发现子宫增大平脐，甚至扪及胎头浮球感，但不能完全与盆腔肿物鉴别，也不可靠；胎儿心电图不常用，需要胎儿心电图仪器和熟练阅读诊断的专业医师。最简易、可靠的诊断方法是在下腹部听到清晰的胎心音。当然如果能用 B 超探测到胎体更为准确，但相对而言，不是最经济、简单、易行的方法。

[单选题]11. 对孕晚期间断阴道流血伴不规则腹痛患者首选的检查是

- A. 阴道检查
- B. 肛查
- C. B 超检查

- D. 颈管内指诊
- E. 腹部 X 线平片

参考答案：C

参考解析：孕晚期间断阴道流血伴不规则腹痛患者，应警惕胎盘早剥、前置胎盘等可能。故首选的检查是 B 超检查。B 型超声断层显像可清楚看到子宫壁、胎先露部、胎盘和宫颈的位置。

[单选题]12. 初产妇，24 岁，足月顺产后第 4 日，纯母乳喂养，乳房胀痛，无红肿，乳汁排出不畅，体温 38.2℃，本例恰当的处理措施

- A. 让新生儿多吸吮双乳
- B. 生麦芽煎服
- C. 少喝水
- D. 吸奶器吸吮
- E. 抗生素治疗

参考答案：A

参考解析：产妇应于产后半小时内开始哺乳，此时乳房内乳量虽少，通过新生儿吸吮动作刺激泌乳。废弃定时哺乳，推荐按需哺乳。生后 2—7 日内是母体泌乳过程，哺乳次数应频繁些，母体下奶后一昼夜应哺乳 8—12 次。最初哺乳时间只需 3—5 分钟，以后逐渐延长至 15—20 分钟。让新生儿吸空一侧乳房后，再吸吮另侧乳房。每次哺乳后，应将新生儿抱起轻拍背部 1~2 分钟，排出胃内空气以防吐奶。哺乳期以 10 个月至 1 年为宜。结合此产妇情况，应让新生儿多吸吮双乳。

[单选题]13. 对输卵管妊娠的临床表现描述错误的是

- A. 患者常无明显停经史
- B. 异常阴道流血常被误认为月经来潮
- C. 约 95% 的患者有腹痛
- D. 休克程度与阴道流血量成比例
- E. 休克程度与阴道流血量不成比例

参考答案：D

参考解析：输卵管妊娠流产或破裂主要为内出血，所以休克程度与阴道流血量不成比例。

[单选题]14. 精液常规检查中下列指标不正常的是

- A. 精液量 2~6ml
- B. 精液液化时间在 30 分钟内
- C. 精液 pH 值为 7.8~8.7
- D. 精子数大于 6000 万/毫升
- E. 活动数大于 60%

参考答案：C

参考解析：正常的精液呈乳白色、淡黄色或者无色，每毫升为精液中的精子数

一般在 6 千万至 2 亿个。有活动能力的精子占总数的 60%以上。畸形精子应总数的 10%以下。精液呈弱碱性，PH 值为 7.2~7.8；精液量：1.5ml 以上；液化时间：室温下 60 分钟内，一般不超过 15 分钟。故选择 C。

[单选题]15. 糖尿病合并阴道炎以下哪种最常见

- A. 念珠菌性阴道炎
- B. 滴虫性阴道炎
- C. 外阴瘙痒症
- D. 外阴炎
- E. 前庭大腺脓肿

参考答案：A

[单选题]16. 关于子宫的解剖不正确的是

- A. 大小为 7cm×5cm×3cm
- B. 容积为 5ml
- C. 重量约 50g
- D. 成年女性的宫颈和宫体之比为 1:2
- E. 子宫峡部在非孕状态约为 2~3cm

参考答案：E

参考解析：子宫峡部位于宫体与宫颈之间最狭窄部位。非孕时长约 1cm，妊娠后变软，妊娠 10 周时子宫峡部明显变软。妊娠 12 周以后，子宫峡部逐渐伸展拉长变薄，扩展成为宫腔的一部分，临产后可伸展至 7-10cm，成为产道的一部分，此时称子宫下段。

[单选题]17. 初产妇，孕 34 周，重度子痫前期。经治疗 2 天，病情无改善，需终止妊娠。下述哪项检查是不必要的

- A. HPL 测定
- B. E3 测定
- C. NST 检查
- D. 宫颈黏液检查
- E. 羊水 US 值测定

参考答案：D

参考解析：此时应了解胎盘功能，胎盘功能检查包括胎盘功能和胎儿胎盘单位功能的检查，能间接判断胎儿状态。是对胎儿进行孕期的宫内监护，使能够早期发现隐性胎儿窘迫，有助于及时采取相应措施，使胎儿能在良好情况下生长发育，直至具有在宫外生活能力时娩出。有胎动、测定孕妇尿中雌三醇值、测定孕妇血清游离雌三醇值、测定孕妇血清胎盘生乳素值、测定孕妇血清妊娠特异性 p 糖蛋白、阴道脱落细胞检查、B 型超声行胎儿生物物理监测、NST 或 OCT 等。故选择 D。

[单选题]18. 对于产褥期中暑描述不恰当的是

- A. 产褥期中暑是一种中枢性体温调节障碍性疾病

- B. 产褥期中暑是一种感染性疾病
- C. 产褥期中暑是一种非感染性疾病
- D. 产褥感染患者容易产褥中暑
- E. 产褥病发生率中可以有产褥期中暑的患者

参考答案：B

参考解析：产褥中暑是指在产褥期因高温环境中，体内余热不能及时散发引起中枢性体温调节功能障碍的急性热病。产褥感染产妇可以发生产褥中暑，产褥中暑患者又可并发产褥感染。故选择 B。

[单选题]19. 初产妇，26 岁，妊娠 38

+1

周，胎头双顶径 9.3cm，男型骨盆，预计临产后不易发生的情况是

- A. 第一产程活跃期停滞
- B. 持续性枕后位
- C. 第一产程潜伏期延长
- D. 持续性枕横位
- E. 第二产程延长

参考答案：C

参考解析：男型骨盆的特点是骨盆入口平面前半部较狭窄，不适合胎头枕部衔接，后半部较宽，胎头容易以枕后位或枕横位衔接。这类骨盆常伴有中骨盆平面及骨盆出口平面狭窄，影响胎头在中骨盆平面向前旋转。为适应骨盆形态而成为持续性枕后位或持续性枕横位。由于扁平骨盆前后径短小，均小骨盆各径线均小，而骨盆入口横径最长，胎头常以枕横位入盆，由于骨盆偏小，胎头旋转困难，胎头便持续在枕横位。持续性枕后位常致活跃期晚期及第二产程延长。故预计临产后不易发生的情况是第一产程潜伏期延长。

[单选题]20. 目前我国孕产妇死亡的首位原因是

- A. 妊娠高血压综合征
- B. 产褥感染
- C. 产后出血
- D. 妊娠合并心脏病
- E. 妊娠合并病毒性肝炎

参考答案：C

参考解析：产后出血是目前我国孕产妇死亡的首位原因。

[单选题]21. 坐骨结节间径 7cm，后矢状径 7cm，足月妊娠应采取哪种分娩方式

- A. 自然分娩
- B. 会阴侧切
- C. 胎头吸引
- D. 产钳术
- E. 剖宫产

参考答案：E

参考解析：坐骨结节间径+后矢状径小于 15cm，足月妊娠应采取剖宫产。

[单选题]22. 下列哪项骨盆径线数值不正常

- A. 真结合径 11cm
- B. 对角径 10cm
- C. 坐骨结节间径 9cm
- D. 出口后矢状径 9cm
- E. 坐骨棘间径 10cm

参考答案：B

参考解析：对角径：骶上缘中点与耻骨联合下缘的距离，正常值为 12.5cm 到 13cm。

[单选题]23. 以下是正常阴道可寄居的微生物，除了

- A. 大肠埃希菌
- B. 加德纳菌
- C. 消化球菌
- D. 支原体
- E. 淋球菌

参考答案：E

参考解析：正常情况下有需氧菌及厌氧菌寄居于阴道内，形成正常阴道菌群。需氧菌包括：棒状杆菌、非溶血性链球菌、肠球菌、表皮葡萄球菌。兼性厌氧菌有乳杆菌、加德纳尔菌和大肠杆菌。厌氧菌包括消化球菌、消化链球菌、类杆菌、梭杆菌和动弯杆菌等。此外还有支原体及念珠菌。阴道与这些菌群形成一种平衡的生态，阴道环境影响着菌群，菌群也影响阴道环境。正常阴道中乳杆菌占优势，在维持阴道正常菌群中起关键作用。故选择 E。

[单选题]24. 女，33 岁。继发性闭经 1 年，雌激素试验(+)，FSH、LH 值均大于 5U/L，多次重复垂体兴奋试验无反应，闭经的原因在

- A. 丘脑下部
- B. 卵巢
- C. 垂体前叶
- D. 子宫
- E. 垂体后叶

参考答案：C

参考解析：行垂体兴奋试验.测得 LH 值明显升高，表明病变在下丘脑；若不增高，病变在垂体。而垂体前叶是腺垂体，后叶为神经垂体，故选择 C。

[单选题]25. 32 岁产妇，因严重妊高征、HELLP 综合征，刮宫产后 3 小时，有多器官功能障碍综合征及 DIC，血小板计数小于 $20 \times 10^9/L$ ，此时应考虑？

- A. 吸氧
- B. 使用利尿剂

- C. 肝素治疗
- D. 输注新鲜血
- E. 代谢支持

参考答案： D

参考解析：患者有多器官功能障碍综合征及 DIC，血小板计数小于 $20 \times 10^9/L$ ，应输注新鲜血补充凝血因子、血小板等。故选择 D。

[单选题]26. 关于阴蒂，下列错误的是

- A. 位于两侧小阴唇顶端的联合处
- B. 位于两侧大阴唇顶端的联合处
- C. 具有勃起性
- D. 分为阴蒂头、阴蒂体和两个阴蒂脚
- E. 敏感性极高

参考答案： B

参考解析：阴蒂位于两小阴唇顶端的联合处，它与男性阴茎海绵体相似。具有勃起性。它分为三部分，前端为阴蒂头，富含神经末梢，极敏感，中为阴蒂体，后部分为两个阴蒂脚，附着于各侧的耻骨支上。仅阴蒂头露见。故选择 B。

[单选题]27. 胎儿娩出后，对于因胎盘粘连而导致阴道大量出血，最佳的处理方法是

- A. 立即取出胎盘，并注射宫缩剂
- B. 抽血做交叉配血
- C. 阴道检查有无软产道裂伤
- D. 检查凝血功能
- E. 立即静脉输入生理盐水

参考答案： A

参考解析：胎儿娩出后，对于因胎盘粘连而导致阴道大量出血，最佳的处理方法为分娩后立即取出胎盘，及时应用子宫收缩药，如缩宫素、马来酸麦角新碱等，持续按摩子宫。

[单选题]28. 输卵管癌“三联征”是

- A. 阴道流血、阴道排液、腹痛
- B. 阴道排液、腹痛、盆腔包块
- C. 盆腔包块、阴道流血、腹痛
- D. 下腹坠胀、白带增多、盆腔包块
- E. 腹腔积液、阴道排液、下腹剧痛

参考答案： B

参考解析：输卵管癌“三联征”是阴道排液、腹痛、盆腔肿块，但具有典型“三联征”的患者不到 15%。

[单选题]29. 子宫内膜癌已侵犯宫颈管应做哪种治疗

- A. 单纯子宫全切术及盆腔淋巴结清除术

- B. 子宫颈锥切术
- C. 子宫次全切除及双附件切除
- D. 较广泛子宫切除+盆腔淋巴结清除术
- E. 广泛性全子宫及双附件+盆腔淋巴结清除术

参考答案： E

参考解析：子宫内膜癌已侵犯宫颈管为 II 期，应行广泛性全子宫及双附件+盆腔淋巴结清除术。

[单选题]30. 28 岁初孕妇，妊娠 38 周，晚 10 时因突然无痛性阴道大量流血入院，血压 80/60mmHg，子宫软，胎位左枕前位，胎心率 160 次/分，最佳处理方法应是

- A. 立即输血，纠正休克
- B. 立即做 B 超检查
- C. 输血同时做阴道检查、人工破膜
- D. 输血同时做剖宫产
- E. 输血同时静脉滴注缩宫素

参考答案： D

参考解析：妊娠晚期突然无痛性阴道大量流血，考虑为前置胎盘，前置胎盘终止妊娠指征：孕妇反复多量出血致贫血甚至休克者。无论胎儿成熟与否，为了母亲安全而终止妊娠；胎龄达 36 周以后；胎儿成熟度检查提示胎儿肺成熟者。而患者血压降低，阴道大量出血，剖宫产能迅速结束分娩，达到止血目的，使母儿相对安全，是目前处理前置胎盘的主要手段。应抗休克的同时行剖宫产术。故选择 D。

[单选题]31. 受精卵着床必须具备的条件不包括

- A. 透明带消失
- B. 受精卵发育至囊胚期
- C. 囊胚的滋养细胞层分化出合体滋养细胞
- D. 囊胚与子宫内膜同步发育
- E. 孕妇体内必须有足够数量的黄体酮

参考答案： B

参考解析：受精卵着床必须具备的条件：①透明带必须消失；②囊胚细胞滋养细胞层分化出合体滋养细胞；③囊胚和子宫内膜同步发育并相互配合；④孕妇体内必须有足够数量的黄体酮。受精后第三天受精卵还在运输过程即发育成早期囊胚，在囊胚晚期着床，但囊胚细胞滋养细胞层必须分化出合体滋养细胞、透明带消失之后，才具备着床能力。

[单选题]32. 孕妇，因过期妊娠入院待产。给予胎盘功能测定，下列结果提示胎盘功能低下的是

- A. 胎动 12 小时大于 15 次
- B. NST 试验有反应型

- C. $\text{HPL} \geq 4 \mu\text{g/L}$
- D. 尿 E3 $15\text{mg}/24$ 小时
- E. OCT 试验连续出现晚期减速

参考答案：E

参考解析：若多次宫缩后连续重复出现晚期减速，胎心率基线变异减少，胎动后无胎心率增快，为 OCT 阳性。若胎心率基线有变异或胎动后 FHR 加快，无晚期减速，为 OCT 阴性。若为阴性，提示胎盘功能良好，1 周内无胎儿死亡的危险，可在 1 周后重复本试验。若为阳性，提示胎盘功能减退。故选择 E。

[单选题]33. 关于重要脏器疾病，如病情稳定，应提出的婚育指导以下哪项除外

- A. 是否适合结婚
- B. 婚礼日期
- C. 是否适合生育
- D. 何时生育
- E. 不宜生育

参考答案：B

参考解析：提高人口素质也是一项亟待解决的问题。围生儿出生缺陷监测调查，与此同时，各地逐步开展围婚保健、优生咨询、产前诊断、新生儿遗传性疾病筛查等婚育指导。结合相关选项，故选择 B。

[单选题]34. 对于前列腺素(PG)在女性生殖系统中的描述，下列哪项不恰当？

- A. 参与排卵过程
- B. PG 在女性生殖器官中均有分布
- C. PGE 能使非孕子宫收缩
- D. PGF 也能使子宫收缩
- E. PGF_{2a} 可能是产生痛经的原因

参考答案：C

参考解析：前列腺素几乎存在于体内各重要组织和体液之中。在女性生殖系统中，子宫内膜、月经血及卵巢中均有分布。PG 对排卵、月经及子宫肌收缩可能有一定的作用。PG 可促使卵泡发育、卵巢激素分泌、诱发排卵、黄体维持及溶解过程。PGE 能使非妊娠子宫肌松弛，妊娠子宫肌收缩；PGF 则使非妊娠子宫肌及妊娠子宫肌均引起收缩。

[单选题]35. 关于淋病的治疗，下列哪项是错误的

- A. 淋病的首选药物为青霉素，大剂量一次治愈
- B. 对青霉素过敏可选用四环素、红霉素、多西环素、淋得治等
- C. 淋球菌性输卵管积脓，输卵管卵巢脓肿经药物治疗 3 天病情不改善应手术治疗
- D. 孕妇感染淋病对胎儿危害极大，而且妊娠期用药对胎儿不利，应终止妊娠
- E. 重型淋菌性盆腔炎应用水剂青霉素，头孢他林加庆大霉素、甲硝唑

参考答案：D

参考解析：在淋病高发地区，孕妇应于产前常规筛查淋菌，最好在妊娠早、中、晚期各作一次宫颈分泌物涂片镜检淋菌，推荐进行淋菌培养，以便及早确诊并得到彻底治疗。淋病孕妇主要选用抗生素治疗。

[单选题]36. 以下哪项不属于妊高征的临床表现

- A. 高血压
- B. 蛋白尿
- C. 水肿
- D. 胎位异常
- E. 抽搐

参考答案：D

参考解析：妊高征主要临床表现(1)高血压；(2)蛋白尿；(3)水肿；(4)自觉症状：一经诊断为妊高征，应随时注意有无头痛、眼花、胸闷、恶心及呕吐等症状。这些自觉症状的出现，表示病情发展已进入先兆子痫阶段，应及时作相应检查与处理。(5)抽搐与昏迷。故选择D。

[单选题]37. 65岁，绝经后阴道不规则出血半年，检查：宫颈呈菜花样，病变累及阴道，但未达下1/3，宫旁(-)，患者肥胖已确切的临床分期是

- A. Ia
- B. IIa
- C. IIb
- D. IIIa
- E. IIIb

参考答案：B

[单选题]38. 关于侵袭性葡萄胎的说法，正确的是

- A. 先行妊娠可以为任何一种妊娠
- B. 多在先行妊娠后6个月以内发生
- C. 光镜下找不到绒毛结构
- D. 不发生肺转移
- E. 不发生脑转移

参考答案：B

参考解析：侵袭性葡萄胎大体可见水泡状物或血块，镜检时有绒毛结构，滋养细胞过度增生及不典型增生的程度不等，具有过度的侵蚀能力。侵蚀性葡萄胎来自良性葡萄胎，多数在葡萄胎清除后6个月内发生。最常见转移部位是肺，其次是阴道、宫旁，脑转移少见。

[单选题]39. 活跃期是指？

- A. 宫口开大4cm到宫口开全
- B. 宫口开大1~4cm
- C. 胎儿娩出到胎盘娩出
- D. 宫口开全到胎儿娩出

E. 从临产到宫口开大 3cm

参考答案：A

参考解析：活跃期为宫口扩张的加速阶段，可在宫口开至 4~5cm 即进入活跃期，最迟至 6cm 才进入活跃期，直至宫口开全(10cm)。此期宫口扩张速度应 $\geq 0.5\text{cm/h}$ 。

[单选题]40. 女性，35 岁，侵蚀性葡萄胎治疗后，定期随访，HCG 正常 1 年，因“停经 45 天，左下腹痛伴少量阴道出血 3 天”就诊，血 HCG1200IU/L，B 超示内膜厚 1.1cm，左附件区 3.2cm×3.7cm 大小的不均质回声。以下哪种可能性最大？

- A. 侵蚀性葡萄胎转移
- B. 绒癌
- C. 早孕先兆流产
- D. 异位妊娠
- E. 早孕

参考答案：D

参考解析：患者侵蚀性葡萄胎定期随访后，HCG 正常 1 年，现有停经后阴道出血，血 HCG1200IU/L，B 超示内膜厚 1.1cm，左附件区 3.2cm×3.7cm 大小的不均质回声。考虑异位妊娠可能性更大。

[单选题]41. 关于卵泡发育和成熟的描述，不正确的是

- A. 青春期后卵泡发育成熟过程依赖促性腺激素的刺激
- B. 窦状卵泡阶段在 FSH 作用下颗粒细胞获得 LH 受体
- C. 每一个周期中有 2~3 个卵泡发育成熟
- D. FSH 与颗粒细胞上的 FSH 受体，结合激活芳香化酶活性，使雄激素转化成雌激素
- E. 排卵前卵泡体积明显增大，可达 15~20mm

参考答案：C

参考解析：正常妇女生育期每个周期有数个至十数个卵泡生长、发育，但只有一个卵泡发育成熟，偶有两个，其余卵泡均闭锁。故选择 C。

[单选题]42. 女，27 岁，诉妊娠 4+月，昨搬重物后，腰酸，下坠感，今上午下腹始有阵痛，持续加重，半小时前阴道有流液，量较多，湿透内裤，急诊来院。如确诊胎膜已破，最适当的处理是

- A. 安胎
- B. 刮宫
- C. 用宫缩药物尽早使胚胎、胎盘组织排出
- D. 抗感染
- E. 输血

参考答案：C

参考解析：产妇现妊娠 4+月，已确诊为胎膜早破，故此时最恰当的处理是用宫

缩药物尽早使胚胎、胎盘组织排出。

[单选题]43. 推算预产期最可靠的依据是

- A. 末次月经第 1 天
- B. 开始早孕反应的日期
- C. 开始胎动的日期
- D. 基础体温测定
- E. 妇科检查确诊早孕日期

参考答案：A

参考解析：问清末次月经日期，推算预产期。推算方法是按末次月经第一日算起，月份减 3 或加 9，日数加 7。若孕妇记不清末次月经日期或于哺乳期无月经来潮而受孕者，可根据早孕反应开始出现的时间、胎动开始时间、手测子宫底高度、尺测耻上子宫长度加以估计。推算预产期最可靠的依据是末次月经第 1 天。

[单选题]44. 关于卵巢交界性肿瘤，下列描述错误的是

- A. 上皮细胞增生活跃
- B. 无核异型性
- C. 上皮细胞层数增加
- D. 属低度潜在恶性肿瘤
- E. 有间质浸润

参考答案：E

参考解析：卵巢交界性肿瘤上皮细胞增生活跃，无核异型性，上皮细胞层数增加，属低度潜在恶性肿瘤。故选择 E。

[单选题]45. 妊娠合并重症肝炎的诊断要点不包括

- A. 酶胆分离
- B. 严重消化道症状
- C. 黄疸迅速加重
- D. 肝脏进行性缩小
- E. 肝细胞脂肪变性

参考答案：E

参考解析：妊娠合并重症肝炎的诊断要点(1)消化道症状严重，表现食欲极度减退，频繁呕吐，腹胀，出现腹水。(2)黄疸迅速加深，血清总胆红素值大于 171mmol/L 。(3)出现肝臭气味，肝呈进行性缩小，肝功能明显异常，酶胆分离，白/球蛋白倒置。(4)凝血功能障碍. 全身出血倾向。(5)迅速出现肝性脑病表现，烦躁不安、嗜睡、昏迷。(6)肝肾综合征出现急性肾功能衰竭。

[单选题]46. 女，52 岁，细胞学已证实为子宫内膜癌，宫腔长 8cm，宫颈无癌侵犯，腹腔冲洗液无癌细胞，应选用

- A. 单纯手术
- B. 放疗

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/908063103136007023>