

2024 年广西壮族自治区《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必背 200 题题库及参考答案（综合卷）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 乙醇+呋喃唑酮

- A: 造成听神经和肾功能不可逆性损害
- B: 抑制乙醛脱氢酶
- C: 抑制氧化代谢反应
- D: 产生有利的药物相互作用

答案：B

2. 肾上腺皮质激素可能引起

- A: 尿蛋白
- B: 尿胆红素
- C: 尿葡萄糖
- D: 尿液隐血

答案：C

3. 同时使用 2 种药物，药物不良事件的发生率为

- A: 0.38
- B: 0.72
- C: 0.58
- D: 0.13

答案：D

4. 与硫酸亚铁合用，可减少铁吸收的药物是

- A: 叶酸
- B: 奥美拉唑
- C: 克拉维酸钾
- D: 苧丝肼

答案：B

5. 低比重尿主要见于

- A: 急性肾衰竭少尿期
- B: 尿崩症
- C: 急性肾小球肾炎
- D: 糖尿病

答案：B

6. 可引起嗜酸性粒细胞增多的药物是()

- A: 碳酸氢钠
- B: 氯苯那敏
- C: 头孢氨苄
- D: 坎地沙坦

答案：C

7. 药学服务的具体内容不包括

- A: 药学信息收集
- B: 处方的审核与调配
- C: 静脉药物配置
- D: 药品推销

答案：D

8. 仅用于绝经后妇女，不适用于男性患者的抗骨质疏松药物是

- A: 雷洛昔芬
- B: 骨化三醇
- C: 阿法骨化醇
- D: 帕米磷酸二钠

答案：A

9. 可发生抗惊厥药物过敏综合征等严重不良反应的抗癫痫药是

- A: 拉莫三嗪
- B: 苯妥英钠
- C: 丙戊酸钠
- D: 卡马西平

答案：D

10. 服药后饮水冲淡对感受器刺激作用的药物是

- A: 利胆药
- B: 抗尿结石药
- C: 苦味健胃药
- D: 抗利尿药

答案：C

11. 患者，女，56 岁，身高 156m，体重 61kg。空腹血糖 7.8mmol/L，餐后血糖 11.2mmol/L，糖化血红蛋白 6.7%。

- A: 饮食及运动治疗
- B: 口服二甲双胍
- C: 口服 α -糖苷酶抑制剂
- D: 口服磺酰脲类降糖药

答案：B

12. 与阿米卡星合用会影响其排泄导致急性肾损害的药物是()

- A: 维生素 B
- B: 铝碳酸镁
- C: 阿司匹林
- D: 伏立康唑

答案: C

13. WHO 推荐 12 岁以下儿童碘的摄入范围是

- A: 50~100 $\mu\text{g}/\text{d}$
- B: 50~120 $\mu\text{g}/\text{d}$
- C: 30~100 $\mu\text{g}/\text{d}$
- D: 30~120 $\mu\text{g}/\text{d}$

答案: B

14. 以下有关肝功能不全病人用药的叙述中，不正确的是

- A: 静脉给药可不调整剂量
- B: 定期检查肝功能，及时调整治疗方案
- C: 避免或减少使用或合用对肝脏毒性大的药物
- D: 明确诊断，合理选药

答案: A

15. “隔日 1 次”的外文缩写为()。

- A: gtt
- B: Ad
- C: Add
- D: qod

答案: D

16. (2017 年真题) 服用后可致嗜睡, 驾驶员应慎用的药物是 ()

- A: 吲达帕胺
- B: 胰酶
- C: 氯苯那敏
- D: 阿司匹林

答案: C

17. 中毒时可采用催吐处理方法的患者

- A: 昏迷状态病人
- B: 中毒引起抽搐, 惊厥被控制之后的清醒病人
- C: 孕妇患者
- D: 患有严重心脏病的患者

答案: B

18. 以下不同群中, 白细胞计数正常值参考范围的数值最高的是

- A: 成人男性
- B: 成人女性
- C: 新生儿
- D: 儿童

答案: C

19. 属于浓度依赖性抗生素的是

- A: 林可霉素
- B: 青霉素
- C: 美沙拉秦肠溶片
- D: 多黏菌素

答案: D

20. 患者，女，85 岁，既往有高血压病史，慢性心力衰竭，给予地高辛每日维持量治疗，近 Et 频发室性心动过速，检测血钾值在正常范围。

- A: 胺碘酮
- B: 苯海拉明
- C: 苯巴比妥
- D: 阿托品

答案：D

21. 可引起血小板减少症的抗肿瘤药物是

- A: 甲氨蝶呤
- B: 阿昔洛韦
- C: 阿洛司琼
- D: 利巴韦林

答案：A

22. 博来霉素的主要毒副作用是（）

- A: 心脏毒性
- B: 溶血性尿毒症
- C: 肺纤维化
- D: 出血性膀胱炎

答案：C

23. 能降 LDL 也降 HDL 的药物是

- A: 非诺贝特
- B: 塞伐他汀
- C: 普罗布考
- D: 烟酸

答案：C

24. 阿托品与小活络丹合用

- A: 合用后抑制后者吸收，降低疗效
- B: 合用后增加毒性，出现药物中毒
- C: 两者合用作用相反，互相降低药效
- D: 合用抑制呼吸，易致呼吸衰竭

答案：B

25. 含铁量高，服用后起效快的药品是

- A: 富马酸亚铁
- B: 硫酸亚铁
- C: 乳酸亚铁
- D: 葡萄糖酸亚铁

答案：A

26. （2019 年真题）患者，男，73 岁，胃溃疡病史 2 年，半年前出现静止性震颤，搓丸样，运动迟缓，面具脸，慌张步态，该患者应使用的药物是

- A: 司来吉兰
- B: 多巴丝肼（苄丝肼左旋多巴）
- C: 多奈哌齐
- D: 甲基多巴

答案：B

27. 引起视网膜变性而致失明，服药半年左右应查眼底 DMARDs 是

- A: 硫唑嘌呤
- B: 氯喹

C: 环孢素

D: 利妥昔单抗

答案: B

28. 对混合型血脂异常，必须联用他汀类和贝特类，最佳的给药方案是

A: 早晚联合服用他汀类和贝特类

B: 晚上联合服用他汀类和贝特类

C: 早晨用贝特类，晚上用他汀类

D: 早晨用他汀类，晚上用贝特类

答案: C

29. 属于质子泵抑制剂的是 ()

A: 多潘立酮

B: 埃索美拉唑

C: 铝碳酸镁

D: 法莫替丁

答案: B

30. 与葡萄柚汁同服可能升高血药浓度的药物是 ()

A: 左旋多巴片

B: 维 A 酸片

C: 非洛地平片

D: 地衣芽孢杆菌活菌胶囊

答案: C

31. 抗结核药异烟肼与昆布合用可以失去抗结核杆菌的功能，是因为昆布中含有

A: 碘

B: 钙

C: 氯

D: 钾

答案：A

32. (处方容易混淆的常用外文缩写的识别) 生理盐水

A: NS

B: LD

C: O

D: DOL

答案：A

33. 接种乙肝疫苗可产生哪种抗体()。

A: HBsAb

B: HBeAb

C: HBsAg

D: HBeAg

答案：A

34. 人体贮存能量的形式为

A: 三酰甘油

B: 胆固醇

C: 糖化血红蛋白

D: 高密度脂蛋白胆固醇

答案：A

35. (体内贮铁量与血浆铁的运转率的关系)，铁缺乏时铁剂的吸收率可达

A: 20%~40%

B: 10%~20%

C: 15%~20%

D: 20%~60%

答案：D

36. 不属于处方前记内容的是()。

A: 药品名称、剂型、规格、数量、用法用量

B: 医疗、预防、保健机构名称

C: 患者姓名、性别、年龄

D: 门诊或住院病历号、日期

答案：A

37. 维生素 D3 用于

A: 习惯性流产的辅助治疗

B: 防治坏血病

C: 防治佝偻病

D: 防治夜盲症

答案：C

38. 能使人长时间忍受肌肉疼痛的是

A: 利尿剂

B: 肽类激素

C: 蛋白同化激素

D: 麻醉药品

答案：D

39. 下列药物中，有效治疗浓度范围与中毒浓度范围相接近的是

- A: 四环素
- B: 氯噻嗪
- C: 地高辛
- D: 阿托品

答案：C

40. (2016 年真题) 患者到药店购买“扑尔敏片”，药师应给予（）。

- A: 更昔洛韦片
- B: 奥司他韦片
- C: 阿昔洛韦片
- D: 氯苯那敏片

答案：D

41. 老年人应用下列药物可引起何种不良反应, 抗胆碱药如阿托品等可诱发

- A: 室性期前收缩、房室传导阻滞及低钾血症
- B: 脱水、低钾血症
- C: 嗜睡及头晕
- D: 青光眼, 甚至致盲

答案：D

42. 可迅速崩解和释放药物的制剂

- A: 膜剂
- B: 泡腾片剂
- C: 透皮贴剂
- D: 滴丸剂

答案：B

43. 应在餐前服用的药物是

- A: 吡罗昔康片
- B: 呋塞米片
- C: 胶体果胶铋胶囊
- D: 氨茶碱片

答案：C

44. 某女性，45 岁，肥胖多年，自觉口渴、消瘦 5 个月，尿糖阳性，空腹血糖 8.9mmol/L，餐后两小时血糖 15.1mmol/L

- A: 磺脲类降糖药
- B: α -葡萄糖苷酶抑制剂
- C: 胰岛素
- D: 双胍类降糖药

答案：D

45. 治疗真菌性阴道炎可选用

- A: 复方角菜酸酯栓
- B: 克霉唑栓
- C: 复方苯甲酸酊
- D: 阿达帕林凝胶

答案：B

46. 属于 β 受体阻断剂的是

- A: 福莫特罗
- B: 美托洛尔
- C: 乙酰胆碱
- D: 异丙托溴铵

答案：B

47. 肾素抑制剂

- A: 依普利酮
- B: 雷米普利
- C: 阿利吉仑
- D: 阿米洛利

答案：C

48. 在三级信息源中，世界上最著名的大型药物参考工具书是

- A: 中国药典
- B: 马丁代尔药物大典
- C: 美国药典药物信息
- D: 药物事实与比较

答案：B

49. “美国心脏病学院与美国心脏协会 2014 年颁布了(2013 版成人降胆固醇治疗降低动脉粥样硬化性心血管疾病风险指南》，强调他汀类药物在降低急性冠脉综合征风险方面的获益”表明循证医学实践能够

- A: 有利于诊断特殊疾患
- B: 改变降脂治疗观念
- C: 列为医药卫生行政决策的依据
- D: 有助于个体化给药

答案：B

50. (2015 年真题) 非甾体抗炎药引起的典型药源性疾病是 ()。

- A: 胃肠类疾病
- B: 神经系统疾病
- C: 肝病

D: 血液系统疾病

答案：A

51. 某男性患者，57 岁，既往高血压病史 10 年，与儿子吵架后突然起病，言语不清，左侧肢体无力，意识不清。查体：BP220 / 120mmHg，中度昏迷，瞳孔不等大，对光反射消失，强痛刺激(+)，左侧肢体不活动，左侧巴彬斯基征阳性。

A: 脑出血

B: 缺血性脑卒中

C: 短暂性脑缺血发作

D: 脑血栓形成

答案：A

52. 药学服务的对象是

A: 患者

B: 医务人员

C: 广大公众

D: 患者家属

答案：C

53. 孕妇的急性膀胱炎治疗时间为（）

A: 10-15 天

B: 8-10 天

C: 3-7 天

D: 5-10 天

答案：C

54. 医师用药咨询的内容是

- A: 不宜选用氯化钠注射液溶解的药品
- B: 抗菌药物的合理使用
- C: 栓剂、气雾剂等外用剂型的正确使用方法
- D: 减肥、补钙、补充营养素

答案：B

55. 患尿路感染，在无病原学结果前，一般首选

- A: 针对革兰阳性球菌有效的抗菌药物
- B: 针对革兰阴性杆菌有效的抗菌药物
- C: 针对革兰阳性杆菌有效的抗菌药物
- D: 针对革兰阴性球菌有效的抗菌药物

答案：B

56. 高胆固醇血症，首选的治疗药物是

- A: 贝特类
- B: 他汀类
- C: ω -3 脂肪酸
- D: 烟酸

答案：B

57. 高血压合并心力衰竭不宜用下哪种药物

- A: 氢氯噻嗪
- B: 呋塞米
- C: 普萘洛尔
- D: 卡托普利

答案：C

58. (2018 年真题) 患者, 男 58 岁, 高血压病史 5 年, 吸烟史 40 年, 日均 40 支, 6 小时前出现左侧肢体无力, 并逐渐加重, 不能站立, 家属发现其说话迟钝含混, 右侧嘴唇变浅, 意识清楚, 到某院急诊 BP190/120mmHg, 血常规基本正常, 行头部 MRI 检查后, 诊断为急性脑梗死。

- A: 呋塞米片 200mgqdp
- B: 甘露醇注射液 250mlq6hiv
- C: 胞二磷胆碱注射液 200mgqdiv
- D: 尼莫地平注射液 20mgqdiv

答案: B

59. 患者, 男, 60 岁, 呈典型的"面具脸", "慌张步态"及"小字症"表现, 确诊为帕金森病, 患者同时患有闭角型青光眼, 不宜选用的治疗帕金森病的药物是()

- A: 多奈哌齐
- B: 司来吉兰
- C: 左旋多巴
- D: 普拉克索

答案: C

60. 上市后药品再评价阶段属于

- A: I 期临床试验
- B: II 期临床试验
- C: IV 期临床试验
- D: III 期临床试验

答案: C

61. 患者，男，70 岁，两周前因缺血性脑卒中入院治疗，经积极治疗，病情显著缓解后出院，目前无其他伴随疾病，为进行心脑血管事件的二级预防，应首选的药物是

- A: 肝素
- B: 利伐沙班
- C: 氯吡格雷
- D: 阿司匹林

答案：D

62. 心力衰竭的支气管哮喘禁用

- A: β 受体阻断剂
- B: 利尿剂
- C: RAAS 抑制剂
- D: 强心苷

答案：A

63. 患者，女，64 岁，既往高血压病病史 15 年，活动后心悸、气短 3 年，2 小时前无明显诱因突发喘憋。体检：端坐体位，BP190 / 110mmHg，R30 次 / 分，Bp108 次 / 分，心界向左侧扩大，双肺可闻及广泛湿啰音。

- A: 硝苯地平
- B: 西地兰
- C: 硝普钠
- D: 多索茶碱

答案：B

64. (痛风的不同分期的治疗原则)，哪个时期的治疗原则是以控制关节炎症(红肿、疼痛)为目的，尽早使用抗炎药

- A: 痛风性肾病治疗期
- B: 首次发作期
- C: 发作间歇期
- D: 急性发作期

答案：D

65. 解救铅中毒的是（）

- A: 依地酸钙钠
- B: 二巯丙醇
- C: 盐酸戊乙奎醚
- D: 单价抗毒血清

答案：A

66. 6 个月～2 岁婴幼儿白细胞计数正常参考区间是

- A: $(4.0 \sim 10.0) \times 10^9 / L$
- B: $(200 \sim 300) \times 10^9 / L$
- C: $(100 \sim 300) \times 10^9 / L$
- D: $(11.0 \sim 12.0) \times 10^9 / L$

答案：D

67. 关于处方书写中的基本要求错误的

- A: 年龄必须写实足年龄
- B: 中药饮片调剂、煎煮的特殊要求注明在药品左上方并加括号
- C: 一般情况下均要注明临床诊断
- D: 麻醉药品处方应有病历记录

答案：B

68. 下列药物中，即使肾功能不全的病人也可使用原剂量或略减少的是

- A: 氨苄西林
- B: 卡那霉素
- C: 多粘菌素
- D: 庆大霉素

答案：A

69. 妊娠早期是胚胎器官和脏器的分化时期，最易受外来药物的影响引起胎儿畸形。胎儿形成期，器官形成过程已经大体完成并继续发育，某些药物可导致胎儿发育异常。

- A: 妊娠 3~5 周
- B: 妊娠 3~4 周
- C: 妊娠 1~3 周
- D: 妊娠 1~2 周

答案：A

70. (2019 年真题) 儿童退热的用药选择和单次用量，正确的是

- A: 对乙酰氨基酚 10~15mg/kg
- B: 阿司匹林 30~60mg/kg
- C: 对乙酰氨基酚 25~50mg/kg
- D: 布洛芬 0.4~0.6g (12 岁以上儿童)

答案：A

71. (毒物及药物中毒解救)，烯丙吗啡用于解救

- A: 氰化物中毒
- B: 有机磷中毒
- C: 吗啡中毒
- D: 水银中毒

答案：C

72. 患儿，女，4 岁半，身高 110cm，体重 15KG，一天前发热(39℃)，咽喉痛，无咳嗽、吐血，家长主诉在家中应用退烧药治疗，发病左右出现腹泻，约 2~5 次大便，量少，黄色粘液便，呕吐一次。体格检查：T38.8℃，P118 次/分，R28 次/分。咽微充血，出现轻脱水症状。双肺呼吸音清，腹平软，肝脾未触及，肠鸣音活跃，实验室检查：WBC： 5×10

- A: 洛哌丁胺
- B: 小柴碱
- C: 药用炭
- D: 鞣酸蛋白

答案：A

73. 具有肾毒性，需要大量输注时，需同时给予利尿药的是

- A: 多柔比星
- B: 氨氯地平
- C: 紫杉醇
- D: 顺铂

答案：D

74. 苯丙酸诺龙属于哪一类兴奋剂

- A: 蛋白同化激素
- B: β 受体阻断剂
- C: 利尿剂
- D: 精神刺激剂

答案：A

75. 下列哪项不是尿路感染的易感因素

- A: 过度憋尿
- B: 不洁性活动
- C: 细菌感染
- D: 尿路梗阻

答案：C

76. 在葡萄糖注射液极易裂解的是

- A: 红霉素
- B: 苯妥英钠
- C: 青霉素
- D: 氯化钾

答案：C

77. 成人末梢血白细胞(WBC)计数正常参考区间是

- A: $(4.0 \sim 10.0) \times 10$
- B: 180~220g/L
- C: 170~200g/L
- D: $(15.0 \sim 20.0) \times$

答案：A

78. 饮用含葡萄柚汁的饮料可能影响一些药物药动学的机制是

- A: 诱导 CYP3A4
- B: 抑制 CYP1A2
- C: 抑制 CYP3A4
- D: 抑制 CYP2C9

答案：C

79. 药源性疾病是由药物诱发的疾病，是指在预防、诊断、治疗或调节生理功能过程中出现与用药有关的人体功能异常或组织损伤所引起的一系列临床症状。引起药源性疾病的因素主要有患者因素和药物因素。

- A: 假胆碱酯酶遗传性缺陷者应用琥珀胆碱出现呼吸暂停
- B: 肝硬化患者应用利多卡因，可引起严重中枢神经系统疾病
- C: 月经期服用常规剂量的避孕药和地西泮，其药理效应增强
- D: 慢乙酰化者服用异烟肼后，其半衰期延长至 2~4.5h

答案：B

80. 以下被评判为“过度治疗用药”的处方用药中，正确的是

- A: 忽略病情和患者的基础疾病
- B: 滥用糖皮质激素、人血白蛋白、二磷酸果糖
- C: 盲目而无效果地应用肿瘤辅助治疗药物
- D: 咳嗽、C 反应蛋白正常者给予阿奇霉素

答案：B

81. 消化不良很常见，半数以上人群在生命过程中曾因此病症而就诊，其主要症状有上腹饱胀、食欲缺乏等表现。

- A: 雷尼替丁
- B: 莫沙必利
- C: 胰酶片
- D: 复方阿嗪米特肠溶片

答案：A

82. 抗凝治疗

- A: 阿司匹林
- B: 巴曲酶

C: 阿替普酶

D: 低分子肝素

答案：D

83. 其含量用视黄醇当量(RE)表示的是

A: 维生素 D

B: 维生素 A

C: 维生素 B

D: 维生素 E

答案：B

84. 《中华人民共和国药典》、国家食品药品监督管理局颁布标准收载的处方属于

A: 普通处方?

B: 急诊处方?

C: 法定处方?

D: 医师处方?

答案：C

85. 属于单胺氧化酶抑制剂的药品是

A: 吗氯贝胺

B: 度洛西汀

C: 雷尼替丁

D: 奥美拉唑

答案：A

86. 适用于伴发膀胱过度活动症的良性前列腺增生症的是 ()

A: 特拉唑嗪

B: 非那雄胺

C: 米多君

D: 奥昔布宁

答案: D

87. 伴有过敏性鼻炎、阿司匹林哮喘可选用的药物是

A: 孟鲁司特

B: 沙美特罗

C: 异丙托溴铵

D: 沙丁胺醇

答案: A

88. 患者，男，48 岁，近日自感头晕、头痛、眼花、耳鸣、心悸、失眠、乏力等症状，就诊后测定血压 160 / 100mmHg。

A: ACEI

B: β 受体阻断药

C: AR

D: 钙通道阻滞药

答案: A

89. 治疗抗肿瘤药物引起的恶心、呕吐等不良反应，可选用的止吐药物是

A: 昂丹司琼

B: 雷尼替丁

C: 维生素 B6

D: 奥美拉唑

答案: A

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必背 200 题题库，word 格式
可自由下载编辑，附完整答案！

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/908105023045007022>