

2024 年辽宁省北镇市《执业药师之西药学专业二》考试题库附答案【达标题】

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 入睡困难患者首选哪种催眠药物

- A: 氯硝西泮
- B: 艾司唑仑
- C: 谷维素
- D: 劳拉西泮

答案：B

2. 对红霉素的描述，下列不正确的是()

- A: 抗菌谱与青霉素相似但略广
- B: 对青霉素耐药的金黄色葡萄球菌有效
- C: 具有肝脏毒性
- D: 属繁殖期杀菌剂

答案：D

3. 下列关于胺碘酮的叙述错误的是

- A: 可以用于窦房传导阻滞
- B: 对室上性和室性心律失常均有效
- C: 适用于合并器质性心脏病的心率失常
- D: 促心率失常反应少

答案：A

4. 与多柔比星合用或配伍与多柔比星合用或配伍

- A: β 受体阻断剂
- B: 阿糖胞苷
- C: 利福平
- D: 甲氨蝶呤

答案：B

5. 广谱抗菌药，对细胞内外的结核分枝杆菌、麻风杆菌均有抑制作用的是

- A: 乙胺丁醇
- B: 吡嗪酰胺
- C: 异烟肼
- D: 利福平

答案：D

6. 抗酸作用较强、快而持久，可引起反跳性胃酸分泌增多

- A: 碳酸钙
- B: 三硅酸镁
- C: 氢氧化铝
- D: 氢氧化镁

答案：A

7. (2017 年真题) 患者，男，62 岁。高血压病史 10 年，既往有骨关节炎和血脂异常，轻度心功能不全。近期体检发现血压 162mmHg，心率 72 次/分。该患者目前服用药物除抗高血压药外有辛伐他汀、双氯芬酸、氨基葡萄糖、甲钴胺及碳酸钙 D。

- A: 利血平+氨苯蝶啶
- B: 硝酸甘油+美托洛尔
- C: 氨氯地平+氢氯噻嗪

D: 特拉唑嗪+氢氯噻嗪

答案: C

8. 属于 5-HT₃ 受体阻断剂的止吐药物是

A: 甲地孕酮

B: 甲氧氯普胺

C: 格雷司琼

D: 阿瑞吡坦

答案: C

9. 轻度阻滞 Na⁺通道的药物是

A: 普鲁卡因胺

B: 胺碘酮

C: 普萘洛尔

D: 利多卡因

答案: D

10. 下列不属于凝血因子 X 抑制剂的是

A: 阿哌沙班

B: 利伐沙班

C: 磺达肝癸钠

D: 华法林

答案: D

11. 青霉素常见的不良反应

A: 恶心、腹痛、腹泻、食欲减退

B: 锥体外系反应

C: 过敏反应

D: 细胞缺氧、酸中毒、休克

答案：C

12. 患者，男，50 岁。旅游登山时突发头晕，症状持续不缓解。查体：148 / 90mmHg，心率 80 次 / 分，医嘱卡托普利、氢氯噻嗪治疗。

A: 促进缓激肽水解

B: 阻断 AT1 受体

C: 抑制循环系统的转换酶，减少血管紧张素 II 的生成

D: 作用于 RAAS 初始环节，从源头减少血管紧张素 II 的生成

答案：C

13. 在体内主要经 CYP3A4 代谢的质子泵抑制剂是

A: 枸橼酸铋钾

B: 兰索拉唑

C: 铝碳酸镁

D: 米索前列醇

答案：B

14. 对偶发性失眠者可选择()。

A: 艾司唑仑

B: 氟西泮

C: 夸西泮

D: 唑吡坦

答案：D

15. 有促进骨骼致密作用，可用于绝经期妇女治疗骨质疏松的药物是

A: 孕激素

B: 短效口服避孕药

C: 长效避孕药

D: 雌激素

答案：D

16. 奥美拉唑抑制胃酸分泌的机制是()

A: 抑制胃壁细胞 H

B: 阻断促胃液素受体

C: 阻断 H

D: 阻断 M 受体

答案：A

17. (2021 年真题) 常见不良反应为泌尿生殖系统感染的口服降糖药物是()

A: 二甲双胍

B: 沙格列汀

C: 吡格列酮

D: 达格列净

答案：D

18. 患者男性，29 岁，阴茎头部出现下疳两个月就诊。有不洁性接触史。临床诊断为梅毒。立即给予青霉素注射治疗，十分钟后患者出现胸闷，全身瘙痒、面部发麻，查体：血压 85/60mmHg，脉率 110 次/分。

A: 吸氧，给予普萘洛尔

B: 给予肾上腺素

C: 减少药物剂量

D: 给予糖皮质激素

答案：B

19. 阿托品禁用于

- A: 遗尿症
- B: 青光眼
- C: 胆绞痛
- D: 全身麻醉前给药

答案：B

20. 阻断 H

- A: 雷尼替丁
- B: 氢氧化铝
- C: 哌仑西平
- D: 奥美拉唑

答案：A

21. 患者，男，70 岁。进食后饱胀不适伴反酸 5 年余，黑便 1 天。胃镜检查提示胃多发性溃疡(A

- A: 埃索美拉唑钠
- B: 替米沙坦
- C: 美托洛尔
- D: 胶体果胶铋胶囊

答案：D

22. 患者女，孕 8 周，诊断为“甲状腺功能减退症”给予左甲状腺素钠片治疗对该患者的用药指导，错误的是（）

- A: 左甲状腺素钠极少通过胎盘治疗剂量下对胎儿无不良影响
- B: 孕期甲减可能对胎儿造成不良影响，服药期间应监测甲功
- C: 应于早餐后将一日剂量左甲状腺素钠片一次性用温水送服

D: 服用左甲状腺素钠片期间如出现心悸、多汗或体重下降,应及时就诊

答案: C

23. (2021 年真题) 通过直接抑制凝血因子 Xa 而发挥作用的抗凝血药物 ()

A: 利伐沙班

B: 氯吡格雷

C: 依诺肝素

D: 华法林

答案: A

24. 糖皮质激素的禁忌证不包括 ()

A: 创伤或手术恢复期

B: 妊娠初期和产褥期

C: 严重的高血压、糖尿病

D: 角膜炎、虹膜炎

答案: D

25. 患儿, 男, 5 日。昨起拒食、反应差, 今日皮肤明显黄染入院。体检: 颈周、前胸多个小脓疱, 心肺无异常, 肝右肋下 2. 5cm, 脾肋下 1cm, 诊断为新生儿败血症, 给予头孢曲松治疗。

A: 新生儿对头孢曲松不敏感

B: 新生儿出现明显皮肤黄染时, 不宜使用头孢曲松

C: 新生儿肾功能未发育完全, 不宜使用头孢曲松

D: 新生儿肝功能未发育完全, 不宜使用头孢曲松

答案: B

26. 临床常用于治疗结核病的药物是

- A: 阿奇霉素
- B: 两性霉素 B
- C: 甲硝唑
- D: 链霉素

答案：D

27. 强心苷的心脏毒性反应中最常见的心律失常是

- A: 二联律
- B: 室性期前收缩
- C: 房性期前收缩
- D: 房颤

答案：B

28. 下列属于短效糖皮质激素的是

- A: 甲泼尼龙
- B: 泼尼松
- C: 泼尼松龙
- D: 氢化可的松

答案：D

29. 糖皮质激素用于中毒性感染及各种休克宜选择的给药方法是

- A: 小剂量替代疗法
- B: 隔日一次给药法
- C: 一般剂量长期疗法
- D: 大剂量冲击疗法

答案：D

30. 作用强而持久，不仅对子宫底，而且对子宫颈部都有很强的收缩作用，剂量稍大即产生强直性收缩，不适用于催产或引产，主要用于产后子宫出血或子宫复原不佳的是

- A: 麦角新碱
- B: 缩宫素
- C: 地诺前列酮
- D: 普拉睾酮

答案：A

31. (2017 年真题) 可能引起中性粒细胞减少的药物 ()

- A: 碘，碘化物
- B: 左甲状腺素
- C: 丙硫氧嘧啶
- D: 鲨肝醇

答案：C

32. 链激酶的作用机制是

- A: 抑制血小板聚集
- B: 加速抗凝血酶Ⅲ的作用
- C: 促进纤维蛋白溶解
- D: 抑制维生素 K 在肝细胞合成凝血因子

答案：C

33. 不宜应用喹诺酮类药物的人群是

- A: 婴幼儿
- B: 老年人
- C: 肝病患者
- D: 溃疡病患者

答案：A

34. (2016 年真题) 可导致神经毒性 (四肢麻木、腱反射消失) 的抗肿瘤药是

- A: 柔红霉素
- B: 长春新碱
- C: 博来霉素
- D: 紫杉醇

答案：B

35. 下列可引起糖尿病患者血糖过低，而对非糖尿病患者无降血糖作用的抗心律失常药物是

- A: 胺碘酮
- B: 普萘洛尔
- C: 美西律
- D: 地尔硫革

答案：B

36. 抑制胰岛素释放和组织对葡萄糖的利用，升高血糖的是 ()

- A: 氯苯蝶啶
- B: 氢氯噻嗪
- C: 螺内酯
- D: 呋塞米

答案：B

37. 急性化脓性中耳炎局部治疗，鼓膜穿孔后可使用 ()

- A: 2% 酚甘油滴耳液
- B: 3% 过氧化氢溶液

C: 3%酚甘油滴耳液

D: 2%过氧化氮溶液

答案：B

38. 低分子量肝素发挥抗凝作用主要抑制的凝血因子是

A: 因子Xa

B: 因子IIa

C: 凝血酶III (AT—III)

D: 因子IXa

答案：A

39. 以下避孕药不受月经周期限制的是

A: 孕二烯酮

B: 双炔失碳酯

C: 左炔诺孕酮

D: 去氧孕烯

答案：B

40. 用维生素 B

A: 锂

B: 钙

C: 钾

D: 钠

答案：C

41. 有关阿莫西林特点的说法正确的是

A: 广谱青霉素，对革兰阴性菌也有效

B: 耐酸、耐酶

C: 对耐药金葡萄菌有效

D: 口服吸收差，生物利用度小

答案：A

42. 下列关于胺碘酮的叙述，错误的是()

A: 阻滞心肌细胞钠、钙及钾通道

B: 对 α 、 β 受体有激动作用

C: 降低窦房结和普肯耶纤维的自律性

D: 对室上性和室性心律失常均有效

答案：B

43. 属于多巴胺受体阻断剂的止吐药的是()。

A: 阿瑞吡坦

B: 维生素 B

C: 甲氧氯普胺

D: 托烷司琼

答案：C

44. 烷化剂

A: 环磷酰胺

B: 喜树碱类

C: 顺铂

D: 丝裂霉素

答案：A

45. 关于艾塞那肽的注意事项描述，不正确的是()

A: 服药期间应警惕急性胰腺炎症状

B: 本品可肌肉注射

C: 肾移植患者慎用

D: 应注意是否有过敏性症状

答案: B

46. 铵属于 M 胆碱受体阻断剂的是

A: 异丙托溴

B: 乙酰胆碱

C: 孟鲁司特

D: 福莫特罗

答案: A

47. 药粉接触患者的眼睛，可导致眼睛疼痛、结膜充血的是

A: 布地奈德

B: 噻托溴铵

C: 特布他林

D: 沙美特罗

答案: B

48. 连续使用应间隔 4h 以上，这种药物是

A: 麻黄碱滴鼻液

B: 酚甘油滴耳液

C: 赛洛唑啉滴鼻液

D: 羟甲唑啉滴鼻液

答案: A

49. 使用后可出现口腔苦味

A: 四环素可的松

B: 氯霉素

C: 更昔洛韦

D: 利巴韦林

答案: B

50. 患者，男性，46 岁，经常头痛，头晕近 8 年。2 天来头痛加重，伴有恶心、呕吐送往急诊。查体：神志模糊，血压 230 / 120mmHg。尿蛋白(++)，尿糖(+)。入院治疗，经处理，血压仍为 202 / 120mmHg，且气急不能平卧，心率 108 次 / 分，早搏 3 次 / 分。两肺底有湿啰音。

A: 硫氰酸盐不超过 50 $\mu\text{g} / \text{ml}$ ，氰化物不超过 2 $\mu\text{mol} / \text{ml}$

B: 硫氰酸盐不超过 20 $\mu\text{g} / \text{ml}$ ，氰化物不超过 1 $\mu\text{mol} / \text{ml}$

C: 硫氰酸盐不超过 100 $\mu\text{g} / \text{ml}$ ，氰化物不超过 3 $\mu\text{mol} / \text{ml}$

D: 硫氰酸盐不超过 200 $\mu\text{g} / \text{ml}$ ，氰化物不超过 4 $\mu\text{mol} / \text{ml}$

答案: C

51. 其他 β -内酰胺类抗生素的主作用靶位是

A: DNA 螺旋酶

B: 细菌胞浆膜上特殊蛋白 PBPs

C: 细菌核蛋白体 50S 亚基

D: 二氢叶酸合成酶

答案: B

52. 重症甲状腺功能亢进症病情未控制者不宜使用

A: None

B: 甲状腺素

C: 大剂量碘制剂

D: 小剂量碘制剂

答案: A

53. 用于预防单纯性甲状腺肿的是

- A: 甲状腺素
- B: 大剂量碘制剂
- C: None
- D: 小剂量碘制剂

答案：D

54. 可导致新生儿的戒断症状和呼吸抑制的是

- A: 布地奈德
- B: 可待因
- C: 氨茶碱
- D: 沙丁胺醇

答案：B

55. (2019 年真题) 患者，男，8 岁，静脉滴注美洛西林后立即出现胸闷、气短、呼吸困难，喉头水肿，考虑为青霉素类抗生素的过敏反应，按照其发生机制，该患者发生的过敏反应，在分型上属于 ()

- A: IV 型变态反应
- B: II 型变态反应
- C: III 型变态反应
- D: I 型变态反应

答案：D

56. 用于耐青霉素的金黄色葡萄球菌引起的严重感染

- A: 克拉霉素
- B: 万古霉素
- C: 克林霉素
- D: 红霉素

答案：B

57. 下列药物能抑制尿酸生成的是

- A: 非布司他
- B: 呋塞米
- C: 秋水仙碱
- D: 丙磺舒

答案：A

58. 患者，女，49 岁，间断上腹部饱胀、恶心 1 年。患者 1 年前无明显诱因出现恶心、上腹饱胀感，自行服用胃药（具体不详）治疗后症状好转。2 个月前患者上述症状再次发作，查体：上腹部轻微压痛，无反跳痛。胃镜、腹部 B 超检查未见明显异常。诊断：功能性消化不良。

医嘱：枸橼酸莫沙必利片，5mg，口服，3 次/日。

- A: 胃食管反流病
- B: 功能性消化不良
- C: 糖尿病胃轻瘫
- D: 化疗所致的恶心、呕吐

答案：D

59. 利福平可促进雌激素的代谢或减少其肠肝循环，降低口服避孕药的作用，导致月经不规则，月经间期出血和计划外妊娠。所以，患者服用利福平时，应改用其他避孕方法。

- A: 后者血药浓度下降，药效降低
- B: 药理作用拮抗
- C: 不良反应叠加
- D: 后者血药浓度升高，不良反应增加

答案：A

60. 治疗期间避免献血的药物

- A: 阿达帕林
- B: 异维 A 酸
- C: 维 A 酸
- D: 壬二酸

答案：B

61. 弥散性血管内凝血早期可选用()

- A: 叶酸
- B: 维生素 K
- C: 肝素
- D: 尿激酶

答案：C

62. 使用氨基己酸可导致

- A: 高胆红素血症
- B: 支气管痉挛
- C: 肺动脉高压
- D: 血栓形成

答案：D

63. 钩端螺旋体病、梅毒、回归热的首选药的是()

- A: 氯霉素
- B: 克林霉素
- C: 青霉素
- D: 两性霉素 B

答案：C

64. 下列关于吉非替尼的描述，错误的是

- A: 用于治疗经含有铂类或多西他赛治疗失败的晚期非小细胞肺癌患者
- B: 用药期间应监测肝肾功能
- C: 常见典型不良反应是皮肤毒性、腹泻
- D: 与传统化疗药存在交叉耐药

答案：D

65. β_3 受体激动后的影响是

- A: 增加心率
- B: 支气管扩张
- C: 肌肉震颤
- D: 脂肪分解

答案：D

66. 下列哪类药物属于繁殖期杀菌药()

- A: 多黏菌素 B
- B: 磺胺类
- C: 青霉素类
- D: 氯霉素类

答案：C

67. 治疗滴虫病宜选用

- A: 甲硝唑
- B: 氯喹
- C: 甲苯咪唑
- D: 吡喹酮

答案：A

68. 抑制 HIV 的反转录酶，导致链合成的终止并打断病毒复制的循环的药物是

- A: 蛋白酶抑制药
- B: 核苷类反转录酶抑制药
- C: 整合酶抑制剂
- D: 非核苷类反转录酶抑制药

答案：B

69. 适用于心功能比较稳定的 II～III 级心力衰竭患者的是

- A: 米力农
- B: 氯沙坦
- C: 卡维地洛
- D: 氢氯噻嗪

答案：C

70. 属于短效胰岛素制剂的是

- A: 精蛋白锌胰岛素
- B: 普通胰岛素
- C: 甘精胰岛素
- D: 地特胰岛素

答案：B

71. (2015 年真题) 辅助治疗不孕症的维生素是 ()。

- A: 烟酸
- B: 维生素 E
- C: 维生素 B₂
- D: 维生素 B₅

答案：B

72. 通过改变虫体肌细胞膜的离子通透性发挥驱虫作用，适用于儿童，常见制剂为宝塔糖的药品是

- A: 氯喹
- B: 噻嘧啶
- C: 哌嗪
- D: 青蒿素

答案：C

73. 选择性抑制 COX-2 的是

- A: 塞来昔布
- B: 对乙酰氨基酚
- C: 吲哚美辛
- D: 阿司匹林

答案：A

74. (2019 年真题) 关于氢氯噻嗪临床应用的说法，错误的是 ()

- A: 对血糖和尿酸无影响，可长期服用
- B: 老年患者服药后易发生低血压及肾功能损害
- C: 服药期间应关注有无肌痉挛、耳鸣、听力障碍等症状
- D: 与磺胺类药物存在交叉过敏反应

答案：A

75. 抑制磷酸二酯酶而加强心肌收缩力的药物是 ()

- A: 螺内酯
- B: 毛花苷丙
- C: 米力农

D: 地高辛

答案: C

76. 注射液含苯甲醇，新生儿和早产儿禁用的药物是

A: 甘草酸二铵

B: 甲氧氯普胺

C: 多烯磷脂酰胆碱

D: 雷尼替丁

答案: C

77. 青霉素()

A: 对 G

B: 抗菌作用强，对厌氧菌有效

C: 特别对铜绿假单胞菌有效

D: 对 G

答案: D

78. 与可待因合用，不仅加重便秘，还可增加麻痹性肠梗阻和尿潴留危险的是

A: 硫酸镁

B: 哌替啶

C: 美沙酮

D: 阿托品

答案: D

79. 以下不属于干扰核酸生物合成的药物是

A: 甲氨蝶呤

B: 表柔比星

C: 卡培他滨

D: 培美曲塞

答案: B

80. 属于促凝血因子活性药的是

A: 卡巴克洛

B: 氨苯甲酸

C: 凝血酶

D: 酚磺乙胺

答案: D

81. (2017 年真题) 眼底散瞳检查宜选用 ()

A: 氯霉素滴眼剂

B: 托吡卡胺滴眼剂

C: 拉坦前列素滴眼剂

D: 碘苷滴眼剂

答案: B

82. 属于噻唑烷二酮类胰岛素增敏剂的是

A: 格列美脲

B: 瑞格列奈

C: 沙格列汀

D: 罗格列酮

答案: D

83. (2015 年真题) 治疗单纯疱疹性角膜炎不宜选用的药品是 ()。

A: 四环素可的松滴眼液

B: 更昔洛韦滴眼液

C: 利巴韦林滴眼液

D: 碘苷滴眼液

答案：A

84. (2016 年真题) 属于钠通道阻滞剂的抗心律失常药是

A: 美托洛尔

B: 硝酸甘油

C: 索他洛尔

D: 利多卡因

答案：D

85. 利福平抗结核杆菌的作用原理是

A: 抑制蛋白质合成

B: 抑制 RNA 多聚酶

C: 抑制结核杆菌叶酸的代谢

D: 抑制分枝菌酸合成

答案：B

86. (2015 年真题) 患者，男，56 岁。有高血压病史 4 年。体检：血压 156/96mmHg，无主动脉狭窄。医师处方依那普利片控制血压。该患者用药过程中可能发生的典型不良反应是（）。

A: 干咳

B: 光过敏

C: 低血糖

D: 水肿

答案：A

专业《执业药师之西药学专业二》考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/908120025116007022>