

执业医师考试公共卫生执业(习题卷19)

说明：答案和解析在试卷最后

第1部分：单项选择题，共100题，每题只有一个正确答案，多选或少选均不得分。

1. [单选题]下列哪种氨基酸是生酮氨基酸

- A) 谷氨酸
- B) 丙氨酸
- C) 亮氨酸
- D) 甘氨酸
- E) 蛋氨酸

2. [单选题]亚临床状态变化也就是

- A) 正常调节变化
- B) 耐受阶段的变化
- C) 蓄积阶段的变化
- D) 失代偿阶段变化
- E) 代偿阶段变化

3. [单选题]按照心身医学的观点，下列疾病中属于心身疾病的是

- A) 大叶性肺炎
- B) 消化性溃疡
- C) 精神发育迟滞
- D) 精神分裂症
- E) 抑郁症

4. [单选题]妇女更年期体内性激素水平变化特点是

- A) 雌激素下降，孕激素下降，促性腺激素升高
- B) 雌激素升高，孕激素升高，促性腺激素下降
- C) 雌激素下降，孕激素升高，促性腺激素下降
- D) 雌激素升高，孕激素下降，促性腺激素升高
- E) 雌激素下降，孕激素下降，促性腺激素下降

5. [单选题]肺栓塞最多见的症状是

- A) 呼吸困难
- B) 咳嗽、咳痰
- C) 端坐呼吸
- D) 咯血
- E) 胸痛

6. [单选题]某病的续发率是指

- A) $(\text{接触者中发病人数} / \text{接触者总人数}) \times 100\%$
- B) $(\text{同等身份的接触者中发病人数} / \text{同等身份人数}) \times 100\%$
- C) $(\text{一个潜伏期内接触者中的发病人数} / \text{易感接触者总人数}) \times 100\%$

D) (一个潜伏期内接触者中的患病人数 / 易感接触者总人数) × 100%

E) (接触者中的患病人数 / 接触者总人数) × 100%

7. [单选题]脑血栓形成的最常见病因是

- A) 高血压
- B) 脑动脉粥样硬化
- C) 各种脑动脉炎
- D) 血压偏低
- E) 红细胞增多症

8. [单选题]男, 35岁, 入院诊断为扩张型心肌病, 心功能不全, 心电图示心率96次/分, 心房颤动。血清钾6.5mmol/L, 血清钠130mmol/L。该患者不宜应用

- A) 硝普钠
- B) 呋塞米(速尿)
- C) 螺内酯(安体舒通)
- D) 地高辛
- E) 阿司匹林

9. [单选题]不支持慢性粒细胞白血病加速期的是

- A) 外周血中原始粒细胞 $\geq 5\%$
- B) 骨髓中原始粒细胞 $\geq 10\%$
- C) 外周血嗜碱性粒细胞 $> 20\%$
- D) 不明原因的血小板进行性减少
- E) 不明原因的血小板进行性增加

10. [单选题]某种工业化合物, 易挥发, 亚慢性毒性试验动物的染毒途径首选

- A) 经皮肤
- B) 经口
- C) 经呼吸道
- D) 皮下注射
- E) 腹腔注射

11. [单选题]下列关于劣药的说法不正确的是

- A) 药品成分的含量不符合国家药品标准的为劣药
- B) 药品所含成分与国家药品标准规定的成分不符的为劣药
- C) 不注明生产批号的药品按照劣药论处
- D) 更改生产批号的药品按照劣药论处
- E) 直接接触药品的包装材料和容器未经批准的药品按照劣药论处

12. [单选题]男, 30岁, 会阴部骑跨伤, 可排尿, 生命体征平稳, 诊断为尿道裂伤, 应采取的治疗

- A) 止血, 应用抗生素
- B) 端端吻合术
- C) 留置导尿管
- D) 膀胱造瘘
- E) 修补尿道

13. [单选题]患者男性, 65岁。高血压病史10余年, 既往有气喘病史, 昨日突然出现神志不清。左侧肢体瘫痪, 测血压200/120mmHg, 血糖11.2mmol/L, 血胆固醇7.8mmol/L。此时降压治疗应将血压降至下列哪种水平为宜

- A) 180/105mmHg
- B) 130/90mmHg
- C) 170/105mmHg

D) 160/100mmHg

E) 120/85mmHg

14. [单选题] 闭经病人作垂体兴奋试验 (+)，表示

A) 雌激素水平不足

B) 有排卵

C) TrunEr 综合征

D) 垂体性闭经

E) 下丘脑性闭经

15. [单选题] 采样测定工作场所化学毒物或粉尘的浓度，反映个体接触水平宜采用

A) TWA

B) MAC

C) TLV-C

D) STEL

E) PELs

16. [单选题] 患者女，60岁，慢性乙型病毒性肝炎15年，近来腹胀来诊。检查超声提示肝硬化、脾大。患者脾大的原因是

A) 肝静脉压力升高

B) 肝动脉压力升高

C) 门静脉压力升高

D) 腹壁静脉曲张

E) 淋巴回流障碍

17. [单选题] 测量细菌常用的单位是

A) mm

B) μm

C) nm

D) pm

E) cm

18. [单选题] 患者男性，60岁。头晕、心悸4~5年，心尖搏动向左下移位，呈抬举性搏动，于胸骨左缘第3、4肋间闻及叹气样舒张期杂音，为递减型，向心尖传导，在心尖区闻及隆隆样舒张早期杂音，股动脉可闻及射枪音，首先考虑的诊断是

A) 主动脉瓣关闭不全

B) 二尖瓣狭窄

C) 室间隔缺损

D) 二尖瓣关闭不全

E) 主动脉瓣狭窄

19. [单选题] 某蓄电池厂男工，工龄10年，主诉头昏、头痛、乏力、记忆减退、睡眠障碍、食欲缺乏、脐周隐痛。经检验尿 δ -ALA 为 $28.6 \mu\text{mol/L}$ 。[问题1][题] 首先考虑的诊断是

A) 慢性苯中毒

B) 慢性硫化氢中毒

C) 慢性铅中毒

D) 慢性氰化物中毒

E) 慢性汞中毒

20. [单选题] 有关窦性心动过速的治疗错误的是

A) 无症状的无需治疗

- B) 有症状的进行病因治疗和去除诱因
- C) 严重者可用 β 受体阻滞剂
- D) 不可用维拉帕米治疗
- E) 症状严重药物治疗无效可用窦房结导管消融治疗

21. [单选题]男，53岁。无痛性肉眼血尿3个月。膀胱镜检查见膀胱三角区有一4?cm×3?cm新生物，呈浸润性生长，病理诊断为膀胱腺癌，最适宜的治疗方法是

- A) 膀胱部分切除
- B) 经尿道膀胱肿瘤电切
- C) 化疗
- D) 根治性膀胱切除
- E) 放疗

22. [单选题]腹部闭合性损伤，持续腹痛，血压80/60mmHg，脉搏120次/分，诊断尚未确定，应给予处置是

- A) 吗啡止痛
- B) 给水止渴
- C) 鲁米那镇静
- D) 扶持患者去放射科透视
- E) 积极补充血容量，抗休克

23. [单选题]医师考核不合格者，县级以上人民政府卫生行政部门可以责令其暂停执业活动

- A) 1至2个月
- B) 1至3个月
- C) 6至12个月
- D) 12个月以上
- E) 3至6个月

24. [单选题]以下检验方法中，属于非参数检验方法的是

- A) 方差分析
- B) Z检验
- C) t检验
- D) H检验
- E) q检验

25. [单选题]下述哪种激素是由下丘脑产生的

- A) 黄体生成素
- B) 泌乳素
- C) 精氨酸加压素
- D) 促甲状腺素
- E) 黑色素细胞刺激素

26. [单选题]幼儿期指的是

- A) 生后7天~满2周岁之前
- B) 生后1周岁~满2周岁之前
- C) 生后1周岁~满3周岁之前
- D) 生后2周岁~满3周岁之前
- E) 生后28天~满2周岁之前

27. [单选题]心室肌有效不应期的长短主要取决于

- A) 动作电位0期除极速度
- B) 阈电位水平高低

- C) 动作电位2期时程
- D) 钠泵功能
- E) 动作电位传导速度

28. [单选题]与机体钙营养状况关系最为密切的维生素是

A) 维生素B

1

B) 维生素B

2

C) 维生素E

D) 维生素D

E) 维生素A

29. [单选题]关于宫颈原位癌，下列哪项是错误的

A) 好发部位为子宫颈鳞-柱上皮的交界区

B) 异型细胞不穿透基底膜，限于上皮层，无间质浸润

C) 不能用阴道镜检查来区别镜下早期浸润癌与原位癌

D) 与重度不典型增生较难区分

E) 有淋巴结转移

30. [单选题]在某病的队列研究中，最开始选择的队列应为

A) 任意选择一个人群即可

B) 不患某病的暴露者

C) 患某病的患者

D) 暴露与不暴露于所研究的某种因素的人

E) 某病的暴露者与非暴露者

31. [单选题]30岁女性，诉发热伴心前区隐痛，呼吸困难，颈静脉怒张，体检：体温39.2℃，血压120/78mmHg，心率110次/分，心电图示：ST段抬高，诊断为急性心包炎，治疗方法是

A) 使用非甾体抗炎药

B) 心包穿刺

C) 使用糖皮质激素

D) 使用β受体阻滞剂

E) 心包切除术

32. [单选题]唯一能通过胎盘进入胎儿体内的免疫球蛋白是

A) IgA

B) IgG

C) IgD

D) IgM

E) IgE

33. [单选题]负责制定卫生场所卫生标准和要求的部门是

A) 国务院卫生行政部门

B) 省级卫生行政部门

C) 国务院质量技术监督部门

D) 省级质量技术监督部门

E) 省级环境保护部门

34. [单选题]引起口唇疱疹的病原体是

- A) HSV-1
- B) HSV-2
- C) VZV
- D) CMV
- E) EBV

35. [单选题]前置胎盘病例，适用于阴道分娩的是

- A) 部分性前置胎盘而胎儿为头位
- B) 边缘性前置胎盘而胎儿为头位
- C) 部分性前置胎盘而胎儿为臀位
- D) 低置胎盘而胎儿为臀位
- E) 以上都不是

36. [单选题]对奎宁的叙述哪项是错误的

- A) 最早用于治疗疟疾的药物
- B) 对红细胞内期滋养体有杀灭作用
- C) 主要用于耐氯喹或耐多药的恶性疟
- D) 每周服药一次，用于病因性预防
- E) 可出现心肌抑制作用

37. [单选题]男，35岁。黄疸已1个月，右上腹轻微胀痛，食欲不振，经内科治疗无效。查体：肝大，胆囊增大，血胆红素 $17\mu\text{mol/L}$ ，凡登白直接反应阳性，转氨酶70单位，碱性磷酸酶45单位，AFP $>50\text{ng/ml}$ ，可能诊断是

- A) 黄疸型肝炎
- B) 胆总管结石梗阻
- C) 肝癌
- D) 肝硬化晚期
- E) 壶腹周围癌

38. [单选题]不符合急性心包炎的心电图变化

- A) 弓背向下型ST段抬高
- B) T波平坦或倒置
- C) QRS波呈低电压
- D) 电交替
- E) 弓背向上的sT抬高

39. [单选题]对出血坏死型胰腺炎最具诊断价值的是

- A) 血脂肪酶增高
- B) 血淀粉酶增高
- C) 血钙降低
- D) 血胆红素增高
- E) B超检查胰腺增大

40. [单选题]患者男性，10岁，右手烧伤，有水疱，剧痛，在现场急救中，为减轻疼痛，最恰当的处理方法是

- A) 肌注地西洋（安定）
- B) 肌注哌替啶（杜冷丁）
- C) 将手浸入冷水中
- D) 抽吸水疱
- E) 安慰和鼓励受伤者

41. [单选题]患者女性，32岁。孕40周，妊娠合并子宫肌瘤，阴道分娩胎盘娩出后阴道出血量多，暗红色检查：宫底高，子宫软，产道无裂伤，血自宫腔流出，有血块，检查胎盘完整，血压 $14.6/12\text{kPa}$ （ $110/90\text{mmHg}$ ）最可能诊断为

- A) 凝血功能障碍
- B) 胎盘残留
- C) 胎盘粘连
- D) 子宫收缩乏力
- E) 产道损伤

42. [单选题] 以下哪项不是艾滋病高危人群

- A) 50岁以上的人
- B) 性乱者
- C) 男性同性恋者
- D) 静脉药瘾者
- E) 多次输血者

43. [单选题] 一个6岁男孩，低热、颈痛数月，检查颈部旋转受限，X线侧位片可见寰椎向前脱位，咽后壁增宽，其诊断最大可能为

- A) 自发性寰椎脱位
- B) 外伤性寰椎脱位
- C) 咽后壁脓肿
- D) 寰枢椎结核
- E) 寰枢椎畸形

44. [单选题] 晚期流产的常见原因

- A) 宫颈内口松弛
- B) 黄体功能不全
- C) 严重感染
- D) 甲状腺功能减退
- E) 不良刺激

45. [单选题] 与输入血液质量有关的早期输血反应为

- A) 过敏反应
- B) 出血倾向
- C) 丙型肝炎
- D) 疟疾
- E) 酸碱平衡失调

46. [单选题] 呼吸呈蒜味的中毒是

- A) 酒精
- B) 有机磷农药
- C) 阿托品
- D) 亚硝酸盐
- E) 地西洋

47. [单选题] 衡量兴奋性的指标是

- A) 动作电位
- B) 局部电位
- C) 阈电位
- D) 阈强度
- E) 强度时间变化率

48. [单选题] 女，23岁，问她“你是哪里人？”病人快速回答说：“我是中国人，祖国在我心中，我三中毕业，到山中去，矿物局山中，我在矿山当会计……人类进入新的历史阶段，新的时代。培养一代新人，我们都是革命接班人”，此症

状是

- A) 思维不连贯
- B) 思维松弛
- C) 思维奔逸
- D) 思维破碎
- E) 思维扩散

49. [单选题] 11个月双胞胎之一男婴，因食欲差就诊，查体：欠活泼，面色稍苍白，面部无明显消瘦，2个月前曾间断腹泻，测体重6.5kg，身高73cm，腹部皮下脂肪减少，四肢肌张力尚可。测血红蛋白为90g/L，该患儿可能的诊断是

- A) 单纯营养性贫血
- B) 营养不良伴营养性巨细胞性贫血
- C) 营养不良伴再生障碍性贫血
- D) 营养不良伴缺铁性贫血
- E) 正常儿

50. [单选题] 对于一种严重的致死性疾病，在评价某种新的疗法的效果时，最恰当的指标是

- A) 罹患率
- B) 发病率
- C) 患病率
- D) 死亡率
- E) 病死率

51. [单选题] 1岁以内患儿患化脓性脑膜炎合并硬膜下积液，常见的病原菌是

- A) 脑膜炎双球菌
- B) 变形杆菌
- C) 流感嗜血杆菌
- D) 绿脓杆菌(铜绿假单胞菌)
- E) 金黄色葡萄球菌

52. [单选题] 长期使用糖皮质激素治疗，停药时应注意

- A) 检查病人血细胞
- B) 检查胃粘膜有无损伤
- C) 补充蛋白质
- D) 逐渐减量停药
- E) 避免各种伤害性刺激

53. [单选题] 下列哪种后果不是生殖细胞突变引起的

- A) 显性致死
- B) 显性遗传病
- C) 隐性致死
- D) 隐性遗传病
- E) 癌症

54. [单选题] 1岁以后小儿最常见的青紫型先天性心脏病

- A) 室间隔缺损
- B) 动脉导管未闭
- C) 法洛四联症
- D) 肺动脉狭窄
- E) 房间隔缺损

55. [单选题] 不常发作但很强烈的偏头痛应用

- A) 非类固醇消炎镇痛药物
- B) 发作早期给麦角胺咖啡因
- C) 5-羟色胺受体激动剂
- D) 心得安、苯噻啶等药物
- E) 皮质类固醇

56. [单选题] B型血

- A) 红细胞膜上含A凝集原、血清中含抗A凝集素
- B) 红细胞膜上含B凝集原、血清中含抗B凝集素
- C) 红细胞膜上含A凝集原、血清中含抗B凝集素
- D) 红细胞膜上含B凝集原、血清中含抗A凝集素
- E) 红细胞膜上同时含有A和B两种凝集原，血清中无凝集素

57. [单选题] 抗尿崩症的药物是

- A) 氯苯蝶啶
- B) 螺内酯
- C) 塞米
- D) 他尼酸
- E) 氯噻嗪

58. [单选题] 在钙拮抗药的分类中，维拉帕米属于

- A) 二氢吡啶类
- B) 苯并噻氮（苝卓）类
- C) 苯烷胺类
- D) 二氢非吡啶类
- E) 以上均不是

59. [单选题] 年轻妇女，双侧乳房多个结节，分界不清，月经来潮时乳房胀痛，首先应考虑

- A) 乳腺癌
- B) 乳腺纤维囊性病
- C) 导管内乳头状瘤
- D) 湿疹样癌
- E) 纤维腺瘤

60. [单选题] 男，76岁，有阻塞性肺气肿史，咳嗽，脓痰，伴气急，加重两周，今晨起神志恍惚，体检：嗜睡，口唇青紫，两肺湿啰音。心率116次/分，律齐，血压25/14kPa，神经系统检查未见异常。可能的诊断

- A) 脑血管意外
- B) 呼吸衰竭
- C) 急性左心衰竭
- D) 右心衰竭
- E) 高血压危象

61. [单选题] 脊髓灰质炎混和疫苗在一岁以内应服用几次

- A) 1次
- B) 2次
- C) 3次
- D) 4次
- E) 5次

62. [单选题] 轻度：pH正常或稍高，PaO₂正常，PaCO₂稍低，提示

- A) 哮喘处于早期，有轻度过度通气，支气管痉挛不严重

- B)哮喘处于早期，有过度通气，支气管痉挛较重
- C)患者通气不足，支气管痉挛较明显，病情转重
- D)严重通气不足，支气管痉挛和严重阻塞，多发生在哮喘持续状态
- E)严重通气不足，支气管痉挛较明显，多发生在哮喘持续状态

63. [单选题]影响传染病流行过程的因素

- A)病原体、感菌动物
- B)传染源、传播途径，易感人群
- C)社会因素、自然因素
- D)病原体和环境
- E)病原体、人体和环境

64. [单选题]下列哪项不属于细菌人工培养的实际应用范围

- A)感染性疾病病原学诊断
- B)细菌的鉴定
- C)基因工程中应用
- D)生物制品的制备
- E)传染病的治疗

65. [单选题]中央性前置胎盘大出血的治疗方法哪项是正确的

- A)如为臀位，行足牵引
- B)催产素引产
- C)胎头吸引助产
- D)剖宫产
- E)人工破膜，头皮钳牵引压迫止血

66. [单选题]恶性转化细胞的特征不包括

- A)细胞形态改变
- B)细胞生长能力改变
- C)细胞生化表型改变
- D)细胞坏死
- E)与肿瘤形成有关的表型

67. [单选题]根据血尿出血部位不同临床上血尿分为

- A)功能性血尿
- B)器质性血尿
- C)肉眼血尿，镜下血尿
- D)原发性血尿，继发性血尿
- E)肾小球性及非肾小球性血尿

68. [单选题]对于功能性低血糖病人，为减少低血糖发作，下述哪项饮食调整是不对的

- A)少食多餐
- B)进食较干食物
- C)高蛋白饮食
- D)高脂饮食
- E)低纤维饮食

69. [单选题]关于生态平衡的定义，下列正确的是

- A)生物与生物之间的动态平衡
- B)生物与环境之间的动态平衡
- C)生物与环境之间的暂时平衡

- D) 生物与生物，生物与环境之间的暂时相对的平衡
- E) 生物与生物之间、生物与环境之间的长期平衡

70. [单选题]下列哪项药物可使肥厚型梗阻性心肌病杂音减弱

- A) 硝酸甘油
- B) 地高辛
- C) 异丙肾上腺素
- D) 亚硝酸异戊酯
- E) 心得安

71. [单选题]免疫自稳功能是指

- A) 机体识别排除衰老死亡细胞的功能
- B) 机体识别排除突变细胞的功能
- C) 机体识别排除抗原性异物的功能
- D) 机体识别排除胞内寄生物的功能
- E) 机体识别排除病原体的功能

72. [单选题]某地由于水质的本身状况给人们日常生活带来多方面的不利影响，如洗衣会增加肥皂的消耗，影响纺织物的色泽和柔软性；煮沸后易在水壶和锅炉内沉积水垢，这是由于水质的

- A) 暂时硬度高
- B) 暂时硬度低
- C) 永久硬度高
- D) 永久硬度低
- E) 碳酸盐和重碳酸盐低

73. [单选题]男性，48岁，乙型肝炎病史10年，困乏力、低热、腹胀、少尿来院就诊。检查发现巩膜黄染，腹部膨隆，有大量腹腔积液存在。肝略缩小，脾大，超声显像见肝内纤维增殖，肝硬化结节形成，门静脉和脾静脉增宽。诊断为肝炎后肝硬化，门脉高压症。对该患者不适当的治疗措施为

- A) 卧床休息
- B) 忌盐饮食
- C) 精氨酸静脉滴注
- D) 合并应用留钾和排钾利尿剂
- E) 反复多次抽放腹腔积液

74. [单选题]患者刘明。因发烧、恶心、呕吐，全身痛入院，查体时发现全腹压痛，肌紧张，反跳痛，以急腹症剖腹探查，术中未见腹腔明显异常，后出现少尿，诊为肾综合征出血热，其误诊原因

- A) 恶心、呕吐
- B) 全身疼痛
- C) 全腹压痛、肌紧张、反跳痛
- D) 查体不准确
- E) 发烧

75. [单选题]当样本例数相同时，计量资料的成组f检验与配对t检验相比，一般情况下为

- A) 大样本时二者效率一致
- B) 与两组样本均数的大小有关
- C) 二者效率相等
- D) 配对t检验效率高一些
- E) 成组t检验效率高一些

76. [单选题]手术后早期恶心、呕吐常见的原因是

- A) 麻醉反应

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/915043243334011211>