

2023 年执业药师之西药学专业二通关考试题库带答案解析

单选题（共 35 题）

1、某患者，63 岁，诊断为 慢性支气管炎急性发作 ，痰培养为 铜绿假单胞菌 ，下列哪种药物对铜绿假单胞菌无效()

- A. 哌拉西林
- B. 头孢克洛
- C. 头孢哌酮
- D. 头孢他啶
- E. 头孢曲松

【答案】 B

2、可导致红绿色盲的是

- A. 异烟肼
- B. 红霉素
- C. 乙胺丁醇
- D. 吡嗪酰胺
- E. 链霉素

【答案】 C

3、伴有痛风的水肿病人，不宜选用下列哪种药物利尿

- A. 氢氯噻嗪
- B. 氨苯蝶啶
- C. 阿米洛利

D.乙酰唑胺

E.螺内酯

【答案】 A

4、目前治疗哮喘夜间发作和哮喘维持治疗的理想方案是：糖皮质激素联合应用

A.沙丁胺醇

B.氨茶碱

C.特布他林

D.沙美特罗

E.沙丁胺醇控释片

【答案】 D

5、钩端螺旋体病、梅毒、回归热的首选药的是()

A.青霉素

B.氯霉素

C.两性霉素 B

D.克林霉素

E.克霉唑

【答案】 A

6、不属于硫脲类药物的不良反应的是

A.剥脱性皮炎

B.发热. 软弱无力

C.粒细胞计数减少

D. 诱发甲亢

E. 红斑狼疮样综合征

【答案】 D

7、与胆汁酸结合而降血脂的药物是

A. 氯贝丁酯

B. 洛伐他汀

C. 考来烯胺

D. 烟酸

E. 普罗布考

【答案】 C

8、可用于抗结核杆菌的药物不包括 查看材料

A. 乙胺丁醇

B. 吡嗪酰胺

C. 异烟肼

D. 氟胞嘧啶

E. 对氨基水杨酸钠

【答案】 D

9、通过抑制 α -葡萄糖苷酶，减少多糖水解为葡萄糖()

A. 艾塞那肽

B. 格列本脲

C. 二甲双胍

D. 阿卡波糖

E. 罗格列酮

【答案】 D

10、属于 M 期细胞周期特异性的抗肿瘤药是

A. 顺铂

B. 长春碱

C. 氮芥

D. 阿糖胞苷

E. 环磷酰胺

【答案】 B

11、下列药物与甲氧氯普胺合用，可增加锥体外系不良反应风险的是

A. 金刚烷胺

B. 奥司他韦

C. 阿昔洛韦

D. 干扰素

E. 齐多夫定

【答案】 A

12、氨基糖苷类抗菌药无效的是()

A. 需氧革兰阴性菌

B. 铜绿假单胞菌

C. 结核杆菌

- D. 厌氧菌和肠球菌
- E. 耐甲氧西林金黄色葡萄球菌

【答案】 D

13、已发生超敏反应，用药前常规给予地塞米松、苯海拉明和西咪替丁加以预防的抗肿瘤药是

- A. 注射用柔红霉素
- B. 注射用硫酸长春新碱
- C. 紫杉醇注射液
- D. 注射用盐酸博来霉素
- E. 注射用环磷酰胺

【答案】 C

14、患者女,12岁,3天前开始发热,伴有咳嗽咳痰。体温 39.2°C,WBC $15.1 \times 10^9/L$ 中性粒细胞百分比 77%诊断为社区获得性肺炎。该患儿不宜使用的药物是 ()

- A. 头孢克洛
- B. 头孢呋辛
- C. 左氧氟沙星
- D. 阿莫西林
- E. 阿奇霉素

【答案】 C

15、用军团菌、支原体肺炎的首选药 ()

- A. 万古霉素
- B. 克林霉素

C.克拉霉素

D.红霉素

E.拉氧头孢

【答案】 D

16、（2021年真题）患儿。女，14岁。因出现尿频、尿急、尿痛症状2天就诊，诊断为急性膀胱炎，患儿既往有癫痫病史，宜选用的治疗药物是（ ）。

A.呋喃妥因

B.青霉素 G

C.阿奇霉素

D.环丙沙星

E.克林霉素

【答案】 A

17、属于抗甲状腺药的是

A.左甲状腺素

B.甲巯咪唑

C.生长抑素

D.醋酸去氨加压素

E.格列美脲

【答案】 B

18、治疗伤寒、副伤寒的首选药是

A.青霉素

- B. 氯霉素
- C. 诺氟沙星
- D. 四环素
- E. 磺胺嘧啶

【答案】 B

19、无雌激素、雄激素、肾上腺皮质激素样作用代谢物没有雌激素活性,可用于黄体功能不足的先兆流产治疗的药物是

- A. 地屈孕酮
- B. 屈螺酮
- C. 甲羟孕酮
- D. 环丙孕酮
- E. 左炔诺孕酮

【答案】 A

20、长期使用应定期检查甲状腺功能的药物是

- A. 胺碘酮
- B. 索他洛尔
- C. 利多卡因
- D. 普罗帕酮
- E. 维拉帕米

【答案】 A

21、可降低同型半胱氨酸水平的维生素是

- A. 维生素 B
- B. 烟酸
- C. 泛酸钙
- D. 叶酸
- E. 维生素 C

【答案】 D

22、患儿，男，7岁。长期偏食。近1个月面色渐苍白，自诉全身无力。体检：肝肋下4cm，脾肋下1cm。血常规：Hb70g/L，RBC 3.0×10^{12} /L，Ret2.0%，WBC、Plt均正常，MCV74fl，MCH26pg，MCHC30，考虑为缺铁性贫血。

- A. 服用铁剂时可以喝果汁，但不能喝牛奶
- B. 口服型铁剂服用时间还根据个体反应而定
- C. 进食促进铁剂的吸收
- D. 维生素 C 与本品同服，有利于吸收
- E. 服用无机铁剂胃肠道不良反应不能耐受时，可换用有机铁剂

【答案】 C

23、雌激素的适应证是

- A. 痛经
- B. 功能性子宫出血
- C. 消耗性疾病
- D. 先兆性流产
- E. 绝经期前的乳腺癌

【答案】 B

24、患者，男，66岁。体检时发现血糖高前来就诊，有磺胺药过敏史，体型肥胖，医师处方二甲双胍片（0.5g，tid）控制血糖。

- A.光敏反应
- B.低血糖反应
- C.糖尿病酮症酸中毒
- D.急性胰腺炎
- E.尿路感染

【答案】 B

25、患者，男，52岁，BMI28kg/m²，既往有动脉粥样硬化性心血管病、高尿酸血症、痛风病，患者诉昨晚8点起右大脚趾关节处疼痛难忍宜使用的药物是

- A.非布司他
- B.碳酸氢钠
- C.别嘌醇
- D.秋水仙碱
- E.苯溴马隆

【答案】 D

26、（2016年真题）可抑制细菌的DNA依赖性RNA多聚酶的是

- A.磷霉素
- B.替考拉宁
- C.利福平
- D.舒巴坦
- E.左氧氟沙星

C

27、低剂量可提供接近全效降压作用的药物是

- A. 氢氯噻嗪
- B. 螺内酯
- C. 氨苯蝶啶
- D. 阿米洛利
- E. 呋塞米

【答案】 A

28、以下药物中，易被胃酸破坏的是

- A. 红霉素
- B. 克拉霉素
- C. 罗红霉素
- D. 阿奇霉素
- E. 泰利霉素

【答案】 A

29、呋塞米利尿的主要作用部位是()

- A. 远曲小管近端
- B. 远曲小管远端
- C. 肾小管髓袢升支粗段
- D. 集合管
- E. 肾小球

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/915123130221011310>