

2022~2023 初级护师考试题库及答案

1. 高血压、动脉粥样硬化老年患者的饮食不须限制

- A.高胆固醇食物
- B.高动物脂肪食物
- C.高糖食物
- D.高钠食物
- E.高钙食物

正确答案:

E

2. 主要用于小儿的吸氧方法是()

- A.鼻导管法
- B.鼻塞法
- C.面罩法
- D.头罩法
- E.氧气枕法

正确答案:

D

3. 扁桃体超过咽腭弓, 但不超过咽后壁中线, 应为

- A.扁桃体不肿大
- B.扁桃体 I 度肿大
- C.扁桃体 II 度肿大
- D.扁桃体 III 度肿大
- E.以上都不对

正确答案:

C

4. 下腹手术备皮范围哪项不对

- A.上自乳头水平
- B.下至大腿上 1/3 前内侧
- C.外阴部
- D.两侧至腋后线
- E.以切口为中心周围 10-15cm

正确答案:

A

5. 构成甲状腺素的主要成分是

- A.磷

- B. 碘
- C. 锌
- D. 铁
- E. 钙

正确答案:

B

6. 初产妇，孕 1 产 0, 25 岁。骨盆外测量正常，临产 10 小时，肛查：宫口开大 9cm, 胎先露 S2+, 宫缩时出现胎心下降达 110 次 / 分，宫缩后不能迅速恢复。处理正确的是

- A. 不予干涉，等待自然分娩
- B. 催产素点滴加强宫缩
- C. 立即产钳助娩
- D. 立即剖宫产
- E. 给予温肥皂水灌肠，刺激宫缩

正确答案:

D

7. 患者，男，40 岁。因车祸导致脑外伤，出现昏迷。为保证营养的供给，需要长期鼻饲，取去枕平卧位，准备接受插胃管。胃管更换的时间是

- A. 乳胶胃管每天更换 1 次，硅胶胃管每周更换 1 次
- B. 乳胶胃管每周更换 1 次，硅胶胃管每月更换 1 次
- C. 乳胶胃管每周更换 1 次，硅胶胃管每月更换 2 次
- D. 乳胶胃管每周更换 2 次，硅胶胃管每月更换 1 次
- E. 乳胶胃管每天更换 1 次，硅胶胃管每月更换 2 次

正确答案:

B

8. 洋地黄与钙剂应避免同时应用，如有必要至少应间隔

- A. 2 小时
- B. 4 小时
- C. 7 小时
- D. 8 小时
- E. 10 小时

正确答案:

B

9. 小儿泌尿道感染的主要途径是

- A. 上行感染
- B. 血源性感染
- C. 直接蔓延
- D. 外伤后感染

E. 尿路畸形和梗阻

正确答案:

A

10. 给患者实施青霉素皮试前, 最重要的准备工作是

A. 环境要清洁、宽敞

B. 准备好注射用物

C. 抽药剂量要准确

D. 选择注射部位要合适

E. 询问病人有无过敏史

正确答案:

E

11. 白细胞分类计数, 中性粒细胞(包括杆状核及分叶核)正常应占

A. 0.5%~1%

B. 3%~8%

C. 20%~40%

D. 50%~75%

E. 70%~85%

正确答案:

D

12. 下列哪项表现不是洋地黄中毒症状

A. 心动过缓

B. 心律失常

C. 恶心、呕吐

D. 头晕、嗜睡

E. 激惹、惊厥

正确答案:

E

13. 右心衰与肝硬化水肿的鉴别要点是

A. 下肢浮肿

B. 中心静脉压增高

C. 腹水形成

D. 肝肿大

E. 体重增加

正确答案:

B

14. 静脉推注高浓度的钾最危险的是

- A. 软瘫
- B. 静脉炎
- C. 呼吸麻痹
- D. 窒息
- E. 心脏骤停

正确答案:

E

15. 急性肾功能衰竭少尿期最危险的并发症是

- A. 出血倾向
- B. 高钾血症
- C. 代谢性酸中毒
- D. 水中毒
- E. 尿中毒

正确答案:

C

16. 直腿抬高试验阳性, 患者下肢抬高的度数是

- A. 60 度内
- B. 65 度内
- C. 70 度内
- D. 75 度内
- E. 80 度内

正确答案:

E

17. 观察中毒性肺炎的病情变化, 最重要的是

- A. 意识状态
- B. 体温、热型
- C. 脉搏、血压
- D. 呼吸频率及深度
- E. 痰的性状

正确答案:

C

18. 血栓闭塞性脉管炎的病变位置是

- A. 下肢中小动静脉
- B. 上肢中小动静脉
- C. 髂、股深静脉
- D. 上腔静脉

E. 下腔静脉

正确答案:

A

19. 孕 40 周，初产，宫口开全 2 小时，胎头棘下 2cm，宫缩较前减弱，胎膜已破，胎心 120 次/分，产妇一般情况较好、胎头吸引术应何时解除负压

A. 胎头未娩出时

B. 胎头娩出后

C. 胎头即将娩出时

D. 胎身娩出时

E. 胎身娩出后

正确答案:

C

20. 溃疡病最主要的症状是

A. 返酸

B. 嗝气

C. 呕吐

D. 慢性周期性疼痛

E. 腹胀

正确答案:

D

21. 两侧瞳孔大小不等，提示

A. 阿托品中毒

B. 视神经萎缩

C. 有机磷农药中毒

D. 颅内病变

E. 深昏迷

正确答案:

D

22. 肝性脑病患者需限制的食物是

A. 水果

B. 蔬菜

C. 肉类

D. 米饭

E. 米饭

正确答案:

C

23. 中期妊娠引产，羊膜穿刺应

- A. 不超过 2 次
- B. 不超过 3 次
- C. 不超过 4 次
- D. 不超过 5 次
- E. 不超过 6 次

正确答案：

B

24. 最能反映贫血程度的实验室指标是

- A. 红细胞计数
- B. 红细胞沉降率
- C. 血清蛋白总量
- D. 血红蛋白定量
- E. 网织红细胞计数

正确答案：

D

25. 引起慢性肾衰患者贫血最重要的原因是

- A. 餐的摄入减少
- B. 血液透析失血及频繁抽血化验导致失血
- C. 红细胞生存周期缩短
- D. 叶酸缺乏
- E. 肾脏产生红细胞生成素减少

正确答案：

E

26. 会阴热敷治疗时，热敷面积一般是病损范围的

- A. 相等大小
- B. 1 倍大小
- C. 2 倍大小
- D. 3 倍大小
- E. 4 倍大小

正确答案：

C

27. 腹膜炎术后引流选用

- A. 胶片引流条
- B. 纱布引流条
- C. 凡士林纱布引流条

- D.烟卷引流条
- E.橡皮管引流

正确答案:

D

28. 患者女, 19岁。爬山时左踝部扭伤, 导致局部肿胀、疼痛, 立即来医院就诊, 正确的处理措施是

- A.按摩患处
- B.热湿敷
- C.局部用冰块冷敷
- D.局部用热水袋热敷
- E.用红外线烤灯照射

正确答案:

C

29. 患者男, 50岁。确诊乙型肝炎20年, 长期需要家人照顾其生活起居, 今日该患者因食欲不振、厌油、腹胀3个月。加重1个月入院, 查体: 全身散在皮肤紫癜, 腹部胀痛, 叩诊移动性浊音阳性, 肝脏触诊质硬有结节感, 边缘较薄, 无压痛。实验室检查: ALT(GPT)显著升高, AFP正常。若该患者腹水诊断明确, 每日摄入的钠盐应控制在

- A.1~2、g/d
- B.2~3、g/d
- C.3~4、g/d
- D.4~5、g/d
- E.5~6、g/d

正确答案:

A

30. 慢性肾衰竭患者发生贫血的主要原因是

- A.铁缺乏
- B.肾脏产生红细胞生成素减少
- C.叶酸缺乏
- D.代谢产物抑制骨髓造血
- E.红细胞寿命缩短

正确答案:

B

31. 通常最早提示慢性肾功能衰竭的临床表现是

- A.血压升高
- B.头痛头晕
- C.恶心呕吐
- D.皮肤瘙痒

E.呼吸深快

正确答案:

C

32. 诱发肺心病心功能失代偿的最常见原因是

A.过度劳累

B.补液过快

C.呼吸道感染

D.摄盐过多

E.心律失常

正确答案:

C

33. 下列胎儿窘迫的护理措施, 哪项不对

A.取左侧卧位

B.产妇吸氧

C.二联药物

D.静滴催产素, 加速产程

E.及时 处理胎儿窘迫, 可避免新生儿窒息

正确答案:

D

34. 病人不能随意调整体位, 常见于

A.急性肝炎病人

B.病情较轻的病 人

C.肺结核病人

D.昏迷病人

E.冠心病病人

正确答案:

D

35. 对轻症中暑者应给予

A.静脉注射生理盐水

B.物理降温

C.药物降温

D.阴凉通风处休息, 饮清凉饮料

E.吸氧 3~5l/min

正确答案:

D

36. 病人评估资料的主要来源是

- A.病人本身
- B.病人家属
- C.保健人员
- D.医疗记录
- E.各种检查报告

正确答案:

A

37. 患者女，27岁。心脏病病史8年，37周妊娠，剖宫产一活男婴。现术后2小时，产妇心率126次/分，床上翻身即感胸闷、气短。护理措施中不正确的是

- A.严密监测生命体征
- B.限制静脉输液滴速
- C.吸氧
- D.无盐半流质饮食
- E.及时回乳

正确答案:

D

38. 女性，30岁。自然分娩一女婴，产后2日护士发现会阴侧切伤口红肿，局部湿热敷宜选择的溶液是

- A.75%酒精
- B.5%碘伏
- C.2%碘酊
- D.50%硫酸镁
- E.1:5000高锰酸钾

正确答案:

D

39. 消化道手术患者，术前饮食要求为

- A.普食
- B.流质饮食一周
- C.流质饮食3天
- D.流质饮食2天
- E.禁食1天

正确答案:

C

40. 脑血栓形成护理评估不正确的是

- A.安静状态下发病

- 晨起出现半身瘫痪
C.有动脉粥样硬化病史
D.可有发声障碍
E.有严重意识障碍

正确答案:

E

41. 用未加热的牛奶喂养婴儿可能导致

- A.先天性铁储存不足
B.铁摄入不足
C.铁丢失过多
D.铁吸收减少
E.生长发育快

正确答案:

C

42. 护理程序的步骤排列顺序, 正确的是

- A.评估-诊断-计划-实施-评价
B.评价-诊断-计划-实施-评估
C.评估-实施-计划-诊断-评价
D.评估-计划-诊断-实施-评价
E.评估-诊断-计划-评价-实施

正确答案:

A

43. 慎用或禁用谷氨酸钾的情况是

- A.严重水肿
B.严重腹水
C.心力衰竭
D.脑水肿
E.尿少、尿闭

正确答案:

E

44. 桥脑出血, 瞳孔表现为

- A.一侧瞳孔散大
B.一侧瞳孔缩小
C.针尖样瞳孔
D.双侧瞳孔对光反应消失
E.双侧瞳孔散大固定

正确答案:

45. 小脑幕切迹疝与枕骨大孔疝的临床表现不同的是

- A. 头痛剧烈
- B. 呕吐频繁
- C. 意识障碍出现较早
- D. 血压升高，脉缓有力
- E. 呼吸骤停出现的时间不同

正确答案：

D

46. 可判断类风湿性关节炎活动度指标的是

- A. 关节疼痛
- B. 关节肿胀
- C. 晨僵
- D. 关节畸形
- E. 关节功能障碍

正确答案：

C

47. 关于医院的任务， 错误的是

- A. 指导基层和计划生育的技术工作
- B. 证教学和科研 任务的完成
- C. 以医疗为中心
- D. 做好扩大预防
- E. 以科研为主

正确答案：

E

48. 肋骨骨折好发于

- A. 1-3 肋
- B. 4-7 肋
- C. 8-9 肋
- D. 10-12 肋
- E. 位置不固定

正确答案：

B

49. 急性心肌梗死时心电图检查最具特征性的改变为

- A. 宽而深的 Q 波

段弓背抬高

C.T 波倒置

D.ST 段压低

E.T 波高尖

正确答案：

A

50. 患者男，30 岁。患“化脓性扁桃体炎”，医嘱青霉素皮试，护士在做青霉素皮试后约五分钟，患者突感胸闷，面色苍白，出冷汗，脉细速，血压下降，呼之不应。抢救过程中，该患者发生了室颤，护士采取的处理措施中正确的是

A.同步电复律

B.非同步电复律

C.心内注射利多卡因

D.立即肌注阿托品

E.立即给予患者心脏按压

正确答案：

B

51. 隐血试验前 3 天禁忌的饮食是

A.豆制品

B.马铃薯

C.大白菜

D.白萝卜

E.绿叶菜

正确答案：

E

52. 尿毒症病人饮食护理正确的是

A.忌盐

B.限水

C.限钾

D.低热量

E.补钙

正确答案：

E

53. 正确测量头围的方法是

A.枕后到额部中央绕头一周

B.枕后沿两耳到眉间绕头一周

C.枕后结节到眉弓上方最突出处绕头一周

D.枕后结节到眉间绕头一周

枕后结节到眉弓上 2cm 绕头一周

正确答案:

C

54. 男, 58 岁, 患有慢性支气管炎并阻塞性肺气肿。近日因感冒咳喘加重, 并有低热。就诊前 2 小时突然喘息加剧, 出大汗, 用解痉止喘药均不能缓解。体检: 喘憋状态, 口唇紫绀, 左肺叩诊过清音, 右肺鼓音, 右肺呼吸音消失, 左侧呼吸音增粗并有少量干啰音、除上述外, 体查时还应有的体征是

- A. 气管居中
- B. 气管左移位
- C. 气管右移位
- D. 胸廓凹陷
- E. 右肺呼吸运动增强

正确答案:

B

55. 下列慢性胃炎保健指导中, 不妥的是

- A. 养成细嚼慢咽的进食习惯
- B. 戒烟忌酒
- C. 腹痛时口服阿司匹林
- D. 上腹饱胀、返酸时口服吗丁林
- E. 避免使用泼尼松及利血平

正确答案:

C

56. 对低钾患者静脉补钾, 最重要的参考指标是

- A. 给药速度
- B. 药液浓度
- C. 患者尿量
- D. 用药总量
- E. 患者精神状态

正确答案:

C

57. 应特别强调术中不能咳嗽的诊疗检查是

- A. 纤维胃镜检查术
- B. 胸腔穿刺术
- C. 腹腔穿刺术
- D. 骨髓穿刺术
- E. 腰椎穿刺术

正确答案:

58. 某女士，30岁，诊断为甲亢，清晨测得脉率96次/分，血压17.3/9.3Kpa(130/70mmHg)，计算基础代谢率是属于

- A.正常
- B.正常范围偏高
- C.重度甲亢
- D.中度甲亢
- E.轻度甲亢

正确答案：

D

59. 慢性胃炎患者应避免口服

- A.链霉素
- B.庆大霉素
- C.泼尼松
- D.吗丁林
- E.胃复安

正确答案：

C

60. 医院内的临床护理工作主要包括基础护理和

- A.护理科研
- B.社区护理
- C.护理管理
- D.专科护理
- E.护理教育

正确答案：

D

61. 用阴道分泌物悬滴法查念珠菌时，应用下述哪种液体做悬液

- A.4%碳酸氢钠
- B.10%氢氧化钠
- C.0.9%盐水
- D.0.2%新洁尔灭
- E.1%乳酸液

正确答案：

B

62. 患者女，60岁。甲状腺肿大20年，下列与压迫邻近组织无关的症状是

- 呼吸困难
 - B. 吞咽困难
 - C. 头面部瘀血
 - D. 咳粉红色泡沫痰
 - E. 声音嘶哑
- 正确答案:

D

63. 按纽曼健康系统模式，当怀疑或发现压力源确实存在而压力反应尚未发生时，应采取的预防措施是()

- A. 初级预防
 - B. 一级预防
 - C. 二级预防
 - D. 三级预防
 - E. 四级预防
- 正确答案:

B

64. 肌肉等长练习的正确描述是

- A. 因肌肉长度改变而肢体运动
 - B. 伴有明显的关节运动
 - C. 增加肌肉的张力而不改变肌肉的长度
 - D. 增加肌肉的张力且改变肌肉的长度
 - E. 等长运动又称动力运动
- 正确答案:

C

65. 有可能导致危及生命的心律失常是

- A. 心房颤动
 - B. 阵发性室上性心动过速
 - C. 窦性心动过缓
 - D. 阵发性室性心动过速
 - E. 频发单源性室性早搏
- 正确答案:

D

66. 患者男，50岁。咳嗽，咳白色泡沫痰5个月，胸痛半个月。X线胸片检查提示右下肺肺叶内带近肺门处有一直径3cm分叶状阴影。CT检查提示不规则高密度肿块阴影，同侧肺门淋巴结肿大，直径约1.1cm，支气管纤维镜检查确诊为鳞癌，行全肺切除术。术后第一天，BP120/75mmHg P86次/分，R20次/分，T37.5℃，尿量正常。以下护理措施中正确的是

- A.保持胸腔引流管畅通，使之呈全程开放状态
- B.侧卧位，以预防纵隔移位和压迫健侧肺而导致呼吸循环功能障碍
- C.控制钠盐摄入，24小时补液量应控制在2000ml以内，速度20~30滴/分
- D.术后前3天以卧床休息为主，以预防引流管滑脱
- E.出院前告知患者，出院后不必再进行呼吸运动锻炼

正确答案：

C

67. 患者女，61岁。因头昏摔倒致腰椎L2右侧横突骨折而急诊入院，经积极治疗，现病情已稳定。护士协助患者改变体位的方法正确的是

- A.一人协助患者取半坐卧位法
- B.两人协助患者取半坐卧位法
- C.一人协助患者取端坐位法
- D.一人协助患者轴线翻身法
- E.两人协助患者轴线翻身法

正确答案：

E

68. 患者，男，40岁。因车祸导致脑外伤，出现昏迷。为保证营养的供给，需要长期鼻饲，取去枕平卧位，准备接受插胃管。为其插胃管至15cm时，应采取的护理措施是

- A.使患者头后仰便于胃管插入
- B.让患者取右侧卧位使插管顺利
- C.将患者头托起，使下颌骨靠近胸骨柄
- D.将病床床头摇起，使患者呈半坐卧位
- E.使患者头偏向护士一侧方便胃管插入

正确答案：

C

69. 使用无菌溶液的方法，不正确的是使用前应该

- A.对溶液的名称、浓度、有效日期及溶液质量
- B.开启瓶塞时手不可触及瓶口
- C.冲洗瓶口时标签始终朝向掌心
- D.倒液后环绕消毒瓶塞时，最先消毒手接触的部位
- E.已开启的无菌溶液瓶内的溶液，可保存24小时

正确答案：

D

70. 内科护理健康教育的主要目的是

- A.指导饮食增进食欲
- B.树立健康意识消除危险因素
- C.指导体育锻炼增强体质

- D.树立信心配合治疗
- E.合理用药防止复发

正确答案:

B

71. 细菌性肝脓肿患者术后拔除引流管的指征是每日引流液应少于

- A.5ml
- B.10ml
- C.15ml
- D.20ml
- E.25ml

正确答案:

B

72. 使用时需要观察尿量的药物是

- A.硫酸镁注射液
- B.西地兰
- C.20%甘露醇
- D.50%葡萄糖
- E.5%碳酸氢钠

正确答案:

C

73. 男士，18岁与同学上山游玩，不慎被毒蛇咬伤，小腿伤口红肿疼痛，同学在现场做了如下处理，哪项不对

- A.用裤带在伤口近端缚扎
- B.冷开水冲洗伤口
- C.用白酒消毒水果刀后，挑开创口
- D.用清洁手帕覆盖伤口
- E.扶患者走下山，送回家休养

正确答案:

E

74. 慢性肾功能衰竭后期病人，一旦出现下列哪种情况提示病情严重

- A.少尿、高血钾
- B.中度贫血
- C.乏力、食欲减退
- D.水肿、低钠血症
- E.呼气有尿臭味

正确答案:

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/916040214125010235>