2024河南省汝阳县《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷200题题库及参考答案（完整版）

第Ⅰ部分 单选题（100题）

1.患者，女，54岁。诊断为类风湿关节炎2年，目前服用甲氨蝶呤(15mgqw)和塞来昔布(200mgqd)。患者因担心药品不良反应用药规律时断时续近日出现腕关节肿胀和疼痛加重晨僵明显加用泼尼松10mgqd。

A: 早期治疗、遵医嘱规律用药

B: 一旦症状改善,应即刻停药

C: 定期就诊评估病情,调整治疗案

D: 多晒太阳适量补充钙剂、维生素D预防骨质疏松

答案：B

2.轻微的反应或疾病、症状不发展、一般无需治疗，应判为

A: 重度

B: 轻度

C: 弱轻度

D: 中度

答案：B

3.阿司匹林可能引起

A: 尿酮体

B: 尿沉渣结晶

C: 尿血红蛋白

D: 尿肌酐

答案：C

4.患儿，男，12岁，患有常年性过敏性鼻炎，药师推荐使用布地奈德鼻喷雾剂。关于用药剂量和使用方法，正确的是

A: 每侧鼻孔64μ（一喷），早、晚各一次，取得效果后改为每日睡前每侧鼻孔喷入64μg

B: 每侧鼻孔128μg（两喷），早、晚各一次，取得效果后改为每日早晨每侧鼻孔喷入128μg

C: 每侧鼻孔128μg（两喷），早、晚各一次，取得效果后改为每日睡前每侧鼻孔喷入128μg

D: 每侧鼻孔64μg（一喷），早、晚各一次，取得效果后改为每日早晨每侧鼻孔喷入64μg

答案：D

5.药师与患者进行沟通时的技巧不包括

A: 尽量使用专业性术语

B: 认真观察对方的表情变化，判断其对问题的理解和接受程度

C: 认真聆听，使用通俗易懂的语言

D: 与患者谈话时间不宜过长，一次性提供的信息不宜过多

答案：A

6.患者，男，27岁，电话咨询药师朋友，告知目前正在欧洲旅游，从昨夜开始出现腹泻，呈水样便，起夜4次，希望药师给出建议。有关药师给予该患者的建议，错误的是

A: 口服左氧氟沙星胶囊0.2gtid

B: 避免高脂肪、高糖饮食

C: 口服双八面体蒙脱石散，与抗菌药物同服

D: 口服补液盐ORSⅢ50ml/kg，4～6h内服完

答案：C

7.患者，女，66岁，身高156cm，体重61kg。空腹血糖7.8mmol／L，餐后血糖11.2mmol／L，糖化血红蛋白8.7%。

A: 饮食干预及运动治疗

B: 口服Gt一葡萄糖苷酶抑制剂

C: 口服磺酰脲类降糖药

D: 口服二甲双胍

答案：D

8.马来酸氯苯那敏（扑尔敏）用于良性前列腺增生症患者，导致尿潴留，属于

A: 过度治疗用药

B: 无适应证用药

C: 有禁忌证用药

D: 超适应证用药

答案：C

9.不属于早期杀菌性抗结核药物的是

A: 链霉素

B: 吡嗪酰胺

C: 异烟肼

D: 利福平

答案：B

10.使用硫酸亚铁片治疗缺铁性贫血，元素铁的治疗量是

A: 60mgbid

B: 60mgqd

C: 60mgtid

D: 100mg/次

答案：C

11.（2016年真题）患者，男，48岁，患有青光眼3年。今日因支气管哮喘急性发作，给予舒张支气管、抗炎等治疗，应告知该患者用药后需漱口的药物是（）。

A: 多索茶碱注射液

B: 孟鲁斯特纳咀嚼片

C: 布地奈德混悬液

D: 沙丁胺醇气雾剂

答案：C

12.可加重老年人慢性便秘的药物是

A: 麻黄碱

B: 异丙嗪

C: 氯丙嗪

D: H

答案：B

13.药物不良反应报告的描述项目

A: 患者疾病发病时间

B: 采取措施干预不良反应的时间

C: 药品不良反应动态变化的相关症状体征、检查及干预措施结果

D: 患者用药记录

答案：C

14.适用于急性疼痛、骨关节炎的处方药是

A: 阿托品
B: 塞来昔布
C: 可待因
D: 硫酸氨基葡萄糖
答案：B

15.下列著名药学专著中，收录有5500余种药物专论、4万多篇参考文献的是
A: 《医师案头参考》
B: 《中国国家处方集》
C: 《药物事实与比较》
D: 《马丁代尔药物大典》
答案：D

16.5-HT
A: 艾司唑仑
B: 丁螺环酮
C: 阿米替林
D: 舍曲林
答案：B

17.患儿，男，5个月，体重9.0kg，平素健康，近日出现多汗、夜哭、易惊。体检：前囟平软，颅骨有“乒乓球”感，枕秃，肋骨串珠。人工喂养，尚未添加任何辅食，平素较少出门。
A: 维生素C
B: 维生素B12
C: 维生素D
D: 维生素A

答案：C

18.治疗胃食管反流病，铝碳酸镁的正确服药时间是

A: 症状发作时、餐后1.5h和睡前

B: 餐后、睡前

C: 三餐前30min

D: 早餐前30min

答案：A

19.可改善睫状肌功能和增加睫状肌血流量，改善眼部调节功能的药物是

A: 七叶洋地黄双苷滴眼液

B: 聚乙烯醇滴眼液

C: 玻璃酸钠滴眼液

D: 羟甲基纤维素钠滴眼液

答案：A

20.患者，男，65岁，良性前列腺增生病史3年，高血压病史2年，咳嗽，咳痰10余年，伴哮喘，尤以活动后明显，因近半月咳嗽加重入院，主诉便秘，每周2次排便，长期口服硝苯地平控释片30mg/qd，血压控制良好。体格检查：体温36.6℃，P82次/分，R22次/分，端坐位，喘息貌，桶状胸，双肺叩诊过清音，散在干啰音，双肺下少许湿罗音，辅助检查：血常规WBC11.2×10

A: 30ml，早餐时一次服用

B: 每次10ml，每日三次，餐前给药

C: 30ml，晚餐时一次服用

D: 每次10ml，每日三次，餐后给药

答案：A

21.苯妥英钠、呋塞米蛋白结合率下降的机制是

A：组织吸收有自限性

B：血浆蛋白含量下降，酸性代谢产物蓄积

C：药物生物转化障碍

D：经肾排泄的药物消除减慢

答案：B

22.患者用药咨询的内容是

A：新药信息

B：自我保健

C：治疗药物监测

D：首次剂量、维持剂量以及每日用药次数、间隔与疗效

答案：D

23.贮存温度在2℃以上时，温度越低．对多数药品保管越有利。降钙素鼻喷雾剂说明书标明“冷处”贮存，其贮存条件是指

A：温度在10℃～30℃之间

B：温度在2℃～10℃之间

C：避光.温度不超过-5℃

D：温度不超过20℃

答案：B

24.癫痫持续状态首选的治疗方案是

A：口服丙戊酸钠200mg

B：口服苯妥英钠300mg

C：口服地西泮10mg

D：静脉注射地西泮10mg

答案：D

25.收录5500余种药物专论、4万多篇参考文献的是

A：《中国国家处方集》

B：《美国药典药物信息》

C：《马丁代尔药物大典》

D：《药物事实与比较》

答案：C

26.大剂量易引起碱血症的抗酸药是

A：西沙必利

B：奥美拉唑

C：碳酸氢钠

D：莫沙必利

答案：C

27.静脉滴注两性霉素B的适宜溶媒是

A：复方氯化钠注射液

B：0.9%氯化钠注射液

C：5%葡萄糖注射液

D：50%葡萄糖注射液

答案：C

28.有关血清丙氨酸氨基转移酶的叙述正确的是

A：血清丙氨酸氨基转移酶增高的程度与肝细胞被破坏的程度呈正比

B：丙氨酸氨基转移酶只存在于肝脏中

C：丙氨酸氨基转移酶(ALT)与谷丙转氨酶(GPT)是两个反映肝脏功能的指标

D: 丙氨酸氨基转移酶是一组催化氨基酸之间氨基转移反应的酶类

答案：A

29.治疗结核病的患者的注意事项错误的是

A: 患者所用食具应于餐后煮沸消毒

B: 口服抗结核药可自行决定饭后服用

C: 增强体质增加高蛋白和维生素的摄入，日光浴

D: 充分了解抗结核药物服用中可能出现的不良反应，一旦出现要及时报告医生

答案：B

30.连续使用易产生耐受性的是

A: 硝酸甘油

B: 哌唑嗪

C: 普萘洛尔

D: 氨氯地平

答案：A

31.（2018年真题）某口服避孕药复方制剂，其成分为：每片含屈螺酮3mg和炔雌醇0.03mg。说明书部分内容节选如下，请回答问题。

A: 尽快同时服用两片药,然后在常规时间继续服药,不需要使用额外的避孕措施

B: 尽快同时服用两片药,然后在常规时间继续服药,在以后的7天内要加用屏障避孕法

C: 在常规时间20:00服用4月25日的药片,不用补服4月24日的药片

D: 不再继续服用此周期药物,经过一个7天的停药期,再开始继续服用下一周期的药物

答案：A

32.抑制细胞色素氧化酶损害中枢神经系统的是

A：磷化锌

B：氯化锌

C：磷化氢

D：氯化钠

答案：C

33.属于促动力药的是（）

A：铝碳酸镁

B：埃索美拉唑

C：法莫替丁

D：多潘立酮

答案：D

34.（2019年真题）患者，男，34岁，有吸毒史。因过量使用阿片类药物昏迷入急诊抢救，表现为针尖样瞳孔、呼吸抑制，可选用的解救药物是

A：纳洛酮

B：二巯丙醇

C：亚甲蓝

D：维生素K

答案：A

35.真菌引起的阴道炎宜选用

A：咪康唑

B：聚甲酚磺醛

C: 庆大霉素

D: 甲硝唑

答案：A

36.机体钙吸收减少的机制是

A: 血浆蛋白含量下降，酸性代谢产物蓄积

B: 组织吸收有自限性

C: 药物生物转化障碍

D: 经肾排泄的药物消除减慢

答案：C

37.过量服用维生素D导致中毒的典型临床表现是

A: 间质性肾炎或肾结石

B: 横纹肌溶解或肌痛

C: 骨质疏松或骨折

D: 骨骼发育不良或骨软化

答案：A

38.服用他达拉非后，如果舌下含服硝酸甘油，建议服药间隔时间应为

A: 4小时

B: 48小时

C: 24小时

D: 1周

答案：B

39.苯丙胺中毒

A: 1%氯化钠溶液

B: 5%碳酸氢钠溶液

C：1%硫酸镁溶液

D：药用炭混悬液

答案：D

40.宜于清晨服用的药品是

A：阿卡波糖

B：糖皮质激素

C：甲氧氯普胺

D：洛伐他汀

答案：B

41.患者，男，56岁，以发热、左侧胸廓剧痛就诊。查体：体温38.8℃，左侧沿第四肋走向有簇集性水疱。

A：奥司他韦

B：阿昔洛韦

C：利巴韦林

D：恩替卡韦

答案：B

42.常见老年人ADR的药物类别,硝苯地平可出现面部潮红、心慌、头痛等反应

A：钙通道阻滞剂

B：抗生素

C：β 受体阻断剂

D：抗胆碱药

答案：A

43.患者，女，59岁，一月前患胃溃疡，近日查体发现血脂异常化验结果：TC7.2mmol/L，TG1.7mmol/L，LDL-C4.3mmol/L，ALT56U/L，AST80U/L。该患者首选的调脂药是()

A：非诺贝特片

B：阿昔莫司胶囊

C：普罗布考片

D：阿托伐他汀钙片

答案：D

44.血液具有输送营养、氧气、抗体、激素和排泄废物及调节水分、体温、渗透压、酸碱度等功能。成人的血液占体重的8%～9%。血液中的成分分为血浆(无形成分)和细胞(有形成分)两大部分。在正常情况下，血细胞主要包括红细胞、白细胞、粒细胞、淋巴细胞、血小板等。

A：>90g/L

B：31～60g/L

C：<30g/L

D：61～90g/L

答案：C

45.I期临床试验是初步的临床药理学及人体安全性评价试验阶段。试验对象主要为健康受试者，试验样本数一般为

A：20～30例

B：36～40例

C：12～13例

D：10～18例

答案：A

46.患者，女，27岁，2年前开始出现多汗、多食，近期因消瘦、心悸就诊。查体：甲状腺肿大，根据血T3、T4及TSH检查结果，诊断为甲亢。目前该患者正处于哺乳期。

A: 头痛

B: 肝功能损害

C: 皮疹

D: 粒细胞减少

答案：D

47.属于HIV整合酶链转移抑制剂的是（）

A: 多替拉韦

B: 奈韦拉平

C: 阿巴卡韦

D: 洛匹那韦

答案：A

48.患者，男,69岁，BMI27．8kg/mr,既往有骨性关节炎病史。近期爬山后，再次出现膝关节疼痛，患者热敷后疼痛未缓解，前来咨询如何选用“止痛药"。

A: 对因治疗

B: 姑息治疗

C: 对症治疗

D: 缓和治疗

答案：C

49.连续规律用药2日以上方能充分发挥作用的药品是

A: 非甾体抗炎药

B: β受体拮抗剂

C: 吸入型糖皮质激素

D: 短效 β

答案：C

50.主要用于吗啡、哌替啶急性中毒解救的是

A: 谷胱甘肽

B: 盐酸烯丙吗啡

C: 亚硝酸钠

D: 双解磷

答案：B

51.吉法酯片治疗消化性溃疡，正确的用药方法是（）

A: 餐前1/小时嚼碎服用

B: 清晨空腹整片吞服，并保持上身直立至少30分钟

C: 睡前服用

D: 餐后半小时服用

答案：D

52.餐后1～2h服用的是

A: 胃黏膜保护剂

B: 质子泵抑制剂

C: 解痉、镇痛药

D: 抗酸药

答案：D

53.在夏季，用前宜其置入冰水或冰箱中10～20分钟；给药后1～2小时内尽量不排尿

A: 气雾剂

B：泡腾片

C：膜剂

D：阴道栓剂

答案：D

54.患者，女，52岁，患有2型糖尿病，餐前血糖正常，餐后升高，一直服用阿卡波糖控制。近期反映常出现低血糖表现，应建议患者随身携带

A：巧克力

B：麦芽糖

C：葡萄糖水

D：果糖

答案：C

55.（2017年真题）患者，女，54岁。诊断为类风湿关节炎2年，目前服用甲氨蝶呤（15mgqw）和塞来昔布（200mgqd）。患者因担心药品不良反应用药规律时断时续近日出现腕关节肿胀和疼痛加重晨僵明显加用泼尼松10mgqd。

A：一旦症状改善,应即刻停药

B：早期治疗、遵医嘱规律用药

C：多晒太阳适量补充钙剂、维生素D预防骨质疏松

D：定期就诊评估病情,调整治疗案

答案：A

56.一般不会出现中性粒细胞增多的中毒事例是

A：汞中毒

B：催眠药中毒

C：铅中毒

D: 乙醇中毒

答案：D

57.容易水解的药物是

A: 青霉素类

B: 牛痘菌苗

C: 胃蛋白酶

D: 阿扑吗啡

答案：A

58.适宜睡前服用，用于抑制“酸突破现象”的抑酸剂是

A: 法莫替丁

B: 乳酸菌素

C: 硫糖铝

D: 铝碳酸镁

答案：A

59.伴有心脏病、高血压者应慎用的药品是

A: 含伪麻黄碱的抗感冒药

B: 含氯苯那敏的抗感冒药

C: 含右美沙芬的抗感冒药

D: 含咖啡因的抗感冒药

答案：A

60.可造成肝脏损害，形成肝硬化或脂肪肝，减弱对药物代谢速度的是

A: 食醋中的醋酸

B: 酒中的乙醇

C: 食盐中的氯化钠

D: 茶叶中的鞣酸

答案：B

61.发热的判断标准是指人体昼夜体温波动超过1℃，腋下温度超过

A: 36.7℃

B: 37.0℃

C: 37.3℃

D: 37.6℃

答案：B

62.男性，45岁。反复发生夜间呼吸困难1个月，加重一天就诊，体格检查：血压180/110mmHg，呼吸急促，双肺散在哮鸣音，双肺底细湿啰音，心率130次/分。

A: 慢性支气管炎还是急性支气管炎

B: 肺心病还是冠心病

C: 双肺炎症还是肺间质纤维化

D: 支气管哮喘还是心源性哮喘

答案：D

63.WHO推荐12岁以下儿童碘的摄入范围是

A: 30～100μg/d

B: 30～120μg/d

C: 50～120μg/d

D: 50～100μg/d

答案：C

64.(常用抗高血压药物的分类)，氨苯蝶啶属于

A: 直接血管扩张剂

B: 非二氢吡啶类钙通道阻滞药

C: 保钾利尿药

D: 二氢吡啶类钙通道阻滞药

答案：C

65.血液净化疗法可使重症毒物中毒者愈后大为改观，血液净化的方法不包括

A: 血液透析

B: 血液置换

C: 腹膜透析

D: 血液滤过

答案：B

66.患者，女，28岁，妊娠6个月，出现轻度外阴烧灼感、尿痛、尿急，就医后确诊为滴虫性阴道炎合并尿路感染，首选用药方案是

A: 甲硝唑阴道栓（片）200mg，阴道用药，每晚1次.连用7日

B: 1：2服克林霉素300mg，每日2次，连用7日

C: 咪康唑栓，阴道给药，每晚1粒（200mg），连用7日

D: 口服甲硝唑400mg，每日2次，连服7日

答案：D

67.适合治疗伴有焦虑症的抑郁者的药物是

A: 丙咪嗪

B: 帕罗西汀

C: 氟伏沙明

D: 阿米替林

答案：B

68.对于尿液的描述正确的是

A: 正常人每日排出尿液1～2L，其中50%为水分

B: 正常人的尿量变化幅度不大

C: 正常人的新鲜尿液呈弱碱性

D: 尿量的多少主要取决于肾小球滤过率和肾小管的重吸收

答案：D

69.患者,女,71岁,2型糖尿病史10年。化验结果糖化血红蛋白(HbA)9.2%,空腹血糖10.5mmol/L,餐后血糖15.5mmo/L。目前服用二甲双胍片0.5gtidpo,格列美脲片2mgtidpo,罗格列酮片2mgbidpo,甲钴胺片0.5mgtidpo,羟苯磺酸钙胶囊250mgbidpo。

A: 甘精胰岛素睡前30min,皮下注射,qd

B: 低精蛋白锌胰岛素餐前30min,皮下注射

C: 普通胰岛素餐前30min,皮下注射,qd

D: 门冬胰岛素餐前30~60min,皮下注射,tid

答案：A

70.（2019年真题）下列分析方法中，不属于药物经济学评价方法的是

A: 成本-效益分析法

B: 成本-效用分析法

C: 最小成本分析法

D: 成本-效应分析法

答案：D

71.长期精神紧张性头痛，推荐应用的药物是

A: 罗通定

B: 阿司匹林

C: 地西泮

D: 谷维素

答案：C

72.患者，女性，62岁，自述近日常有一过性黑矇，雾视、视野中有黑点，一侧面部无力、麻木。医师诊断为短暂性脑缺血。

A: 3.0～4.0

B: 2.0～3.5

C: 2.0～4.0

D: 2.0～3.0

答案：D

73.关于TIA的药物治疗说法不正确的是

A: 对伴发房颤、风湿性二尖瓣病变的患者建议选用华法林抗凝治疗

B: 小剂量肠溶阿司匹林能一定程度上降低卒中再发

C: 抗凝治疗为非心源性TIA的常规治疗

D: 对反复发生TIA的患者应首先考虑选用抗血小板药物

答案：C

74.属于癌症第二阶梯止痛药物的是

A: 二氢可待因

B: 谷维素

C: 美沙酮

D: 对乙酰氨基酚

答案：A

75.患者,男,38岁,因腹部受寒胃痉挛疼痛,应选用的药物是()

A: 山莨菪碱

B: 麦角胺咖啡因

C: 布洛芬

D: 卡马西平

答案：A

76.患儿，女，4岁半。身高110cm，体重15kg。一天前发热（39.1℃），咽喉痛，无咳嗽，无吐泻，家长在家选用退烧药对症治疗，发病20h左右出现腹泻，约2~5h，一次大便，量少，黄色粘液便，呕吐1次。体格检查：T38.8℃，P118次/分，R28次/分。咽位充血，出现轻微脱水症状。双肺呼吸音清，腹平软，肝脾未触及，肠鸣音活跃。实验室检查：WBC18.5×109/L（参考值4.0~10×109/L），粪便镜检可见红、白细胞。

A: 应给予少量、多次、清淡饮食?

B: 每次腹泻后均要少量多次喂水，直至腹泻停止?

C: 若症状不能改善，可及时加用诺氟沙星?

D: 若患儿腹泻加重，可口服自制补液盐进行补液?

答案：C

77.（2018年真题）老年女性,心功能衰竭,服用呋塞米及螺内酯片,正确的使用方法是（）

A: 用温水调服

B: 舌下含服

C: 清晨服用

D: 应同时碱化尿液

答案：C

78.用于铜中毒的解毒剂是

A: 维生素K1

B: 乙酰胺

C: 青霉胺

D: 硫酸阿托品

答案：C

79.如果ACEI引起干咳可

A: 慎用甲基多巴

B: 联用他汀类

C: 给予硫酸亚铁

D: 停用ACEI或减量

答案：C

80.以下药品中，可能导致老年人中枢神经系统高反应性等不良反应的是

A: 地西泮

B: 呋塞米

C: 氯苯那敏

D: 氨氯地平

答案：A

81.蛋白酶抑制剂（）

A: FIs

B: NNRTIs

C: NRTIs

D: PIs

答案：D

82.吸附力强、可阻止毒物吸收，但是对氰化物无效的洗胃液是

A: 牛奶-水混合液

B: 1%硫酸镁溶液

C: 药用炭混悬液

D: 鸡蛋白

答案：C

83.荨麻疹患者常出现

A: 血小板计数增高

B: 血红蛋白减少

C: 中性粒细胞增多

D: 嗜酸性粒细胞增多

答案：D

84.李某，58岁，高血压病史10年，伴慢性心功能不全，给予地高辛每日维持量治疗，突然出现窦性心动过缓，宜选用的治疗药物是

A: 肾上腺素?

B: 维拉帕米?

C: 普萘洛尔?

D: 阿托品?

答案：D

85.“利大于弊才有实际意义”体现选择治疗药物的

A: 安全性

B: 经济性

C: 有效性

D: 方便性

答案：C

86.能早期发现患者用药伤害、尽快地采取干预措施的方法是

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：
https://d.book118.com/916104243055011030