

2024 年高等学校单独考试招生复习题库

护理专业职业技能考试（笔试）

1. 【A2 题型】患儿，5 岁。1 岁时出现活动后气促、乏力，口唇及指（趾）端发绀，喜欢下蹲位，可见杵状指。首先应考虑的疾病是
A. 室间隔缺损
B. 房间隔缺损
C. 动脉导管未闭
D. 法洛四联症
2. 【A2 题型】患儿，4 岁，自 2 岁起哭后面部青紫明显，平时易感冒，身体发育较同龄孩子差。体检：瘦小，面色发黄，胸骨左缘第 2~3 肋间听到Ⅲ级收缩期喷射性杂音，传导广泛；X 线胸片可见肺门舞蹈征。对该患儿的印象是
A. 肺动脉瓣狭窄
B. 动脉导管未闭
C. 房间隔缺损
D. 室间隔缺损
3. 【A1 题型】高血压病非药物治疗不包括
A. 四肢红外线治疗
B. 限制钠盐摄入
C. 减轻体重
D. 良好休息与适量运动结合
4. 【A2 题型】患者男性，48 岁。有间歇性头痛、头晕、血压偏高病史，昨日出现剧烈头痛、心悸、多汗、视物模糊、面色苍白，血压 20/122mmHg，心率 120 次/分。下列护理措施中错误的是
A. 绝对卧床休息
B. 平卧位
C. 保持呼吸道通畅
D. 静滴硝普钠
5. 【A2 题型】病人，男性，62 岁，高血压病已 10 余年，血压一直持续在 200/110mmHg。当地医院服用降压药物 2 天后，血压降至 105/75mmHg。此时应警惕发生
A. 晕厥
B. 脑梗死
C. 肾功能减退
D. 脑出血
6. 【A2 题型】患者女性，56 岁。因头晕、头痛就医，测血压 65/105mmHg，有高血压家族史。诊断为原发性高血压。目前原发性高血压急症的首选降压药多为
A. 硝普钠
B. 呋塞米
C. 卡托普利
D. 阿替洛尔
7. 【A2 题型】患者，男性，50 岁，突感胸骨后压榨性疼痛，伴出汗、恶心，含服硝酸甘油后仍不能缓解。该患者最可能的诊断是
A. 高血压性心脏病

B. 心绞痛

C. 心肌炎

D. 急性心肌梗死

8. 【A2 题型】女性, 48 岁, 高血压病史 12 年, 一直间断服降压药维持, 血压时高时低, 多在 21.3/13.3kPa(160/100mmHg), 4 小时前心前区持续疼痛, 出冷汗急诊来院, 经心电图检查确诊为急性心肌梗死, 进行观察 1 小时后出现呼吸困难, 两肺布满湿啰音, 心率 12 次/分, 律齐。首先考虑病人的病情变化是

A. 急性左心衰竭

B. 再次心肌梗死

C. 肺部感染

D. 严重心肌缺血、缺氧

9. 【A1 题型】急性心肌梗死的心电图特征不包括

A. ST 段呈弓背状向上明显抬高

B. 异常深而宽的 Q 波

C. ST 段下移

D. T 波倒置

10. 【A1 题型】下列哪项不是急性心肌梗死溶栓治疗的指征

A. 年龄在 65 岁以下

B. 发病在 6 小时以内

C. 胸痛持续 30 分钟以上

D. 出现病理性 Q 波

11. 【A2 题型】患者女性, 30 岁。因患慢性风湿性心脏瓣膜病、二尖瓣狭窄收入院。患者近来症状严重, 医生要求护士观察心律变化, 及时发现心律失常。风心病二尖瓣狭窄最常出现的失常是

A. 房性期前收缩

B. 室性期前收缩

C. 心房颤动

D. 心房扑动

12. 【A1 题型】慢性风湿性心脏病常见的并发症没有

A. 心力衰竭

B. 心房颤动

C. 动脉栓塞

D. 高血压

13. 【A1 题型】亚急性感染性心内膜炎首要发生于下列哪种疾病

A. 风湿性心脏瓣膜病

B. 室间隔缺损

C. 动脉导管未闭

D. 法洛四联症

14. 【A1 题型】患者, 男性, 28 岁, 自幼好发扁桃体炎, 8 年前于劳动时出现呼吸困难, 后咳粉红色泡沫痰及双下肢水肿, 诊断为慢性风湿性心脏病, 二尖瓣狭窄及主动脉瓣关闭不全者出现水冲脉、毛细血管搏动的原因是

A. 脉压增大

B. 肺淤血

C. 微循环障碍

D. 大循环淤血

15. 【A2 题型】患者突然晕倒，意识丧失，抽搐，大动脉搏动消失，叹息样呼吸，呼之不应。此时首要的抢救措施是

- A. 吸氧
- B. 吸痰
- C. 胸外心脏按压
- D. 电除颤

16. 【A1 题型】慢性胃炎的典型临床表现为

- A. 上腹部饱胀不适
- B. 腹泻
- C. 呕血
- D. 黑便

17. 【A1 题型】下列有关慢性胃炎病人的护理，不妥的是

- A. 急性发作时，应卧床休息
- B. 疼痛明显者可予以局部热敷
- C. 胃酸缺乏者可给予酸性食物
- D. 出血者均必须禁食

18. 【A2 题型】男性，27 岁，自去年冬季以来每日发生上腹部隐痛，平时伴有恶心、打嗝、酸，检查示幽门螺杆菌阳性，诊断“慢性胃炎”，医生针对其病情采用三联疗法治疗。三联疗法包括

- A. 阿莫西林+甲硝唑+枸橼酸铋钾
利福平+甲硝唑+乙胺丁醇
- C. 氯霉素+红霉素+链霉素
- D. 黄连素+呋喃唑酮+链霉素

19. 【A2 题型】患者，女性，35 岁，上腹部隐痛反复发作多年，进食后可缓解，现突然出现剧烈腹痛，腹部触诊：腹肌紧张呈板状腹，有压痛和反跳痛。该病人突然出现剧烈腹痛最可能的原因是

- A. 急性胆囊炎
- B. 上消化道溃疡穿孔
- C. 脾破裂
- D. 急性胰腺炎

20. 【A2 题型】男性，27 岁，自去年冬季以来每日发生腹痛，平时伴有恶心、打嗝、反酸，体在剑突右侧有局限压痛，无反跳痛，诊断“十二指肠溃疡”。十二指肠溃疡疼痛的特点是A. 餐后即痛，持续 2 小时后缓解

- B. 餐后 1 小时开始，持续 2 小时后缓解
- C. 餐后 2 小时开始，持续 2 小时后缓解
- D. 餐后 3~4 小时开始，进餐后缓解

21. 【A2 题型】患者男性，37 岁，有溃疡病史。中午饱餐后，出现上腹剧烈疼痛，伴恶心、呕血，腹肌紧张，出冷汗，休克，考虑溃疡病穿孔，下列对诊断最有意义的指征是

- A. 剧烈腹痛
- B. 呕血
- C. 板状腹
- D. X 线检查见膈下游离气体

22. 【A2 题型】病人，男性，53 岁，肝硬化病人。3 天前呕血解黑便，昨起烦躁不安，行为

异常，理解力与定向力显著减退。一直处于熟睡状态，难以叫醒，唤醒后不能正确回答前目该病人并发了

- A. 精神病
- B. 脑缺血
- C. 肝肾综合征
- D. 肝性脑病

23. 【A2 题型】男，15 岁，剑突下阵发性钻顶样绞痛，伴恶心、呕吐。为明确诊断首选检查

- A. B 超
- A. X 线
- C. PTC
- D. CT

24. 【A2 题型】女，46 岁，反复出现腹痛、寒战高热、黄疸，确诊为原发性胆总管结石石结的主要成分为

- A. 胆汁酸结石
- B. 胆固醇结石
- C. 胆盐结石
- D. 胆色素结石

25. 【A1 题型】急性感染性喉炎行气管切开的指征是

- A. 呼吸困难
- B. 三凹征
- C. 喉头水肿
- D. 严重缺氧或有III度以上喉梗阻

26. 【A2 题型】患者男性，55 岁。咳嗽，咳黄黏痰不易咳出 2 天。评估：双肺呼吸音粗，胸片示双肺纹理粗，吸烟史 30 余年。以急性气管-支气管炎收入院。主要的护理问题是清理呼吸道无效

- B. 气体交换受损
- C. 低效性呼吸型态改变
- D. 活动无耐力

27. 【A2 题型】患者男性，40 岁，以突然寒战，高热入院，疑为细菌性肺炎，请问细菌性肺炎最常见的病原体是

- A. 葡萄球菌
- B. 肺炎链球菌
- C. 肺炎杆菌
- D. 肺炎支原体

28. 【A2 题型】患者女性，48 岁，发热，咳嗽伴大量黄脓痰，每日痰量达到 400ml，考虑为 A. 支气管扩张症

- B. 肺炎
- C. 肺结核
- D. 支气管肺癌

29. 【A1 题型】桶状胸主要见于下列哪一种疾病

- A. 维生素 D 缺乏
- B. 肺结核
- C. 肺气肿

D. 脓胸

30. 【A2 题型】患者，男性，70 岁，慢性咳嗽、咳痰 15 年，近两年来劳动时出现气短，近日感冒后病情加重，咳脓痰且不易咳出，查体：36.5℃，神志清，桶状胸，双肺叩诊过清音，呼吸音低，以慢性支气管炎合并慢性阻塞性肺气肿入院治疗，病人应给予的氧疗方式为

A. 酒精湿化给氧

B. 低浓度持续给氧

C. 高压给氧

31. 【A2 题型】患者男性，20 岁，急诊入院，查体：双肺布满哮鸣音、呼气延长，疑似哪种疾病的典型体征

A. 支气管扩张

B. 支气管哮喘

C. 支气管肺炎

D. 慢性支气管炎（喘息型）

32. 【A2 题型】患者男性，25 岁，春季野外踏青中出现发作性呼气性呼吸困难，咳嗽伴喘鸣，临床诊断为外源性哮喘（过敏型），此患者的血清中哪一项免疫球蛋白升高

A. IgA

B. IgD

C. IgE

D. IgG

33. 【A1 题型】慢性肺源性心脏病发生肺性脑病时应避免使用何类药物

A. 抗生素

B. 强心剂

C. 利尿剂

D. 镇静剂

34. 【A1 题型】患者，男性，62 岁，咳嗽 30 年，近日咳大量脓痰，气憋，下肢水肿，下肢水肿应考虑何故

A. 肺心病右心衰竭

B. 低蛋白血症

C. 摄盐过多

D. 下肢静脉血栓

35. 【A2 题型】病人，男性，14 岁。自幼有哮喘史，白天因参加学校组织的游园活动，回家后感到胸闷、呼吸困难逐渐加重，自服氨茶碱不见缓解。到医院急诊拟诊为支气管哮喘病，无改善，应给病人安置的体位是

A. 平卧位

B. 端坐位或半坐位

C. 俯卧位

D. 站立位

36. 【A2 题型】患者男性，81 岁，慢性支气管炎、肺部感染呼吸衰竭入院，下列辅助检查结果对诊断呼吸衰竭价值最大的是

A. 谷丙转氨酶升高

B. 动脉血 $\text{PaO}_2 < 8\text{kPa} (60\text{mmHg})$ ，动脉血 $\text{PaCO}_2 > 6.7\text{kPa} (50\text{mmHg})$

C. 血液 $\text{pH} < 7.35$

D. 血 CO_2 结合力降低

37. 【A2 题型】女, 20 岁。以甲状腺功能亢进症收入院, 原发性甲亢的主要临床表现不包括
- A. 甲状腺包块
 - B. 性情急躁, 容易激动
 - C. 多汗, 怕热
 - D. 食欲亢进, 但消瘦
38. 【A2 题型】患者女性, 高血压病史30年, 糖尿病病史10年, 今晨出现左上肢瘫痪, 口角歪斜, 入院诊断为动脉粥样硬化性血栓性脑梗死, 请问此疾病易发生在夜间休息状态主要原因是
- A. 晚餐过饱或晚餐过少
 - B. 气温较低、睡眠差
 - C. 血压低、血液黏稠
 - D. 低枕平卧
39. 【A1 题型】短暂性脑缺血发作的特点是
- A. 持续时间不超过8 小时
 - B. 持续时间不超过20 小时
 - C. 持续时间不超过24 小时
 - D. 持续时间不超过30 天
40. 【A2 题型】患者男, 65 岁。睡醒后发现一侧偏瘫, 神志清楚, 血压50/95mmHg, 脑脊液正常。该患者最早显示典型T 图像和时间为
- A. 可见脑室扩大
 - B. 起病后即可见低密度影
 - C. 起病 24~48h 后见低密度影
 - D. 起病后即可见高密度影
41. 【A1 题型】关于女性各阶段生理特点的描述, 不正确的是
- A. 出生 4 周内称新生儿期
 - B. 幼女期卵泡不成熟不排卵
 - C. 青春期女性第二性征出现
 - D. 围绝经期始于40 岁, 历时10 年
42. 【A2 题型】女 30 岁, 习惯性流产, B 超提示子宫小, 正常育龄女性子宫大小和容积正确的是
- A. 7cm×5cm×2cm ; 3ml
 - B. 8cm×5cm×3cm ; 5ml
 - C. 9cm×6cm×2cm ; 5ml
 - D. 10cm×5cm×2cm ; 7ml
43. 【A2 题型】女 25 岁, 第一胎孕19 周自觉胎动, 有关胎动错误的是
- A. 羊水过多者胎动明显
 - B. 正常胎动每小时为3~5 次
 - C. 首次胎动多在妊 18~20 周时
 - D. 腹壁薄而松弛的孕妇可在腹壁看到胎动
44. 【A2 题型】女 33 岁, 新婚后闭经, 出现早孕反应, 尿妊试验阳性, 关于早孕反应错误的是
- A. 约在停经6 周才有
 - B. 每个妊 妇女均会出现
 - C. 以恶心、呕吐、偏食等现象为主

- D. 约于妊 12 周消失
45. 【A2 题型】女 27 岁，第一胎 39 周临产，关于胎先露指示点，错误的是哪一项
- A. 枕先露——枕骨
 - B. 面先露——颞骨
 - C. 臀先露——骶骨
 - D. 臀先露——尾骨
46. 【A2 题型】女 27 岁，第一胎 38 周阴道分娩，关于软产道的组成错误的是
- A. 子宫体
 - B. 子宫下段
 - C. 子宫颈
 - D. 阴道
47. 【A2 题型】女 25 岁，第一胎 38 周，胎头的最大径线是
- A. 枕下前凶径
 - B. 枕额径
 - C. 枕颈径
 - D. 双顶径
48. 【A2 题型】女 26 岁，第一胎 37 周临产，标志是
- A. 有规律而逐渐增强的宫缩，宫颈管消失，宫颈扩张，胎先露下降
 - B. 无宫缩，有少量阴道流血，宫颈管消失，宫颈扩张，胎先露下降
 - C. 不规则宫缩，有少量阴道流血，宫颈管消失，宫颈扩张，胎先露下降
 - D. 不规则宫缩，宫颈管消失，宫颈扩张，胎先露下降
49. 【A2 题型】女 31 岁，第一胎 37 周，常规产科检查，胎儿双顶径进入骨盆入口平面被称
- A. 内旋转
 - B. 外旋转
 - C. 下降
 - D. 衔接
50. 【A2 题型】女 28 岁，第一胎 40 周阴道分娩，胎儿娩出后，新生儿 Apgar 评分，评分依据错误的是
- A. 心率
 - B. 呼吸
 - C. 体温
 - D. 皮肤颜色
51. 【A2 题型】女 25 岁，第一胎 37 周临产，正常分娩机制中俯屈是胎头遇到阻力以枕颈径为
- A. 双顶径
 - B. 枕颈径
 - C. 枕下前凶径
 - D. 双肩径
52. 【A2 题型】患者，女性，28 岁，孕 39⁺⁶ 周。晨 6 时自觉阴道流出大量稀水样液体，遂于当日上午 10 时入院，正确的护理措施是
- A. 以轮椅送入病房
 - B. 陪病人步行去病房
 - C. 患者取头低脚高位，以平车送往病房

- D. 患者取头高脚低位，以平车送往病房
53. 【A1 题型】临产后最主要的产力是
- A. 子宫收缩力
 - B. 腹肌收缩力
 - C. 膈肌收缩力
 - D. 肛提肌收缩力
54. 【A2 题型】女 33 岁，第一胎 40 周，阴道分娩，产褥期子宫颈恢复非孕状态的时间是
- A. 1 周
 - B. 2 周
 - C. 3 周
 - D. 4 周
55. 【A2 题型】女 31 岁，第一胎 40 周，阴道分娩，产后子宫复旧的正常表现是
- A. 产后第 3 天宫底平脐
 - B. 产后 1 个月子宫恢复正常大小
 - C. 产后 14 天为红色恶露
 - D. 产后宫底每天下降 1~2cm
56. 【A2 题型】女 26 岁，第一胎 40 周，阴道分娩，对于产妇恶露的观察，错误的是
- A. 血性恶露持续约 14 日
 - B. 持续 4~6 周
 - C. 总量约为 500ml
 - D. 有血腥味，但无臭味
57. 【A2 题型】女 25 岁，第一胎 36 周，诊断为胎膜早破，检查胎先露尚未衔接，孕妇抬高臀部的目的是
- A. 避免引发宫缩
 - B. 有利于观察胎心
 - C. 减少羊水流出
 - D. 预防脐带脱垂
58. 【A1 题型】羊水过少是指羊水少于
- A. 300ml
 - B. 500ml
 - C. 1000ml
 - D. 1500ml
59. 【A2 题型】30 岁女，第一胎 38 周，因反复的无痛性阴道出血，诊断为前置胎盘，分娩发生大出血，其原因是
- A. 凝血功能的障碍
 - B. 产后子宫下段收缩力差
 - C. 胎盘残留
 - D. 子宫胎盘卒中
60. 【A2 题型】22 岁女，第一胎 30 周，重度子痫前期，突然发生的腹部持续性疼痛，阴道血，最可能是
- A. 重型胎盘早剥
 - B. 边缘性前置胎盘
 - C. 中央性前置胎盘
 - D. 子宫颈癌

61. 【A1 题型】慢性肾小球肾炎的发病主要机制为
- A. 先天性免疫功能缺陷
 - B. 急性肾炎发展所致
 - C. 细菌所致化脓性炎症
 - D. 免疫介导炎症
62. 【A2 题型】男性,58岁,患慢性肾小球肾炎10年,近2天尿少,血压190/108mmHg,血钾6.3mmol/L。该患者应饮用
- A. 鲜橘汁
 - B. 红枣汤
 - C. 葡萄糖液
 - D. 牛肉末汤
63. 【A2 题型】患者男,21岁。发热、咽痛2周,颜面水肿2天。经检查诊断为慢性肾小球肾炎,除水肿外,慢性肾小球肾炎必有的临床表现是
- A. 贫血
 - B. 血尿
 - C. 高血压
 - D. 尿蛋白
64. 【A2 题型】患者男性,肾病综合征病史1年,请问肾病综合征最常见的临床症状是
- A. 水肿
 - B. 高血压
 - C. 乏力、头晕
 - D. 低蛋白血症
65. 【A2 题型】患者男性,29岁,一个月前出现全身浮肿,伴倦怠,门诊入院进一步检查,诊断为肾病综合征,下列不属于肾病综合征常见并发症的是
- A. 感染
 - B. 血栓
 - C. 栓塞
 - D. 糖耐量异常
66. 【A1 题型】肾病综合征大量蛋白尿是指每天尿蛋白定量大于
- A. 3.0g
 - B. 3.5g
 - C. 4.0g
 - D. 4.5g
67. 【A2 题型】患者女性,25岁,患有肾病综合征,出现大量蛋白尿,低蛋白血症,肾病综合征低蛋白血症是指血浆白蛋白低于
- A. 0g/L
 - B. 20g/L
 - C. 30g/L
 - D. 35g/L
68. 【A2 题型】患者女性,45岁,出现不明原因的蛋白尿++,全身明显水肿,低蛋白血症和血脂显著升高,入院治疗,查体BUN正常,请问原发性肾病综合征无肾功能减退者饮食要求为
- A. 高热量、优质正常量蛋白质、低盐
 - B. 高热量、优质高蛋白质、低盐

- C.高热量、优质低蛋白饮食、低盐
D.低热量、优质正常量蛋白质、低盐
- 69.【A1 题型】慢性肾衰竭患者酸碱平衡紊乱常表现为
- A.代谢性酸中毒
B.代谢性碱中毒
C.呼吸性酸中毒
D.呼吸性酸中毒合并代谢性碱中毒
- 70.【A2 题型】患者男,57 岁。急性肾功能衰竭少尿期,出现呼吸困难、头痛、软瘫、腹胀,心电图示T 波高尖、QRS 间期延长。应考虑
- A.低钾血症
B.高钾血症
C.水中毒
D.尿毒症
- 71.【A1 题型】诊断缺铁性贫血需做的检查没有
- A.血象
B.网织红细胞计数
C.骨髓象
D.大小便常规
- 72.【A2 题型】患儿,2 岁。诊断为营养性缺铁性贫血,需口服铁剂治疗。护士对患儿家长进行服用铁剂指导时,其中不正确的是
- A.注意观察药物的不良反应
B.饭后或餐中服用
C.可与牛奶同时服用,利于铁剂吸收
可用吸管服药,以减轻牙齿染黑
- 73.【A2 题型】患者,男性,发热,体温38.5℃,全身有小出血点,头晕、乏力,经医院查血红蛋白 80g/L,红细胞 $3 \times 10^{12}/L$,白细胞 $3 \times 10^9/L$,血小板 $70 \times 10^9/L$,确诊为再生障碍性贫血。其发热的主要原因是
- A.营养不良
B.缺乏成熟中性粒细胞
C.缺氧
D.出血
- 74.【A1 题型】鉴别再生障碍性贫血与急性粒细胞性白血病,最主要的检查是
- A.血小板计数
B.外周血有幼红细胞
C.外周血有幼粒细胞
D.骨髓检查
- 75.【A2 题型】患者男性,18 岁,因腹泻自服氯霉素数日,几周后刷牙时牙龈出血,继后鼻出血,并发高热。1 周后去医院检查,全血细胞减少,经骨髓穿刺证实为急性再生障碍性贫血。该患者护理评估的基础上,可列出的护理诊断不包括
- A.气体交换受阻
B.体温过高
C.有感染的危险
D.活动无耐力
- 76.【A1 题型】血小板破坏过多引起的出血性疾病是

- A. 白血病
 - B. 原发性血小板减少性紫癜
 - C. 血小板无力症
 - D. 再生障碍性贫血
77. 【A2 题型】患者女性,40 岁。患支气管扩张10 年。近日出现大量黄脓痰,每天650ml,关于支气管扩张症病人的体位引流,下列哪项不妥
- A. 依病变部位确定引流体位
 - B. 引流时间 15~20 分钟
 - C. 引流过程辅以胸部叩击
 - D. 引流只能在餐后进行
78. 【A2 题型】患者女,39 岁。患支气管扩张11 年。目前主要症状为咳嗽,咳脓性痰,量 50ml/d。患者痰液的特点应该是
- A. 粉红色
 - B. 果酱样
 - C. 铁锈色
 - D. 大量脓痰,久置分3 层
79. 【A2 题型】患者男性,70 岁。有 COPD 病史 23 年。近日出现咳嗽加重,伴有喘息,请慢性阻塞性肺气肿患者最突出的护理诊断是
- A. 体温升高
 - B. 焦虑
 - C. 气体交换受损
 - D. 清理呼吸道无效
80. 【A2 题型】风湿性心脏病心房颤动病人突然抽搐、偏瘫首先考虑
- A. 心力衰竭加重
 - B. 洋地黄中毒
 - C. 低钾血症
 - D. 脑栓塞
81. 【A1 题型】取半坐卧位,床头支架的角度应呈
- A. $10^{\circ}\sim 20^{\circ}$
 - B. $30^{\circ}\sim 50^{\circ}$
 - C. $30^{\circ}\sim 40^{\circ}$
 - D. $40^{\circ}\sim 50^{\circ}$
82. 【A1 题型】孕妇,产前检查胎儿臀位,为矫正胎位,护士指导其选用的是
- A. 头低脚高位
 - B. 截石位
 - C. 侧卧位
 - D. 膝胸卧位
83. 【A2 题型】患者男性,20 岁,在骑车途中与一汽车相撞,发生胫骨骨折,行胫骨结节牵引应采用的卧位是
- A. 头低足高位
 - B. 头高足低位
 - C. 俯卧位
 - D. 半坐卧位
84. 【A1 题型】过氧乙酸不宜用于

- A. 手的消毒
 - B. 空气消毒
 - C. 浸泡金属器械
 - D. 擦拭家具
85. 【A1 题型】禁用高压蒸汽灭菌的物品是
- A. 橡胶类
 - B. 棉织品
 - C. 搪瓷类
 - D. 化纤织物
86. 【A2 题型】患者男性,55 岁,肝硬化并发急性腹膜炎,呼吸深快,面色潮红,护士严格按照无菌技术给予患者液体输入。下列哪项符合无菌技术操作原则
- A. 手持无菌镊的1 / 2 处
 - B. 持无菌容器时手指触及容器边缘
 - C. 将无菌敷料伸进无菌溶液瓶内蘸取溶液
 - D. 将无菌盘的盖巾扇形折叠时,开口边向外
87. 【A2 题型】患者,男性,28 岁,在旅游途中,因为甲型肝炎住院,患者欲写信通知家人其信件的消毒方法是
- A. 喷雾法
 - B. 熏蒸法
 - C. 高压蒸气灭菌法
 - D. 擦拭法
88. 【A2 题型】患者男性,64 岁,输入药液后突发寒战,1 小时后患者寒战消失,颜面发红、皮肤干燥,患者处于高热持续期,该期的特点是
- A. 产热大于散热
 - B. 产热持续增加
 - C. 散热增加而产热趋于正常
 - D. 产热和散热在较高水平上趋于平衡
89. 【A2 题型】患者男性,57 岁,因发现皮下包块就诊。护士接诊时发现患者存在头虱,给遂予灭头虱操作中,以下正确的是
- A. 穿隔离衣,戴手套
 - B. 女患者应动员剃去头发
 - C. 灭虱液擦遍头发,用手反复揉搓头发 分钟
 - D. 12 小时后取下包裹头发的帽子
90. 【A2 题型】患者男性,71 岁,因股骨头骨折长期卧床,护士欲为患者进行床上擦浴。上床擦浴的室温应调至
- A. 10~14℃
 - B. 14~18℃
 - C. 18~22℃
 - D. 24℃以上
91. 【A1 题型】关于体温生理性变化的因素,以下说法正确的是
- A. 儿童体温可略低于成人
 - B. 一般清晨 4~8 时体温最低
 - C. 体温昼夜变化约 1~1.5℃
 - D. 新生儿体温易受环境影响

92. 【A2 题型】患者男性,19 岁,因反复发烧给予冰毯物理降温。该降温方法要求测量直肠温度时,将肛表插入肛门的深度应为
- A. 1~2cm
 - B. 3~4cm
 - C. 5~6cm
 - D. 7~8cm
93. 【A2 题型】患者女性,36 岁,因甲亢入院治疗,患者消瘦、易怒、心率100 次/分,欲行吸碘试验,该患者的饮食需要禁食含碘量高的食物多少天
- A. 3~5 天
 - B. 6~10 天
 - C. 7~60 天
 - D. 10~30 天
94. 【A2 题型】患者男性,25 岁,患有慢性肾小球肾炎,给予患者低盐饮食,该患者每日摄食盐量应少于
- A. 1 克
 - B. 2 克
 - C. 3 克
 - D. 4 克
95. 【A2 题型】患者,心脏病,高血压,伴严重水肿,患者的饮食错误的是
- A. 可多食汽水、可乐饮料
 - B. 控制摄入食物中自然存在的钠盐0.5g/d
 - C. 每天胆固醇摄入量不超过300mg
 - D. 食物清淡,少油,禁蛋黄、肥肉等
96. 【A2 题型】患者男性,57 岁,食管癌术后第4 天,目前患者采用鼻饲饮食,针对该患者应每天进行
- A. 口腔护理
 - B. 更换鼻饲管
 - C. 检查血糖
 - D. 少饮水
97. 【A2 题型】患者男性,36 岁,诊断为腹股沟斜疝,行疝修补术后,患者术后一周出现便秘应鼓励患者多食
- A. 肉类
 - B. 牛奶
 - C. 鱼汤
 - D. 蔬菜
98. 【A2 题型】患者男性,45 岁,因心率慢、晕厥入院,入院后给予该患者医院基本饮食,本饮食不包括
- A. 普通饮食
 - B. 软质饮食
 - C. 半流质饮食
 - D. 少渣饮食
99. 【A1 题型】炎症早期采用热疗的主要目的是
- A. 降低细菌活力
 - B. 解除肌肉痉挛

C.促进肌肉、肌腱和韧带等软组织松弛

促进炎症渗出物的吸收

100.【A2 题型】病人何某，男性，33岁，因高热行乙醇拭浴，置冰袋于头部是为了

A.防止脑水肿

B.防止头部充血

C.防止心律失常

D.提高脑组织对缺氧的耐受性

101.【A2 题型】患者，男，18岁，篮球比赛时不慎踝部扭伤，应立即给予

A.局部按摩

B.红外线照射

C.红花油涂擦

D.局部冷湿敷

102.【A2 题型】患者男性，60岁，肺癌化疗患者，患者化疗期间出现体温升高，每日最高达

38.7℃，给予患者冰袋物理降温，患者在使用冰袋时出现了皮肤冻伤，以下不属于冻伤期的

症状是

A.皮肤呈青紫色

B.皮肤呈苍白色

C.麻木感

D.皮肤呈潮红色

103.【A1 题型】下列可实行灌肠的是

A.妊

B.急腹症

C.心力衰竭

D.高热病人

104.【A1 题型】下列关于粪便性状异常的描述错误的是

A.肠套叠患者粪便可呈果酱样便

B.下消化道出血时粪便呈暗红色

C.上消化道出血时粪便呈酱油色

D.完全性胆道阻塞时粪便呈陶土色

105.【A1 题型】消化系统常见症状的护理措施下列哪一项正确

A.腹泻时给予高蛋白饮食

B.腹胀时肛管排气

C.便秘时多吃油脂类食物

D.排便失禁者限制饮水

106.【A2 题型】患者，男性，68岁，拟于今日行根治性前列腺切除术，术前护理给予留置

导尿。护士在为患者插导尿管时遇到阻力，下列哪项措施是正确的

A.做好患者的心理护理

B.快速用力插入

C.稍等片刻，嘱患者深呼吸

D.放平阴茎，使耻骨前弯消失

107.【A1 题型】超声雾化吸入法的特点是

A.应用超声波电能，将药液变成气雾

B.雾滴小而均匀，可达终末支气管和肺泡

晶体换能器产生高频电能

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/916113145024010234>