

# 2024 年主治医师之消化内科主治 306 真题精选附答案

单选题（共 45 题）

1、轻度慢性肝炎

- A. G1~2S0~2
- B. G3S2~3
- C. G4S3~4
- D. C(分级)0~1S(分期)0~1
- E. G2S1~3

【答案】 A

2、男性，43 岁。因发热、腹部膨隆及大便里急后重感，2 周入院。体检：腹部膨隆，无腹壁静脉曲张，全腹柔韧感，有轻度压痛及反跳痛，腹水检查为血性渗出液，病理细胞未找到，粪检红细胞 5~8/HP，白细胞 2~4/HP。为明确诊断，应首选下列哪项检查

- A. 胃肠钡剂检查
- B. 钡剂灌肠
- C. 直肠指检
- D. 粪便细菌培养
- E. 癌胚抗原(CEA)测定

【答案】 C

3、关于消化性溃疡的治疗，正确的说法是

- A. 为降低复发率，需长期服用质子泵抑制剂
- B. 根除幽门螺杆菌可以降低溃疡复发

- C. 有消化道出血的溃疡患者必须长期维持治疗
- D. 需长期应用黏膜保护剂以降低溃疡的复发率
- E. 只要内镜证实溃疡已经愈合，溃疡就不会复发

【答案】 B

4、以下哪项对鉴别感染性心内膜炎和活动风湿最有帮助

- A. 进行性贫血
- B. 体温的高度
- C. 血沉增快的程度
- D. 皮肤黏膜瘀点和脾大
- E. 白细胞数量

【答案】 D

5、下列不是生命神圣论的局限性的是

- A. 有阶级性
- B. 有历史性
- C. 只偏重于人口的数量
- D. 不能把人的自然素质同生命存在的价值相统一
- E. 影响卫生资源的分配

【答案】 A

6、结核菌素试验的描述正确的是

- A. 部分高危结核患儿可呈阴性反应
- B. 结果阴性可排除结核病

- C. 婴幼儿、尤其是未接种 BCG 者结核菌素试验阳性不提示体内有活动性结核病
- D. BCG 接种后结核菌素试验反应为强阳性
- E. 阳性结果代表患有结核病

【答案】 A

7、男性患者，20 岁，四肢无力 4 天，无尿便障碍，无发热。查体：四肢肌力 III 级，四肢远端痛觉减退，腱反射消失，无病理反射，腰穿正常。这种疾病在起病前常有

- A. 药物中毒史
- B. 劳累和饮酒史
- C. 腹泻和上呼吸道感染史
- D. 外伤史
- E. 过敏史

【答案】 C

8、患者，男性，60 岁，主因乏力、食欲不振，伴右上腹隐痛半年余就诊。既往有长期饮酒史。查体 T36.5℃，巩膜黄染，心肺未见异常，腹平软，肝肿大，于肋下三指，质中等硬度、有触痛，余未见异常，血 AST120U / L，ALT50U / L，肝超声回报肝脏脂肪变性。

- A. HDL 升高
- B. AST 升高比 ALT 升高明显
- C. AST 和 ALT 轻度升高
- D. A/G 比值倒置
- E. AST 和 ALT 明显升高

【答案】 C

9、肠结核最常见的并发症是

- A. 肠痿
- B. 肠出血
- C. 肠梗阻
- D. 腹腔脓肿
- E. 中毒性结肠扩张

【答案】 C

10、男性，45岁，右上腹持续性隐痛，发热2周，腹胀4天。15年前被诊断为乙型病毒性肝炎，近3年出现食欲减退、乏力、面色晦暗，间有齿龈出血。查：T38℃，P120次/min，BP100/70mmHg，心肺正常，腹膨隆，全腹压痛，肝肋下未及，脾肋下3cm，移动性浊音阳性。

- A. 肝肾综合征
- B. 肝硬化腹水合并自发性腹膜炎
- C. 缩窄性心包炎
- D. 结核性腹膜炎
- E. 肝硬化腹水

【答案】 B

11、结核性腹膜炎腹水常见

- A. 漏出液
- B. 乳糜液
- C. 血性液
- D. ADA 活性升高
- E. 腹水胆固醇升高

【答案】 D

12、患者，女，20岁。月经血多、皮肤紫癜3个月。Hb100g/L，WBC $5.5\times 10^9$ /L，血小板 $25\times 10^9$ /L，骨髓有核细胞增生活跃，粒、红两系比例及分布正常，巨核细胞75个，其中颗粒型0.70，裸核0.30，未见产板型巨核细胞。该患者最可能的诊断是

- A. 急性特发性血小板减少性紫癜
- B. 慢性特发性血小板减少性紫癜
- C. 血栓性血小板减少性紫癜
- D. 弥散性血管内凝血
- E. 过敏性紫癜

【答案】 D

13、女性，48岁，反复发生尿急、尿频、尿痛伴腰痛与低热10余年。曾查尿蛋白(++)，近1年来出现无力，纳差、清晨恶心，偶尔呕吐。近日症状再现。尿蛋白(+)，尿沉渣镜检白细胞20~30/HP、红细胞偶见。血尿素氮13.6mmol/L，血肌酐353.6mmol/L，血红蛋白90g/L。

- A. 急性肾盂肾炎
- B. 慢性肾盂肾炎
- C. 慢性肾炎合并肾盂肾炎
- D. 慢性肾盂肾炎急性发作
- E. 慢性肾炎合并下尿路感染

【答案】 D

14、女性，60岁。糖尿病10年，高血压5年，近3个月双上下肢相继出现麻木和无力，以手和足为重，查体：四肢远端无力，双肘下和双膝下痛觉、触觉均减退，四肢腱反射未引出，最可能的诊断是

- A. 急性炎症性脱髓鞘性多发性神经病
- B. 多发性神经炎
- C. 运动神经元病
- D. 脊髓亚急性联合变性
- E. 多发性肌炎

【答案】 B

15、关于肾病综合征的诊断标准，不正确的是

- A. 血浆白蛋白低于 30g / L
- B. 可分为原发性及继发性
- C. 血脂降低
- D. 水肿
- E. 尿蛋白大于 3.5g / d

【答案】 C

16、男性，20 岁，因重度哮喘发作住院治疗缓解，出院后推荐其长期使用的药物是

- A. 抗生素
- B. 泼尼松
- C. 开瑞坦
- D. 吸入激素
- E.  $\beta$

【答案】 D

17、急性下壁心肌梗死时发生的心律失常最多见是

- A. 束支传导阻滞
- B. 室性心律失常
- C. 房室交界处早搏
- D. 房室传导阻滞
- E. 房性心律失常

【答案】 D

18、肠易激综合征的警戒症状不包括( )

- A. 夜间症状
- B. 体重下降
- C. 便潜血阳性
- D. 白天症状重
- E. 贫血

【答案】 D

19、男性，20 岁。查体：左上肢血压 133/78mmHg，右上肢血压测不出，该患者可能是

- A. 心肌梗死
- B. 心力衰竭
- C. 多发性大动脉炎
- D. 严重休克
- E. 缩窄性心包炎

【答案】 C

20、患者，男，45岁。上腹疼痛2个月，伴反酸，纳差。胃镜示胃体大弯0.5cm×0.5cm扁平隆起，表面充血。尿素酶试验(+)。病理：粘膜慢性炎，伴重度非典型增生。患者父亲死于胃癌。患者行手术治疗，术后还须采取的治疗措施是

- A. 奥美拉唑+阿莫西林+克拉霉素，1周
- B. 奥美拉唑维持半年
- C. 奥美拉唑+铝碳酸镁，4周
- D. 奥美拉唑+铝碳酸镁+阿莫西林，2周
- E. 铝碳酸镁8周

【答案】 A

21、女性，28岁。腹痛、低热消瘦、腹泻3年，近1个月加重。右下腹痛较明显，有时可出现上腹及脐周痛，自觉进餐后可诱发腹痛及便意。查体：右下腹5cm×5cm肿块，质中等，较固定，轻压痛。

- A. 血沉
- B. 血常规
- C. 肠镜检查
- D. X线钡透
- E. 诊断性腹腔穿刺

【答案】 C

22、老年男性患者，既往有痔疮病史，近日来自觉头晕乏力，查体配合，贫血貌，有反甲，巩膜无黄染，浅表淋巴结无肿大，心率102次/分，肝脾肋下未触及。血常规Hb79g/L，RBC $2.82 \times 10^{12}/L$ ，MCV78fl，WBC $5.0 \times 10^9/L$ ，血小板 $220 \times 10^9/L$ ，首先考虑

- A. 缺铁性贫血

- B. 再生障碍性贫血
- C. 海洋性贫血
- D. 巨幼细胞贫血
- E. 溶血性贫血

【答案】 A

23、患者，男，62岁。间断便血2个月，暗红色，排便次数增多，每日3~4次，伴下腹痛，消瘦。查体：腹部平坦，柔软，左下腹轻压痛。为明确出血病因，应首选的检查是

- A. 腹部CT
- B. 核素显像
- C. 结肠镜
- D. 钡餐消化道造影
- E. 选择性血管造影

【答案】 C

24、男性，38岁。有心前区痛2年。体检：血压13.3/10.64kPa(100/80mmHg)，胸骨右缘第二肋间闻及粗糙的3/6级收缩期杂音，向颈部传导，第二心音减弱，胸片见升主动脉扩张，左室增大，最可能诊断是( )

- A. 室间隔缺损
- B. 主动脉瓣狭窄
- C. 肺动脉瓣狭窄
- D. 三尖瓣关闭不全
- E. 特发性肥厚性主动脉瓣狭窄

【答案】 B

25、患者，女性，20 岁。新诊断为 Graves 病，服 PTU 治疗 1 个月后出现白细胞减少，其停药指征是

- A. WBC < 4000/mm<sup>3</sup>，中性粒细胞 < 1500/mm<sup>3</sup>
- B. WBC < 3000/mm<sup>3</sup>，中性粒细胞 < 1500/mm<sup>3</sup>
- C. WBC < 2000/mm<sup>3</sup>，中性粒细胞 < 1000/mm<sup>3</sup>
- D. WBC < 3500/mm<sup>3</sup>，中性粒细胞 < 1000/mm<sup>3</sup>
- E. WBC < 2500/mm<sup>3</sup>，中性粒细胞 < 1500/mm<sup>3</sup>

【答案】 B

26、正常食管内的 pH 是

- A. 6.5～8.0
- B. 5.5～7.0
- C. 4.5～6.0
- D. 3.5～5.0
- E. 2.5～4.0

【答案】 B

27、女性，48 岁，双腕肿痛 1 个月，伴晨僵大于 5 小时，发热半个月。

- A. 系统性红斑狼疮
- B. 骨关节炎
- C. 类风湿关节炎
- D. 痛风
- E. 风湿性关节炎

【答案】 C

28、溃疡性结肠炎的好发部位是

- A. 回肠
- B. 十二指肠降段
- C. 回盲部
- D. 直肠和结肠
- E. 小肠

【答案】 D

29、血气  $\text{PaCO}_2$

- A. 弥散功能障碍
- B. 肺泡通气/血流比例失衡
- C. 动静脉分流
- D. 肺泡通气量下降
- E. 氧耗量增加

【答案】 D

30、女性，30 岁。3 周前患上呼吸道感染痊愈，4 天前出现双小腿无力伴刺痛感，且逐渐加重。查体：双下肢肌力 3 级，膝反射减弱，双小腿皮肤对称性感觉减退，两侧腓肠肌压痛阳性。最可能的诊断是

- A. 抗生素
- B. 抗病毒药物
- C. 皮质类固醇
- D. 血浆置换

E. 抗凝治疗

【答案】 D

31、口干

A. 硫糖铝

B. 阿托品

C. 法莫替丁

D. 枸橼酸铋钾

E. 米索前列醇引起下述副作用最常见的药物分别是

【答案】 B

32、胃癌最常见的症状是

A. 上腹痛

B. 发热

C. 食欲不振

D. 消瘦

E. 恶心、呕吐

【答案】 A

33、男，40岁。恶心、呕吐、尿色变深2天。既往无肝炎病史。查体：巩膜黄染，肝肋下2cm。实验室检查：ALT800U/l，TBil60 $\mu$ mol/l，抗HAVIgM（-）。HBsAg（+），抗HBs（-），抗HBcIgM（+）。该患者最可能的诊断是

A. 急性甲型肝炎

B. 急性乙型肝炎

C. 乙型肝炎恢复期

D. 甲型肝炎恢复期

E. 急性肝炎，HBsAg 携带者

【答案】 B

34、男，55 岁，既往体健，近 6 个月来有进行性厌食，消瘦乏力，伴上腹部不适。近 2 个月来上述症状逐日加重。检查：Hb80g/L，尿常规正常，SGPT30U，血清白蛋白 30g / L，球蛋白 20g/L，BSP 潴留试验：45min<5%，大便隐血试验(+++)

A. MRI

B. B 型超声

C. 胃镜+活检

D. X 线钡剂

E. CT 扫描

【答案】 C

35、女性，56 岁，胸痛伴反酸烧心，胃镜示食管下段黏膜糜烂，齿状线呈岛状上移，黏膜呈橘红色，活检可见肠上皮化生

A. 反流性食管炎

B. 食管裂孔疝

C. 非糜烂性胃食管反流病

D. Barrett 食管

E. 咽易感症

【答案】 D

36、右下肺不张

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/917015166006010010>