

2024 年福建省荔城区《执业药师之西药学综合知识与技能》考试完整题库 A4 版可打印

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 服用胃动力药多潘立酮治疗消化不良，最佳用药时间是

- A: 餐后 1h
- B: 餐后
- C: 餐前
- D: 餐前 0.5~1h

答案：D

2. 患者，男，70 岁，良性前列腺增生症病史 5 年，应用 α_1 肾上腺素能受体阻断剂特拉唑嗪治疗，可能导致的不良反应是

- A: 体位性低血压
- B: 干咳
- C: 乳腺增生
- D: 尿潴留

答案：A

3. 引起急性细菌性扁桃体炎最常见的致病菌是

- A: 大肠埃希菌
- B: 金黄色葡萄球菌
- C: A 组 β 溶血性链球菌（化脓性链球菌）
- D: 肺炎链球菌

答案：C

4. 题]可影响幼儿软骨发育，导致承重关节损伤的药物是

- A: 诺氟沙星
- B: 头孢唑林
- C: 阿米卡星
- D: 米诺环素

答案：A

5. 喝茶可降低多价金属离子、生物碱、苷类、胃蛋白酶、四环素类等药物的疗效，其机制主要是它们结合茶中的

- A: 鞣酸
- B: 蛋白质
- C: 茶碱
- D: 咖啡因

答案：A

6. 在人体血中白细胞群体中，中性粒细胞（DC）的正常比例范围是

- A: 0.50~0.70
- B: 0.01-0.05
- C: 0.20~0.40
- D: 0.03-0.08

答案：A

7. 为有助食物消化，应餐前服用的是

- A: 多潘立酮
- B: 普伐他汀
- C: 维生素 C
- D: 二甲双胍

答案：A

8. 肝肾两种途径清除的药物在严重肝功能减退时血药浓度升高

- A: 尽可能避免使用
- B: 一般无须调整剂量
- C: 须谨慎使用，必要时减量给药
- D: 必须减量应用

答案：D

9. 下列白细胞计数中，成人静脉血的正常参考值为

- A: $(15.0 \sim 20.0) \times 10^9/L$
- B: $(4.3 \sim 10.0) \times 10^9/L$
- C: $(4.0 \sim 10.0) \times 10^9/L$
- D: $(3.5 \sim 10.0) \times 10^9/L$

答案：D

10. 氯霉素（在肝脏与葡萄糖醛酸结合后排泄）半衰期成人为 4 小时，新生儿则为 25 小时，即

- A: 药物吸收
- B: 药物代谢
- C: 药物分布
- D: 药物中毒

答案：B

11. 与两性霉素 B 配伍可以析出沉淀的溶媒是

- A: 50%葡萄糖注射液
- B: 复方氯化钠注射液
- C: 5%葡萄糖注射液
- D: 0.9%氯化钠注射液

答案：D

12. 从事药学服务的药师应具备沟通能力，此项要求的重要性不包括

- A: 可杜绝投诉事件
- B: 可提高患者用药的依从性和满意度
- C: 是药师实施药学服务的基本技能
- D: 可使患者获得有关的用药指导

答案：A

13. 患者男性，35 岁，髋关节置换术后 7 天，患者右侧下肢肿胀、疼痛，抬高患肢后可好转。

- A: 布洛芬
- B: 抗菌药物
- C: 阿司匹林
- D: 糖皮质激素

答案：D

14. 患者，女，69 岁，体型偏胖，BMI30.1kg / m²，患者诉平卧时常有反酸、烧心、胸痛，偶感背痛半年，近 1 周出现夜间咳嗽、咽部有异物感。自用止咳糖浆无效。查体：咽红，声音嘶哑；双肺听诊未闻及干、湿性啰音，偶有哮鸣音。既往史：高血压病史 12 年，服用氨氯地平片 5mgqd，平素血压可控制在 140 / 85mmHg 左右；高脂血症病史 10 年，服用阿托伐他汀钙片 20mgqd。

- A: 单硝酸异山梨酯缓释片
- B: 奥美拉唑肠溶胶囊
- C: 多潘立酮片
- D: 布地奈德干粉吸入剂

答案：B

15. 随机对照临床试验结果属于循证医学证据级别的

- A: 2 级证据
- B: 4 级证据
- C: 1 级证据
- D: 3 级证据

答案: C

16. 对乙酰氨基酚过量的特殊解毒剂

- A: 乙酰半胱氨酸
- B: 二巯丁二钠
- C: 纳洛酮
- D: 谷胱甘肽

答案: A

17. 根除幽门螺杆菌治疗的首选抗菌药是

- A: 左氧氟沙星
- B: 呋喃唑酮
- C: 阿莫西林
- D: 四环素

答案: C

18. 贫血患者常出现

- A: 中性粒细胞增多
- B: 血红蛋白减少
- C: 血小板计数增高
- D: 嗜酸性粒细胞增多

答案: B

19. 患者,男,34岁,既往有胃溃疡病史现因反复关节疼痛、肿大就诊,诊断为骨关节炎,应选用的药物是()

- A: 吲哚美辛
- B: 萘普生
- C: 塞来昔布
- D: 布洛芬

答案: C

20. 患者女,53岁,上腹痛、腹泻、消瘦1年。大便常规有大量脂肪球, X线腹平片显示上腹中部多发钙化点。对其宜选用的药品是

- A: 乳酶生
- B: 硫糖铝
- C: 酵母
- D: 胰酶

答案: D

21. (2019年真题)下列分析方法中,不属于药物经济学评价方法的是

- A: 成本-效用分析法
- B: 最小成本分析法
- C: 成本-效应分析法
- D: 成本-效益分析法

答案: C

22. 氯噻嗪减弱甲苯磺丁脲的降糖作用的机制是

- A: 拮抗作用
- B: 敏感化作用
- C: 减少不良反应

D: 协同作用

答案：A

23. 患儿，男，5 个月，体重 9.0kg，平素健康，近日出现多汗、夜哭、易惊。体检：前囟平软，颅骨有“乒乓球”感，枕秃，肋骨串珠。人工喂养，尚未添加任何辅食，平素较少出门。

A: 维生素 D3 中毒，无需停服奶制品

B: 可整天户外活动

C: 直接接受阳光照射

D: 婴幼儿满 6 个月后，将户外活动时间逐渐增加至每天 1-2 小时

答案：D

24. 开具新药或增加药物前需考虑患者的总体情况和药物相互作用，是倡导开处方环节的

A: 修订医嘱及时沟通

B: 医嘱完整不漏项

C: 实现个体化治疗

D: 医嘱清楚准确

答案：C

25. 胃食管反流病的患者应避免使用的药物是

A: 特拉唑嗪

B: 阿司匹林

C: 美托洛尔

D: 阿仑膦酸钠

答案：D

26. 二级信息源的优点叙述，最正确的是

- A: 有的还能提供疾病与药物治疗的基本知识
- B: 读者能自己评价信息，免受他人观点影响
- C: 对一个具体问题提供的信息全面、详实
- D: 可提供丰富的信息

答案：D

27. 抗高血压药物属于利尿剂的是（）

- A: 依那普利
- B: 缬沙坦
- C: 氢氯地平
- D: 氢氯噻嗪

答案：D

28. 下列药物信息源中，国家食品药品监督管理局网站是

- A: <http://www.nstl.gov.cn>
- B: <http://www.cmt.com.cn>
- C: gov.cn
- D: <http://www.CFD>

答案：D

29. 可引起 A/G 比值 <1 的是

- A: 摄入不足、消化不良时
- B: 自身免疫性疾病如风湿热、红斑狼疮等
- C: 各种原因脱水所致的血液浓缩
- D: 慢性肝炎、肝硬化、肝实质性损害

答案：D

30. 某女性，64 岁，既往高血压病病史 15 年，活动后心悸、气短 3 年，2 小时前无明显诱因突发发生喘憋。体检：端坐体位，BP190/110mmHg，R30 次/分，Bp108 次/分，心界向左侧扩大，双肺可闻及广泛湿啰音。

- A: 硝苯地平
- B: 多索茶碱
- C: 西地兰
- D: 硝普钠

答案：C

31. 速效胰岛素的作用峰时为 ()。

- A: 0.25~0.5 小时
- B: 1.5~4 小时
- C: 6~12 小时
- D: 0.6~1.5 小时

答案：D

32. 制定新药新知识培训制度，归属于用药错误预防策略中的

- A: 人员培训
- B: 科学发展
- C: 管理规范到位
- D: 环境与流程的优化与持续改进

答案：A

33. 脑梗死的治疗药物，溶栓治疗

- A: 甘露醇
- B: 阿替普酶
- C: 阿司匹林

D: 普通肝素

答案: B

34. 结果一致的 II、III 级临床研究结论或 I 级临床研究的推论属于

A: E 级

B: B 级

C: D 级

D: C 级

答案: B

35. 患者于 1 周前无诱因出现咳嗽，咳嗽为阵发性，痰少，呈白色黏液性，不易咳出，同时出现发热，体温多在夜间升高，38℃ 左右，无畏冷、寒战、胸痛、咳血等，于卫生院治疗后，未见好转，并有气喘、气促，活动后呼吸困难等症状。入院治疗诊断为：肺炎。

A: 链霉素

B: 米诺环素

C: 克拉霉素

D: 阿奇霉素

答案: A

36. 某女性，32 岁，2 天前无明显诱因出现尿频、尿急、尿痛，伴腰痛。查体：T38℃，肾区叩击痛，血分析见 WBC $15 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞百分比 85%，尿分析见尿液浑浊，尿蛋白阳性，镜检白细胞满视野。

A: 选用肾毒性小、副作用少的抗菌药物

B: 如该患者为妊娠期，可选用氨苄青霉素

C: 首选针对革兰氏阳性菌的药物

D: 抗菌药物在尿和肾内的浓度要高

答案: C

37. 下列药物属于肝药酶诱导剂的是

- A: 氟康唑
- B: 环丙沙星
- C: 胺碘酮
- D: 卡马西平

答案：D

38. 药师在工作中预防用药错误可以采取的行为不包括()

- A: 仔细核对药品
- B: 严格审核处方
- C: 进行用药指导
- D: 自行修改错误处方

答案：D

39. (2017 年真题) 慢性阻塞性肺病急性加重期伴脓痰者宜选用的治疗方案是()

- A: 抗菌药物+短效支气管舒张剂+糖皮质激素
- B: 吸入型糖皮质激素+磷酸二酯酶抑制剂
- C: 吸入型糖皮质激素+镇咳药+抗过敏药
- D: 长效 β_2 受体激动剂+吸入型糖皮质激素

答案：A

40. 患者，男，45 岁，患有高血压，因感冒发热，咽痛，流鼻涕到药店买药，药师不应推荐其使用的药物是()

- A: 速感宁胶囊
- B: 复方酚咖伪麻胶囊
- C: 速克感冒片

D: 维 C 银翘片

答案: B

41. 过敏性结膜炎和春季卡他性结膜炎可选用 ()

A: 玻璃酸钠滴眼液

B: 氧氟沙星滴眼液

C: 七叶洋地黄双苷滴眼液

D: 色甘酸钠滴眼液

答案: D

42. 避免碘摄入过多，甲亢患者应尽量避免服用的药物是

A: 链激酶

B: 阿托伐他汀钙

C: 氯吡格雷

D: 胺碘酮

答案: D

43. 患者，男，26 岁，因“咳嗽伴间断发热 1 周”入院，查体：T38.9℃，P90 次 / 分，R21 次 / 分，BP110 / 70mmHg，血常规：白细胞 $16.9 \times 10^9 / L$ ，中性粒细胞百分比 84.6%；胸部 CT 示右下肺炎症。诊断为“右侧肺炎”。

A: 肝功能不全者

B: 老年人

C: 推荐应用大剂量万古霉素来维持其血药浓度在 15~20mg / L 并且长疗程的患者

D: 肾功能不全者

答案: A

44. (2016 年真题) 患者，男，60 岁，呈典型的“面具脸”，“慌张步态”及“小字症”表现，确诊为帕金森病，患者同时患有闭角型青光眼，不宜选用的治疗帕金森病的药物是（）。

- A: 多奈哌齐
- B: 司来吉兰
- C: 左旋多巴
- D: 普拉克索

答案：C

45. 以下治疗哮喘疾患的中成药中，不含有麻黄碱成分的是

- A: 蛇胆川贝液
- B: 通宣理肺丸
- C: 止咳定喘膏
- D: 防风通圣丸

答案：A

46. 根据体重计算婴幼儿的剂量时注

- A: 选用剂量的上限
- B: 不可调整
- C: 可适当调整
- D: 应减少用量

答案：A

47. 尿液是人体泌尿系统排除的代谢废物，正常人每日排出尿液 1000～3000ml。其中 97% 为水分，而在 3% 的固体物质中，主要含有两大类物质：有机物（尿素、尿酸、肌酐等蛋白质代谢产物）和无机物（氯化钠、磷酸盐、硫酸盐、铵盐等）。

- A: 肾性肾小球肾炎

B: 肢端肥大症

C: 心肌梗死

D: 肝脏疾病

答案：A

48. 患者，男，42 岁，胃癌根治术后，病理为胃窦低分化腺癌，肝肾功能正常，化疗方案为紫杉醇+顺铂+氟尿嘧啶。

A: 典型不良反应是恶心、呕吐、腹泻

B: 属于嘌呤核苷合成酶抑制剂

C: 与甲氨蝶呤合用，两者可产生协同作用

D: 用药期间不宜饮酒或同用阿司匹林类药

答案：B

49. 通过与肠黏膜接触，刺激肠壁的感受神经末梢，引起肠反射性蠕动增强而排出柔软成形粪便的药物是

A: 比沙可啶

B: 乳果糖

C: 硫酸镁

D: 甘油栓

答案：A

50. 服药后或同时饮酒可致使药效学增强的药物是

A: 苯妥英钠

B: 利血平

C: 别嘌醇

D: 地西泮

答案：D

51. 以下所列药物中，一般不会导致蛋白尿的是

- A: 甲氨蝶呤
- B: 庆大霉素
- C: 多黏菌素
- D: 青霉素

答案：D

52. 患者，男，62岁，糖尿病病史7年，长期使用胰岛素、二甲双胍治疗，近期为控制血压加服治疗药物，该患者不宜应用的药物是

- A: 卡托普利
- B: 洛伐他汀
- C: 普萘洛尔
- D: 氢氯噻嗪

答案：C

53. 竞争自肾小管排泄、延长半衰期的是

- A: 青霉素+丙磺舒
- B: 多潘立酮+维生素C
- C: 西咪替丁+格列本脲
- D: 四环素+硫酸亚铁

答案：A

54. 急、慢性肾小球肾炎可引起

- A: 尿胆红素检测阳性
- B: 尿酸碱度增高
- C: 尿蛋白检测阳性
- D: 尿酸碱度降低

答案：C

55. 非磺酰脲类促胰岛素分泌剂

- A: 罗格列酮
- B: 格列吡嗪
- C: 瑞格列奈
- D: 伏格列波糖

答案: C

56. 患儿，男，6 个月，体重 9.0kg，平素健康，近日出现多汗、夜哭、易惊。体检：前囟平软，颅骨有乒乓球感，枕秃，肋骨串珠。人工喂养，尚未添加任何辅食，平素较少出门。

- A: 佝偻病
- B: 脑瘫
- C: 智障
- D: 坏血病

答案: A

57. 长期服用可加重消化道溃疡风险，不宜与非甾体抗炎药合用的药物是

- A: 美金刚
- B: 铝碳酸镁
- C: 匹伐他汀
- D: 多奈哌齐

答案: D

58. 已知对乙酰氨基酚的成人剂量为一次 400mg。一个体重为 10kg 的 11 个月大的婴儿感冒发热，按体表面积计算该患儿的处方剂量应为

- A: 50mg

- B: 75mg
- C: 90mg
- D: 100mg

答案：D

59. 包括索引、文摘和题录等，查阅非常方便

- A: 研究论文
- B: 三级文献源
- C: 二级文献
- D: 药学网络

答案：C

60. 沿静脉出现迂回线状色素沉着

- A: 氟尿嘧啶
- B: 博来霉素
- C: 白消安
- D: 柔红霉素

答案：A

61. 血清丙氨酸氨基转移酶正常参考区间是

- A: 成人 $<50\text{U/L}$
- B: 男性 $<40\text{U/L}$
- C: 男性 $11\sim50\text{U/L}$
- D: 成人 $<40\text{U/L}$

答案：D

62. 容易水解的药物是

- A: 青霉素类

- B: 牛痘菌苗
- C: 胃蛋白酶
- D: 阿扑吗啡

答案：A

63. 二甲双胍的最佳服用时间是

- A: 餐中
- B: 餐前
- C: 餐后
- D: 清晨空腹

答案：A

64. 通过重整患者的医嘱或药疗方案，评估药物治疗的有效性、安全性和经济性，核查患者的用药依从性，属于

- A: 处方审核
- B: 药学干预
- C: 药物治疗管理
- D: 药物利用研究和评价

答案：C

65. 儿科用药中，在病情危重抢救时最常用的给药途径是

- A: 口服给药
- B: 静脉注射
- C: 肌肉注射
- D: 静脉滴注

答案：B

66. 用于胆囊炎患者控制感染症状的药物是

- A: 复方阿嗟米特
- B: 头孢曲松与甲硝唑联用
- C: 匹维溴铵
- D: 脂肪乳

答案：B

67. 关于血清天冬氨酸氨基转移酶的叙述正确的是

- A: 天冬氨酸氨基转移酶的测定值只反映肝脏的功能
- B: 天冬氨酸氨基转移酶 (AST) 与丙氨酸氨基转移酶 (GPT) 是同一概念
- C: 在慢性肝炎尤其是肝硬化时，AST 升高的幅度不如 ALT
- D: 天冬氨酸氨基转移酶主要存在于心肌、肝、肾、骨骼肌、胰腺等组织细胞中，同时也存在于正常人的血浆、胆汁、脑脊液及唾液中

答案：D

68. 炎症性痤疮的首选外用抗菌药物是

- A: 维 A 酸凝胶
- B: 夫西地酸乳膏
- C: 水杨酸软膏
- D: 过氧化苯甲酰凝胶

答案：D

69. 早产儿为预防佝偻病，每天服用维生素 D 的剂量为

- A: 100~800IU?
- B: 200~400IU?
- C: 800~1000IU?
- D: 100~200IU?

答案：C

70. 在指导合理用药时，应交代宜在睡前服用的药物是()

- A: 苯妥英钠
- B: 硫酸亚铁
- C: 辛伐他汀
- D: 双磷酸盐

答案: C

71. 属于 β 受体激动剂的是

- A: 美托洛尔
- B: 异丙托溴铵
- C: 福莫特罗
- D: 乙酰胆碱

答案: C

72. 不宜与蛋白质食物合用的药物是

- A: 磺胺类药物
- B: 辛伐他汀
- C: 左旋多巴
- D: 硫酸亚铁

答案: C

73. 归属专业学术机构网站的是

- A: www.ashp.org
- B: www.cmt.tom.cn
- C: www.merck.com
- D: [www.google](http://www.google.com)

答案: A

74. 患者，女，21 岁，近半年来食欲亢进，多汗体重明显减轻，伴有乏力、心悸。就诊查体见双手震颤，心率 104 次/分，化验结果：血清促甲状腺素 (TSH) < 0.1 mU/L，FT3、FT4 明显升高，肝肾功能基本正常，白细胞计数正常，诊断为甲状腺功能亢进症。首选的治疗方案是 ()

- A: 选用 ¹³¹I 治疗
- B: 注意休息补充营养，使用甲巯咪唑治疗
- C: 碘化钾治疗，定期复查
- D: 甲状腺次全切除手术

答案：B

75. 支气管哮喘急性发作期(轻度)可选用的药物是

- A: 沙美特罗+氟替卡松
- B: 沙丁胺醇
- C: 倍氯米松
- D: 异丙托溴铵

答案：B

76. 可引起尿胆红素阳性的是

- A: 病毒性肝炎
- B: 肾小球肾炎
- C: 再生障碍性贫血
- D: 肺结核

答案：A

77. 某男性患者，57 岁，既往高血压病史 10 年，与儿子吵架后突然起病，言语不清，左侧肢体无力，意识不清。查体：BP220 / 120mmHg，中度昏迷，瞳孔不等大，对光反射消失，强痛刺激(+)，左侧肢体不活动，左侧巴彬斯基征阳性。

- A: 止血
- B: 降压
- C: 脱水
- D: 扩容

答案：C

78. 应用胆碱酯酶复活剂时做法错误的是()。

- A: 切勿两种或三种复活剂同时使用，以免毒性增加
- B: 复活剂对解除烟碱样作用和促使患者昏迷苏醒的作用比较明显
- C: 不能与碱性药物并用
- D: 复活剂不需稀释，可以直接注射

答案：D

79. 患者女，6岁，因发热体温 38.6℃、头痛、鼻塞、流清涕咳嗽、无痰就诊。实验室检查：白细胞、中性粒细胞计正常。临床诊断为普通感冒。

- A: 双氯芬酸钠
- B: 尼美舒利
- C: 对乙酰氨基酚
- D: 美洛昔康

答案：C

80. 药品通用名容易混淆的抗真菌药是

- A: 阿糖胞苷
- B: 阿糖腺苷
- C: 氟胞嘧啶
- D: 氟尿嘧啶

答案：C

81. 患者平日佩戴隐形眼镜，使用抗结核药后，导致患者隐形眼镜染色的药物是()

- A: 利福平
- B: 乙胺丁醇
- C: 吡嗪酰胺
- D: 异烟肼

答案：A

82. 酒的主要成分为乙醇，饮用后人体先是兴奋，随之对中枢神经出现抑制，并扩张血管，刺激或抑制肝药酶代谢系统；另外，有些药也可延迟酒的代谢和分解。总体上，药与酒的相互作用结果有两个：一是降低药效；二是增加发生不良反应的几率。

- A: 血压升高
- B: 嗜睡
- C: 痛风急性发作
- D: 出现尿蛋白

答案：C

83. 慢性肾盂肾炎治疗的关键是

- A: 联合使用抗菌药物
- B: 延长给药疗程
- C: 选用敏感抗菌药物
- D: 积极寻找并去除易感因素

答案：D

84. 可引起局部组织萎缩

- A: 氯己定

- B: 地塞米松粘贴片
- C: 硼酸甘油
- D: 甲硝唑含漱制剂

答案：B

85. 服药期间饮茶可降低药效的是

- A: 格列本脲
- B: 西咪替丁
- C: 硫酸亚铁
- D: 泼尼松

答案：C

86. 患者，女，69 岁，体型偏胖，BMI30.1kg / m²，患者诉平卧时常有反酸、烧心、胸痛，偶感背痛半年，近 1 周出现夜间咳嗽、咽部有异物感。自用止咳糖浆无效。查体：咽红，声音嘶哑；双肺听诊未闻及干、湿性啰音，偶有哮鸣音。既往史：高血压病史 12 年，服用氨氯地平片 5mgqd，平素血压可控制在 140 / 85mmHg 左右；高脂血症病史 10 年，服用阿托伐他汀钙片 20mgqd。

- A: 心绞痛
- B: 胃食管反流病
- C: 支气管哮喘
- D: 胃溃疡

答案：B

87. 某男性，53 岁，参加婚礼后 5 小时突发左脚第 1 跖趾关节剧痛，3 小时后局部出现红、肿、热、痛和活动困难。实验室检查示血尿酸为 500mol/L；足部 X 线示非特征性软组织肿胀。

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

A: 布洛芬

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/917113032050010024>