专业《执业药师之西药学专业二》考试必刷200题题库，word格式可自由下载编辑，附完整答案！

2024年宁夏回族自治区青铜峡市《执业药师之西药学专业二》考试必刷200题大全（有一套）

第Ⅰ部分 单选题（100题）

1.哌拉西林和羧苄西林()

A: 与庆大霉素合用于铜绿假单胞菌感染

B: 脑脊液中浓度较高，酶稳定性高，适用于严重脑膜感染

C: 肾毒性大

D: 口服，肌内注射或静脉注射均可用于全身感染

答案：A

2.室性心律失常可用

A: 普萘洛尔

B: 美西律

C: 地尔硫䓬

D: 地高辛

答案：B

3.用药期间应注意监测血气和酸碱平衡的是

A: 复方氨基酸注射液(3AA)

B: 精氨酸

C: 复方氨基酸注射液(18AA)

D: 赖氨酸

答案：B

4.哮喘急性发作首选的治疗药物是

A：磷酸二酯酶抑制剂

B：白三烯受体阻断剂

C：短效β2受体激动剂

D：吸入性糖皮质激素

答案：C

5.剂量过大会引起高铁血红蛋白血症的是

A：硝苯地平

B：地尔硫

C：硝酸甘油

D：普萘洛尔

答案：C

6.（2019年真题）老年患者长期大剂量使用可引起骨折的药物是（）

A：奥美拉唑

B：替普瑞酮

C：胶体果胶铋

D：复方碳酸钙

答案：A

7.青光眼患者应该慎用

A：噻托溴铵

B：沙美特罗

C：沙丁胺醇

D：孟鲁司特

答案：A

8.（2017年真题）可导致新生儿药物性黄疸的是（）

A：磺胺嘧啶

B：兴孢他啶

C：阿莫西林

D：林可霉素

答案：A

9.（2016年真题）属于贝丁酸类调节血脂药的是

A：阿托伐他汀

B：非诺贝特

C：依折麦布

D：阿昔莫司

答案：B

10.用于白色念珠菌、隐球菌和球孢子菌等引起的感染的药物是

A：益康唑

B：两性霉素B

C：制霉菌素

D：咪康唑

答案：C

11.可用于降低眼压的药物是()

A：利福平

B：阿托品

C：左氧氟沙星

D：卡替洛尔

答案：D

12.可用于各种类型癫痫的药物是

A：阿司匹林

B：保泰松

C：丙戊酸钠

D：乙琥胺

答案：C

13.耐甲氧西林金黄色葡萄球菌引起的肺炎宜选用()

A：氟康唑

B：克林霉素

C：万古霉素

D：阿奇霉素

答案：C

14.阿司匹林的主要适应证不包括()

A：急性心肌梗死

B：胃溃疡

C：不稳定型心绞痛

D：预防血栓形成

答案：B

15.属于治疗固醇性胆囊结石的是

A：山莨菪碱

B：多潘立酮

C：胶体果胶铋

D：熊去氧胆酸

答案：D

16.属于必需氨基酸，人体不能合成或合成速度不能满足人体需要()

A：赖氨酸

B：复方氨基酸注射液(18AA)

C：精氨酸

D：复方氨基酸注射液(3AA)

答案：A

17.（2016年真题）患者，男，56岁。有高血压病史4年。体检：血压156/96mmHg，无主动脉狭窄。医师处方依那普利片控制血压。监测他汀类药所致肌毒性的临床指标是

A：肌酸激酶

B：尿淀粉酶

C：碱性磷酸酶

D：乳酸脱氢酶

答案：A

18.（2018年真题）配制静脉输液时;应先用灭菌注射用水溶解,然后用5%葡萄糖注射液稀释,不可用氯化钠注射液稀释的抗真菌药是（）

A：伏立康唑

B：卡泊芬净

C：氟康唑

D：两性霉素B

答案：D

19.下列药物中，与维生素D合用能出现高钙血症的药物是

A：考来烯胺

B：硫糖铝

C：氢氯噻嗪

D：矿物油

答案：C

20.青霉素在体内的主要消除方式是

A：肾小球滤过

B：肝脏代谢

C：被血浆酶破坏

D：肾小管分泌排泄

答案：D

21.克罗米通乳膏用于治疗

A：疥疮

B：寻常痤疮

C：蛲虫感染

D：体、股癣

答案：A

22.属于叶酸类抗代谢类药物的是

A：吉西他滨

B：甲氨蝶呤

C：长春瑞滨

D：巯嘌呤

答案：B

23.大剂量糖皮质激素冲击疗法用于

A：顽固性支气管哮喘

B：变态反应性疾病

C：中毒性感染和休克

D：湿疹

答案：C

24.可升高红细胞，用于肾性或非肾性贫血的药品是()。

A：硫酸亚铁

B：维生素B

C：重组人促红素

D：人血白蛋白

答案：C

25.通过抑制GABA的降解或促进合成而达到抗癫痫作用的药物是

A：脂肪酸类

B：二苯并氮革类

C：乙内酰脲类

D：γ-氨基丁酸类似物

答案：A

26.甲状腺危象选用()

A：格列本脲

B：丙硫氧嘧啶

C：胰岛素

D：二甲双胍

答案：B

27.（2021年真题）属于5-羟色胺与去甲肾上腺素再摄取抑制剂的抗抑郁药物是（）

A：艾司西酞普兰

B：马普替林

C：文拉法辛

D：吗氯贝胺

答案：C

28.亲脂性较强，易通过血一脑屏障

A：环磷酰胺

B：巯嘌呤

C：氟尿嘧啶

D：卡莫司汀

答案：D

29.降压时常见干咳的不良反应，发生率约为20%的药物是

A：硝普钠

B：卡托普利

C：烟酸

D：硝苯地平

答案：B

30.患者，女，72岁。持续性心房颤动，为预防脑卒中，宜选用的药物是

A：双氯芬酸

B：氯吡格雷

C：华法林

D：奥美拉唑

答案：C

31.伴有痛风的水肿病人，不宜选用下列哪种药物利尿

A：乙酰唑胺

B：阿米洛利

C：氨苯蝶啶

D：氢氯噻嗪

答案：D

32.袢利尿药发挥利尿的作用点是

A：Na+-K+-2Cl⁻同向转运子

B：磷酸二酯酶

C：碳酸酐酶

D：Na+-Cl⁻共转运子

答案：A

33.下列对皮肤真菌感染治疗药叙述错误的是()

A：奈替芬是丙烯胺类抗真菌药

B：酮康唑为咪唑类抗真菌药

C：环吡酮胺为吡啶酮类抗真菌药

D：阿莫罗芬为唑类的局部抗真菌药

答案：D

34.属于磷酸二酯酶抑制剂的是

A：乙酰唑胺

B：双嘧达莫

C：替格瑞洛

D：阿司匹林

答案：B

35.顺铂

A：影响蛋白质合成和功能

B: 直接破坏DNA结构和功能

C: 干扰RNA转录

D: 干扰核酸生物合成

答案：B

36.适用于磺酰脲类降糖药治疗不理想的2型糖尿病患者的药物是

A: 瑞格列奈

B: 利拉鲁肽

C: 葡萄糖酸钙

D: 骨化三醇

答案：A

37.治疗急性阿米巴痢疾和阿米巴肝脓肿应首选

A: 甲硝唑

B: 二氯尼特

C: 氯喹

D: 依米丁

答案：A

38.（2015年真题）单纯饮食控制及体育锻炼无效的2型糖尿病肥胖者首选的降糖药是（）。

A: 瑞格列奈

B: 普萘洛尔

C: 格列美脲

D: 二甲双胍

答案：D

39.属于第三代喹诺酮类药物的是

A: 萘啶酸
B: 吡哌酸
C: 莫西沙星
D: 诺氟沙星
答案：D

40.中毒后可用维生素B6来对抗的抗结核药是
A: 异烟肼
B: 对氨基水杨酸
C: 乙胺丁醇
D: 利福平
答案：A

41.（2019年真题）治疗滴虫性阴道炎适宜使用的药物是（）
A: 苄星青霉素
B: 庆大霉素
C: 甲硝唑
D: 呋喃妥因
答案：C

42.用于治疗疥疮的药物有()
A: 硼酸软膏、咪康唑乳膏、特比泰芬软膏
B: 克霉唑乳膏、克罗米通乳膏、维A酸软膏
C: 克罗米通乳膏、过氧苯甲酰凝胶、咪康唑软膏
D: 林旦乳膏、硫黄乳膏、克罗米通乳膏
答案：D

43.双香豆素与保泰松合用可

A: 产生协同作用

B: 诱导肝药酶加速灭活，作用减弱

C: 与其竞争结合血浆蛋白

D: 竞争性对抗

答案：C

44.下述属于第三代 α

A: 坦洛新

B: 十一酸睾酮

C: 酚苄明

D: 哌唑嗪

答案：A

45.以下PPI中，主要代谢酶是CYP3A4的是

A: 兰索拉唑

B: 雷贝拉唑

C: 泮托拉唑

D: 奥美拉唑

答案：A

46.干扰核酸生物合成的抗恶性肿瘤药是

A: 多柔比星

B: 环磷酰胺

C: 吉非替尼

D: 5-氟尿嘧啶

答案：D

47.属于IC类抗心律失常药的是

A: 奎尼丁
B: 胺碘酮
C: 普鲁卡因胺
D: 普罗帕酮
答案：D

48.口服索他洛尔作为抗心律失常药，其疗效和不良反应发生率均呈剂量依赖性，具有最佳获益风险比的用法是一天两次，一次
A: 80mg
B: 160mg
C: 40mg
D: 120mg
答案：D

49.氨基糖苷类的主要排泄途径是
A: 主要经肝脏清除
B: 主要经呼吸道排泄
C: 主要经肾脏排泄
D: 经肝、肾双途径清除
答案：C

50.可与克拉霉素、兰索拉唑联合抗幽门螺杆菌治疗的药物是
A: 头孢唑林
B: 苄星青霉素
C: 青霉素
D: 阿莫西林
答案：D

51.壬二酸的作用特点不包括

A：对厌氧茵无抑制和杀灭作用

B：局部使用能显著减少滤泡内丙酸杆菌的生长

C：可直接抑制皮肤表面的细菌

D：可竞争性抑制产生二氢睾酮的酶过程

答案：A

52.低剂量用药时对中枢和外周多巴胺D2，受体有拮抗作用，而高剂量用药时有较弱的5-HT?受体阻断作用，可用于化疗所致恶心呕吐的是

A：甲氧氯普胺

B：劳拉西泮

C：氯丙嗪

D：帕洛诺司琼

答案：A

53.阻断H2受体的药物是

A：奥美拉唑

B：雷尼替丁

C：氢氧化铝

D：哌仑西平

答案：B

54.专供糖尿病患者使用的肠内全营养制剂的是

A：视黄酸

B：TP

C：TPF-D

D：视黄醇

答案：C

55.患者，男，19岁，既往有癫痫病史2年，长期服用苯妥英钠控制良好。1周前，患者无明显诱因感胸骨后烧灼感，无腹痛、腹泻、恶心、呕吐等。查体：腹平软，无压痛及反跳痛，肝脾肋下未触及，肠鸣音正常。胃镜检查提示：胃食管反流病。医嘱：西咪替丁胶囊，400mg，口服，4次/日。

A: 氢氧化铝

B: 雷尼替丁

C: 复方碳酸钙

D: 泮托拉唑

答案：D

56.关于利伐沙班注意事项的描述，不正确的是()

A: 如伤口已止血，首次用药应于术后立即给药

B: 用药过量可导致出血并发症

C: 用药期间需定期测定血红蛋白

D: 对于不同的手术选择的疗程不同

答案：A

57.β-内酰胺酶抑制剂的抑酶活性由强到弱的顺序是（）

A: 他唑巴坦>克拉维酸>舒巴坦

B: 舒巴坦>克拉维酸>他唑巴坦

C: 他唑巴坦>舒巴坦>克拉维酸

D: 舒巴坦>他唑巴坦>克拉维酸

答案：A

58.因易导致新生儿溶血,妊娠晚期妇女禁用的抗菌药物是（）

A: 苄星青霉素

B: 庆大霉素

C: 甲硝唑

D: 呋喃妥因

答案：D

59.关于地高辛的说法不正确的是

A: 减慢传导

B: 加强心肌收缩力

C: 减慢心率

D: 激动Na

答案：D

60.以下食物与华法林钠不存在相互作用的是

A: 红叶苋菜

B: 菠菜叶

C: 洋葱

D: 脱皮黄瓜

答案：D

61.对抗杆菌属等厌氧菌具有抗菌活性，属于头霉素类的抗菌药物是()。

A: 氨曲南

B: 亚胺培南

C: 头孢美唑

D: 头孢吡肟

答案：C

62.羟甲基戊二酰辅酶A还原酶抑制剂简称为他汀类药，其与羟甲基戊二酰辅酶A的结构相似，且对羟甲基戊二酰辅酶A还原酶（HMG—CoA还原酶）的亲合力更大，对该酶产生竞争性的抑制作用，结果使血总胆固醇（TC）、低密度脂蛋白（LDL）和载脂蛋白（Apo）B水平降低，对动脉粥样硬化和冠心病的防治产生作用。

A: 10mg阿托伐他汀钙，每日1次

B: 20mg瑞舒伐他汀，每日1次

C: 40mg氟伐他汀，每日1次

D: 40mg各伐他汀，每日1次

答案：A

63.头孢曲松

A: 脑脊液中浓度较高，酶稳定性高，适用于严重脑膜感染

B: 肾毒性较大

C: 与庆大霉素合用于铜绿假单胞菌感染

D: 口服，肌内注射或静脉注射均可用于全身感染

答案：A

64.（2021年真题）关于钠-葡萄糖协同转运蛋白-2（SLG-2）抑制剂达格列净作用特点和不良反应的说法，错误的是（）

A: 适用于1型糖尿病或糖尿病酮症酸中毒

B: 降糖效果受肾小球滤过的葡萄糖负荷的影响

C: 重度肾功能不全患者禁用

D: 降糖作用不依赖于胰岛B细胞的功能及机体对胰岛素的敏感性

答案：A

65.苯妥英钠血药浓度超过多少可出现中毒症状

A: 5μg/ml

B: 20μg/ml

C: 10μg/ml

D: 2μg/ml

答案：B

66.（2016年真题）华法林起效缓慢，深静脉栓塞治疗的初期，需同时联合使用的是

A: 维生素B12

B: 维生素B1

C: 依诺肝素

D: 维生素B2

答案：C

67.下列选项中，主要用于控制疟疾复发和传播的药物是()。

A: 奎宁

B: 伯氨喹

C: 青蒿素

D: 氯喹

答案：B

68.大环内酯类抗生素()

A: 万古霉素

B: 克林霉素

C: 克拉霉素

D: 红霉素

答案：A

69.属于肾上腺受体激动剂的降眼压药是()

A: 毛果芸香碱
B: 噻吗洛尔
C: 地匹福林
D: 拉坦前列素
答案：C

70.男性，68岁，发热伴咳嗽1周，表情淡漠，气急，近2天全身散在出血点及瘀斑，血压60／40mmHg，血红蛋白120g／L，白细胞12X109／L，血小板30X109／L，血涂片可见少量红细胞碎片，凝血酶原时间18秒(正常值13秒)，骨髓穿刺示增生活跃，巨核细胞多，诊断为弥散性血管内凝血。
A: 鱼精蛋白
B: 维生素C
C: 低分子肝素
D: 维生素K1
答案：A

71.下列药物中，与甲氨蝶呤长期大量合用，可引起膀胱移行细胞癌的是
A: 糖皮质激素
B: 抗病毒药物
C: 抗生素
D: 维生素类
答案：A

72.选择性直接作用于M胆碱受体，引起缩瞳，眼压下降，并有调节痉挛等作用的是
A: 前列腺素衍生物

B: α2受体激动剂

C: 碳酸酐酶抑制剂

D: 拟胆碱药

答案：D

73.治疗地高辛中毒引起窦性心动过缓的药物是

A: 阿利吉仑

B: 阿托品

C: 胺碘酮

D: 沙库巴曲缬沙坦

答案：B

74.肾上腺皮质功能不全采用

A: 糖皮质激素一般剂量长期疗法

B: 抗结核病药与糖皮质激素合用

C: 糖皮质激素大剂量冲击疗法

D: 糖皮质激素小剂量代替疗法

答案：D

75.大剂量静脉给药时，可能出现可逆性黄疸的抗生素是()

A: 夫西地酸

B: 小檗碱

C: 磷霉素

D: 利奈唑胺

答案：A

76.外用的增色素药分为4类，不包括

A: 重金属元素及其化合物

B: 肾上腺皮质激类

C: 煤焦油类

D: 补骨脂素及其衍生物

答案：C

77.可抑制细菌 β-内酰胺酶的是()。

A: 替考拉宁

B: 舒巴坦

C: 利福平

D: 磷霉素

答案：B

78.服用地西泮后病情不会加重的是

A: 重症肌无力

B: COPD

C: 高血压

D: 抑郁症

答案：C

79.静脉注射可出现舌头麻木()

A: 氯霉素

B: 四环素

C: 链霉素

D: 多西环素

答案：D

80.属于 β 受体激动剂的非强心苷类的正性肌力药是()

A: 地高辛

B: 多巴酚丁胺

C: 米力农

D: 依那普利

答案：B

81.患者，男，70岁。进食后饱胀不适伴反酸5年余，黑便1天。胃镜检查提示胃多发性溃疡(A

A: 替米沙坦

B: 美托洛尔

C: 胶体果胶铋胶囊

D: 埃索美拉唑钠

答案：C

82.庚酸炔诺酮()

A: 抑制排卵作用

B: 促进蛋白质合成

C: 抗着床

D: 减少精子数目

答案：A

83.已发生超敏反应，用药前常规给予地塞米松、苯海拉明和西咪替丁加以预防的抗肿瘤药是

A: 注射用柔红霉素

B: 注射用盐酸博来霉素

C: 紫杉醇注射液

D: 注射用硫酸长春新碱

答案：C

84.米诺环素属于

A：四环素类

B：氨基糖苷类

C：酰胺醇类

D：β-内酰胺类

答案：A

85.属于广谱抗病毒药物的是

A：奥司他韦

B：阿昔洛韦

C：阿糖腺苷

D：干扰素

答案：D

86.血钾升高至

A：大于265μmol/L

B：大于172μmol/L

C：大于7μmol/L

D：大于6mmol/L

答案：D

87.属于环氧酶抑制剂的是

A：阿司匹林

B：乙酰唑胺

C：双嘧达莫

D：替格瑞洛

答案：A

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：
https://d.book118.com/918021050124007022