

同等学力申硕-麻醉科-公共基础部分-骨科

[单选题]1. 骨盆耻骨部骨折引起尿道破裂，尾骨骨折引起直肠破裂，均为

- A. 开放性骨折
- B. 闭合性骨折
- C. 病理性骨折
- D. 嵌插性骨折
- E. 稳定性骨折

正确答案：A（江南博哥）

参考解析：骨折处皮肤或黏膜破裂，骨折端与外界相通即为开放性骨折，耻骨骨折伴膀胱或尿道破裂、尾骨骨折致直肠破裂分别与尿路或肠腔相通，故亦均属开放性骨折。

[单选题]2. 男性病人，30岁，左大腿下段被铁棒击伤，畸形，X线片示左股骨干下1/3骨折，远折端明显向后倾倒。造成此种骨折移位的因素主要是

- A. 肌肉牵拉力
- B. 暴力的性质
- C. 暴力的大小
- D. 肢体远侧段的重量
- E. 搬运不当

正确答案：A

参考解析：股骨干下1/3骨折，远折端受腓肠肌的牵拉及肢体的重力作用而向后移位。又由于股前、外、内肌肉牵拉的合力，使近折端向前上移位，形成短缩畸形。

[单选题]3. 骨折的临床表现，下列哪项描述是错误的

- A. 骨折的特有体征包括畸形、反常活动及骨擦音或骨擦感
- B. 检查可疑骨折病人时，应尽量诱发骨擦音或骨擦感的出现，以明确诊断
- C. 骨折时可以没有骨擦音或骨擦感
- D. 临床未见有骨折专有体征时，也可能有骨折
- E. 只要发现骨折专有体征的其中一项，即可作出骨折的明确诊断

正确答案：B

参考解析：骨折的特有体征包括畸形、反常活动及骨擦音或骨擦感，只要发现其中一项，即可确诊为骨折。但反常活动及骨擦音或骨擦感应在初次检查病人时予以注意，不可故意反复多次检查，以免加重周围组织损伤，特别是重要的血管神经损伤。值得注意的是，有些骨折如裂缝骨折和嵌插骨折，可不出现上述三个典型的骨折特有体征，应常规进行X线拍片检查，以便确诊。

[单选题]4. 骨筋膜室综合征一旦确诊，首先应进行的处理是

- A. 应用脱水消肿药物
- B. 立即撤除外固定
- C. 继续观察1小时，如无好转再行处理

- D. 立即切开复位，解除对血管的压迫
- E. 立即手术切开深筋膜减压

正确答案：E

参考解析：骨筋膜室综合征常由创伤骨折的血肿和组织水肿使其室内内容物体积增加或外包扎过紧、局部压迫使骨筋膜室容积减小而导致骨筋膜室内压力增高所致，一旦明确诊断需及时切疔深筋膜以减压。

[单选题]5. 下列骨折临床愈合的标准中，哪项是错误的

- A. 骨折已满3个月，X线片示骨折线消失
- B. 局部无压痛及纵向叩击痛
- C. 局部无反常活动
- D. 连续观察两周，骨折不变形
- E. X线片显示骨折线模糊，有连续骨痂通过骨折线

正确答案：A

参考解析：骨折愈合时原始骨痂不断钙化而逐渐加强，当其达到足以抵抗肌收缩及成角、剪力和旋转力时，则骨折已达到临床愈合，一般需4~8周。此时X线片上可见骨折处四周有梭形骨痂阴影，但骨折线仍隐约可见。

[单选题]6. 关于骨折的功能复位标准，下列哪项是错误的

- A. 成人下肢骨折缩短不超过1cm
- B. 成人骨折成角移位不超过 10° ，儿童不超过 15°
- C. 成人骨折分离移位不超过2cm
- D. 长骨干横行骨折对位应达1/3以上
- E. 儿童下肢骨折缩短不超过2cm

正确答案：C

参考解析：功能复位的标准是：①骨折部位的旋转移位、分离移位必须完全矫正（而不是移位超过2cm）。②缩短移位：在成人下肢骨折不超过1cm；儿童若无骨骺损伤，下肢缩短在2cm以内，在生长发育过程中可自行矫正。③成角移位：下肢骨折轻微的向前或向后成角，与关节活动方向一致，日后可在塑形期内自行矫正。向侧方成角移位，必须完全复位。④长骨干横行骨折，骨折端对位应达1/3以上，干骺端骨折至少应对位3/4左右。

[单选题]7. 关于儿童下肢骨折的功能复位，下列哪一项是错误的

- A. 骨下骨折对位必须在1/3以上
- B. 向侧方成角不能超过 15°
- C. 短缩不能超过2cm
- D. 干骺端骨折至少应有3/4左右对位
- E. 分离及旋转移位均应完全纠正

正确答案：B

参考解析：儿童下肢骨折的功能复位，向侧方的成角移位必须完全复位。

[单选题]8. 下列哪种骨折愈合最慢

- A. 胫骨中、下 1/3 骨折
- B. 股骨髁间骨折
- C. 肱骨髁上骨折
- D. 内踝骨折
- E. 桡骨远端骨折

正确答案：A

参考解析：胫骨两端有许多小孔，许多小血管即由关节囊、韧带、肌腱等附着处穿入这些小孔进入骨内，故胫骨两端有充足的血液供应。而在胫骨干之中、下 1/3 内完全没有血管孔，自上而下的滋养动脉承担整个中、下 1/3 骨干的大部分血液供应。该处骨折后，自上而下的滋养动脉断裂，远侧骨折段丧失了大部分血液供应，故愈合最慢。而 B、C、D、E 均为松质骨，血液供应充足。

[单选题]9. 骨折急救处理时，下列哪项是最重要的

- A. 立即复位固定
- B. 清洁裸露骨折端
- C. 简单妥善固定患肢
- D. 都需使用止血带
- E. 清洁伤口后固定患肢

正确答案：C

参考解析：骨折急救的目的是用最简单而有效的方法抢救生命、保护患肢、迅速转运，以便尽快得到妥善处理。开放性骨折，伤口出血绝大多数可用加压包扎止血。大血管出血，加压包扎不能止血时，才采用止血带止血。若骨折端已戳出伤口，并已污染，又未压迫重要血管、神经者，小应将其复位，以免将污物带到伤口深处。应送至医院经清创处理后，再行复位。

[单选题]10. 股骨中下 1/3 开放性骨折并活动性出血者，现场急救首先要作的处理是

- A. 输血、补液
- B. 注射止血药
- C. 应用止血带
- D. 固定患肢
- E. 摄片了解骨折情况

正确答案：C

参考解析：股骨中下 1/3 开放性骨折并活动性出血者，加压包扎一般不能止血，应立即采用止血带止血。

[单选题]11. 治疗闭合性骨折时，下列哪项不应作为切开复位的指征

- A. 骨折端有软组织嵌入，手法复位失败
- B. 关节内骨折手法复位后对位不好
- C. 全身多处骨折
- D. 骨折并发主要血管损伤

E. 手法复位未达到解剖复位要求

正确答案： E

参考解析： 对于骨折的复位，应争取达到解剖复位或接近解剖复位，不能为了追求解剖复位而反复进行多次手法复位或予手术复位，达到功能复位即可。

[单选题]12. 关于开放性骨折清创术，下列哪项是错误的

- A. 对仍有血液供应的皮肤，只切除 1~2mm 污染区
- B. 彻底清除大小游离碎骨片
- C. 彻底切除失去活力的筋膜、肌肉和肌腱
- D. 保留未断裂的所有血管和神经
- E. 保留与骨膜及软组织有联系的小骨片

正确答案： B

参考解析： 开放性骨折清创时应清除异物，切除污染和失去活力的皮下组织、筋膜、肌肉。对于肌腱、神经、血管、关节韧带和关节囊，应在尽量切除其污染部分的情况下，保留组织的完整性，以便予以修复；游离的小骨片可以去除，与周围组织尚有联系的小骨片应予保留，大块的骨片，即使已完全游离也不能摘除，以免造成影响骨折愈合。

[单选题]13. 对开放性骨折最基本而重要的处理方法是

- A. 早期复位及内固定后缝合伤口
- B. 早期复位及缝合伤口后外固定
- C. 早期彻底清创缝合及适当固定
- D. 早期复位及内固定，应用抗生素预防感染
- E. 早期彻底清创缝合，应用抗生素预防感染

正确答案： C

参考解析： 处理原则是及时正确地处理创口，彻底清创缝合，尽可能地防止感染，同时根据伤情予以适当的固定，将开放性骨折转化为闭合性骨折。

[单选题]14. 右膝部刀砍伤并血性关节液外溢 6 小时。最基本的处理方法是

- A. 彻底清除关前内的异物、血肿和挫伤的关节囊
- B. 关节囊内外同时冲洗，彻底清创缝合，固定伤肢及应用抗生素
- C. 仅冲洗关节囊外伤口，彻底清创缝合，固定伤肢及应用抗生素
- D. 关节囊内外分层清洗，彻底清创缝合，固定伤肢及应用抗生素
- E. 彻底清创后，在关节腔内放置导管持续冲洗及注入抗生素

正确答案： D

参考解析： 关节囊内外应分层清洗，在局部软组织清创完成后，更换手套、敷单和器械再扩大关节囊切口，充分显露关节，用大量生理盐水反复冲洗。关节囊和韧带应在切除其污染部分的情况下尽量保留；必要时关节腔内可放置硅胶管，术后用林格液加抗生素灌洗引流。

[单选题]15. 开放性骨折体温升高时应考虑有

- A. 疼痛刺激

- B. 感染
- C. 休克
- D. 失血
- E. 组织液丢失

正确答案：B

参考解析：一般骨折后体温正常。出血量较大的骨折，体温略有升高，但通常不超过 38℃。开放性骨折如有体温升高时，应考虑可能有感染。

[单选题]16. 骨折的特有体征是

- A. 疼痛与压痛
- B. 功能障碍
- C. 肿胀与瘀斑
- D. 骨擦音和骨擦感
- E. 患肢循环障碍

正确答案：D

参考解析：骨折的局部表现有：①畸形：骨折段移位所致；②反常活动：无关节的部位出现活动；③骨擦音或骨擦感：骨折端互相摩擦造成；④疼痛与压痛；⑤局部肿胀与瘀斑；⑥功能障碍。前 3 项为骨折的专有体征，后 3 项为骨折的一般局部表现：红、肿、热、痛、功能障碍。如有专有体征其中之一，即可确诊骨折。但未见专有体征时，也可能有骨折，如嵌插骨折、裂缝骨折等。

[单选题]17. 骨折 X 线检查的重要意义是

- A. 了解骨折的发生机制
- B. 明确骨折的诊断
- C. 判断骨折的预后
- D. 了解组织的损伤情况
- E. 了解骨质密度

正确答案：B

参考解析：X 线检查对骨折的诊断有重要意义。凡是疑有骨折者均应 X 线摄片检查，可以发现临床上难以发现的无异常活动、骨擦音及畸形的骨折。X 线检查不仅能帮助诊断骨折、了解骨折的类型，而且还能指导治疗及判定骨折的愈合情况。

[单选题]18. 属于骨折早期并发症的是

- A. 创伤性关节炎
- B. 缺血性骨坏死
- C. 关节僵硬
- D. 骨筋膜室综合征
- E. 坠积性肺炎

正确答案：D

参考解析：

骨筋膜室综合征：即由骨、骨间膜、肌间隔和深筋膜形成的骨筋膜室内肌肉和神经因急性缺血而产生的一系列早期综合征。最多见于前臂掌侧和小腿，常由于骨折的血肿和组织水肿，使其室内内容物体积增加或包扎过紧，局部压迫使筋膜室容积过小，导致骨筋膜室内压力增高所致。

[单选题]19. 关节扭伤、脱位及关节附近骨折晚期最易发乍

- A. 骨肉瘤
- B. 损伤性骨化
- C. 骨结核
- D. 骨髓炎
- E. 腱鞘炎

正确答案：B

参考解析：损伤性骨化是骨折的晚期并发症，常见于关节扭伤、脱位及关节附近的骨折，在关节附近软组织内可有广泛的骨化。

[单选题]20. 骨折的治疗原则是

- A. 创口包扎
- B. 迅速运输
- C. 积极手术
- D. 正确搬运
- E. 复位固定功能锻炼

正确答案：E

参考解析：骨折的治疗原则：复位、固定、功能锻炼。①复位：复位是将移位的骨折段恢复正常或近乎正常的解剖关系，重建骨骼的支架作用是治疗骨折的重要步骤，也是骨折固定和功能锻炼的基础。②固定：固定是将骨折维持于复位后的位置，待其牢固愈合，是骨折愈合的关键。③功能锻炼：功能锻炼的目的是在不影响固定的前提下，尽快恢复患肢肌、肌腱、关节囊等软组织的舒缩活动以防止发生肌肉萎缩、骨质疏松、软组织粘连、关节僵硬等并发症。

[单选题]21. Colles 骨折最有诊断意义的体征是

- A. 反常活动
- B. 局部压痛
- C. 局部肿胀、瘀斑
- D. 典型畸形
- E. 骨擦音和骨擦感

正确答案：D

参考解析：Colles 骨折出现“枪刺刀样”和“银叉样”畸形，是该骨折不同于其他部位骨折的体征，有诊断意义。

[单选题]22. 前臂缺血性肌挛缩最突出的早期症状是

- A. 麻刺感
- B. 麻痹

C. 无桡动脉搏动

- D. 疼痛
- E. 手指苍白

正确答案：D

参考解析：前臂缺血性肌挛缩可以出现这几个体征，但最早期的表现是疼痛，等出现“5P征”已是晚期，难免缺血性肌挛缩的后果。

[单选题]23. 肱骨外科颈骨折的分类中没有的类型是

- A. 无移位型
- B. 内收型
- C. 外展型
- D. 伸直型
- E. 粉碎性

正确答案：D

参考解析：肱骨外科颈骨折分为四型，没有伸直型。伸直型骨折可见于肱骨髁上骨折。

[单选题]24. 最可能并发支配手部活动的三种主要神经损伤的骨折部位是

- A. 肱骨外科颈骨折
- B. 肱骨干骨折
- C. 桡骨远端骨折
- D. 肱骨髁上骨折
- E. 尺桡双骨折

正确答案：D

参考解析：肱骨髁上区域的邻近有三根重要的神经，尺、桡、正中神经。

[单选题]25. 肱骨干上1/3骨折，近端移位方向是

- A. 向外向上
- B. 向后向外
- C. 向前向内
- D. 向前向外
- E. 以上都不是

正确答案：C

参考解析：肱骨干上1/3骨折，骨折断端在三角肌止点以上，骨折近端受胸大肌、背阔肌、大圆肌的牵拉而向内、向前移位。

[单选题]26. 一病人，右上臂被机器绞伤后，上臂中部出现异常活动，伤侧腕下垂，各掌指关节不能主动伸直，拇指不能外展，手臂桡侧麻木感，最有可能的诊断是

- A. 右肱骨中段骨折
- B. 右肱骨中段骨折合并正中神经损伤
- C. 右肱骨中段骨折合并尺神经损伤
- D. 右肱骨中段骨折合并桡神经损伤

E. 右肱骨中段病理性骨折

正确答案：D

参考解析：上臂中部出现异常活动提示可能有右肱骨中段骨折，伤侧腕下垂，各掌指关节不能主动伸直，拇指不能外展，手臂桡侧麻木感是桡神经损伤的表现。

[单选题]27. 肱骨髁上骨折伸直型骨折的最严重并发症是

- A. 正中神经损伤
- B. 畸形愈合形成肘内翻
- C. 前臂肌肉缺血性挛缩
- D. 骨化性肌炎
- E. 关节僵硬

正确答案：C

参考解析：前臂肌肉缺血性挛缩的后果最严重，可能导致前臂功能完全丧失。

[单选题]28. 30岁男性，枪伤后，右上臂反常活动，其远端未触及动脉搏动，不能主动伸腕伸指，需立即

- A. 清创内固定，探查血管、神经
- B. 伤口清创，骨牵引
- C. 清创，观察血液循环
- D. 加压包扎，观察血液循环
- E. 闭合创口，夹板外固定

正确答案：A

参考解析：开放性骨折合并血管、神经损伤需切开内固定，同时探查血管、神经。

[单选题]29. 缺血性肌挛缩常继发于下列哪一种损伤

- A. 肱骨干骨折
- B. 桡骨下端骨折
- C. 肘关节脱位
- D. 伸直型肱骨髁上骨折
- E. 屈曲型肱骨髁上骨折

正确答案：D

参考解析：由于伸直型肱骨骨折的近折端向前下移位，易损伤肱动脉，加上损伤后的水肿，导致前臂骨筋膜室综合征，处理不当就会出现前臂缺血性肌挛缩。

[单选题]30. 以下骨折中不易并发神经损伤的有

- A. 肱骨髁上伸直型骨折
- B. 肱骨干骨折
- C. 桡骨远端骨折
- D. 锁骨骨折

E. 尺骨上 1 / 3 骨折

正确答案： E

参考解析： 尺骨上 1 / 3 部位的周围没有重要的神经。

[单选题]31. 锁骨中段骨折移位情况正确的是

- A. 内侧段向后上方移位
- B. 内侧段向前下方移位
- C. 外侧段向后下方移位
- D. 外侧段向后上方移位
- E. 以上都不是

正确答案： A

参考解析： 锁骨中段骨折后内侧段向后上方移位，外侧段向前下方移位。

[单选题]32. 肱骨外科颈骨折易并发

- A. 腋神经损伤
- B. 肱动脉损伤
- C. 尺神经损伤
- D. 桡神经损伤
- E. 正中神经损伤

正确答案： A

参考解析： 腋神经靠近肱骨外科颈走行，相对易损伤。

[单选题]33. 肱骨骨折下列哪项不是绝对手术指征

- A. 伴有胫腓骨骨折
- B. 伴有大血管损伤
- C. 出现腕下垂
- D. 病理性骨折
- E. 开放性骨折

正确答案： D

参考解析： 肱骨骨折合并有血管、神经损伤，多发骨折，开放骨折都有切开复位的手术指征。良性肿瘤导致的病理骨折可以保守治疗。

[单选题]34. 伸直型桡骨下端骨折的畸形是

- A. 垂腕型
- B. 银叉型
- C. 尺偏型
- D. 爪型
- E. 僵硬型

正确答案： B

参考解析：

桡骨下端骨折多见于成年及老年伤员，骨折发生在桡骨下端 3cm 范围内。伸直型畸形表现为：“银叉或餐叉”型畸形：外伤后，因远折端移向背侧，侧面可见典型的“餐叉”型畸形；“枪刺刀”状畸形：因远折端向桡侧移位，且有缩短移位时桡骨茎突上移至尺骨茎突同一平面，甚至高于尺骨茎突的平面，呈“枪刺刀”畸形。

[单选题]35. 肱骨外科颈骨折的部位是

- A. 肱骨大、小结节交界处
- B. 肱骨大、小结节移行处为肱骨干的交界处
- C. 肱骨头周围的环形沟
- D. 肱骨头与肱骨干的交界处
- E. 肱骨上端干骺端处

正确答案：B

参考解析：肱骨外科颈为肱骨大结节、小结节移行处为肱骨干的交界部位，是松质骨和密质骨的交界处，位于解剖颈（肱骨头周围的环形沟）下 2~3cm，有臂丛神经、腋血管在内侧经过，因此骨折可合并神经、血管损伤。

[单选题]36. 男，30 岁，被枪弹击伤上臂中段，体检：垂腕，各手指不能伸直，拇指、示指、中指背侧麻木，肘关节屈伸活动正常。X 线示：肱骨中段见 1 个弹头形状的金属异物，骨质未见断裂。其最可能的神经损伤是

- A. 桡神经
- B. 正中神经
- C. 尺神经
- D. 臂丛神经
- E. 以上皆不正确

正确答案：A

参考解析：桡神经损伤：肌支主要支配臂和前臂后群肌及前群的肱桡肌。皮支主要分布于手背桡侧两个半指及相应手背皮肤。损伤后表现为“垂腕”，各手指掌指关节不能伸直，拇指不能背伸以及于背桡侧皮肤有大小不等的感觉麻木区。

[单选题]37. 6 岁男孩，摔倒时左手撑地。即出现左肘部疼痛、肿胀，桡动脉搏动减弱，最可能的诊断是

- A. 桡骨头半脱位
- B. 桡骨头骨折
- C. 肱骨髁上骨折
- D. 肱骨干骨折
- E. 尺骨鹰嘴骨折

正确答案：C

参考解析：儿童有手撑地受伤史，肘部出现疼痛、肿胀，桡动脉搏动减弱可诊断为肱骨髁上骨折。

[单选题]38. 伤后有垂腕表现，可能是

A. 肌损伤

B. 正中神经损伤

- C. 桡神经损伤
- D. 尺神经损伤
- E. 缺血性肌挛缩

正确答案：C

参考解析：桡神经损伤：肌支主要支配臂和前臂后群肌及前群的肱桡肌。皮支主要布于手背桡侧两个半指及相应手背皮肤。损伤后表现为“垂腕”，各手指掌指关节不能伸直，拇指不能背伸以及手背桡侧皮肤有大小不等的感觉麻木区。

[单选题]39. 伸直型肱骨髁上骨折多见于

- A. 老年女性
- B. 老年男性
- C. 儿童
- D. 中年女性
- E. 中年男性

正确答案：C

参考解析：伸直型肱骨髁上骨折好发年龄以 10 岁以下儿童为多，有时可有血管、神经损伤的严重并发症。

[单选题]40. 中年，男性，不慎跌倒摔伤右肩。以左手托右肘部来诊。头向右倾，体检见右肩下沉，右上肢功能障碍。胸骨柄至右肩峰连线中点隆起，并有压痛，其可能的诊断是

- A. 肩关节脱位
- B. 锁骨骨折
- C. 肱骨外科颈骨折
- D. 肩胛骨骨折
- E. 肱骨解剖颈骨折

正确答案：B

参考解析：锁骨骨折后局部有肿胀与瘀斑、疼痛，肩关节活动使疼痛加重。病人常用健侧手托住肘部，同时头部向患侧倾斜。

[单选题]41. 男孩儿童，左肘摔伤急诊就医，小夹板外固定后，前臂高度肿胀，手部青白发凉，麻木无力，经拍 X 线片，诊断为左肱骨髁上骨折，若不及时处理，其最可能的后果是

- A. 感染
- B. 缺血性骨坏死
- C. 骨化性肌炎
- D. 关节僵硬
- E. 缺血性肌挛缩

正确答案：E

参考解析：

患者前臂高度肿胀、手部青白发凉、麻木无力证明已有血运障碍，若不及时处理，其最可能的后果是出现缺血性肌挛缩。

[单选题]42. 23岁，男青年，外伤后右上臂明显肿胀畸形，肢体有缩短，右腕不能背伸，各指掌掌关节不能伸直，最合适的治疗方案是

- A. 手法复位外展支架固定
- B. 手法复位，小夹板外固定
- C. 手法复位，功能位石膏固定
- D. 手术切开复位内固定，同时探查桡神经
- E. 右上肢骨牵引，观察手部功能恢复情况

正确答案：D

参考解析：肱骨干中下1/3段后外侧有桡神经沟，有由臂丛神经后束发出的桡神经经内后方紧贴骨面斜向外前方进入前臂。因此，肱骨干骨折容易发生桡神经损伤。受伤后，上臂出现疼痛、肿胀、畸形、皮下瘀斑和上肢活动障碍。若合并桡神经损伤，可出现垂腕，各手指掌指关节小能背伸，拇指不能伸，前臂旋后障碍，手背桡侧皮肤感觉减退或消失。该患者受伤后患肢骨折有移位，缩短畸形，合并桡神经损伤。因此，正确的治疗方法是手术切开复位内固定，同时探查桡神经。

[单选题]43. 上肢止血带的压力应控制在

- A. 100~150mmHg
- B. 150~200mmHg
- C. 200~250mmHg
- D. 250~300mmHg
- E. 300~350mmHg

正确答案：D

参考解析：上肢止血带压力一般为250~300mmHg，若压力过高，可能引起止血带麻痹，桡神经、正中神经、尺神经损伤。

[单选题]44. 关于手的休息位，下列哪项不正确

- A. 腕关节背伸 20° ~ 25°
- B. 手处于自然静止状态
- C. 掌指关节和指间关节半屈曲位
- D. 腕关节背伸 10° ~ 15°
- E. 各指尖指向腕舟骨结节

正确答案：A

参考解析：腕关节休息位是指手处于自然静止状态的姿势。此时，手内在肌和外在肌、关节囊、韧带的张力处于相对平衡状态。表现为：腕关节背伸 10° ~ 15° ，轻度尺偏。掌指关节和指间关节半屈曲位，从示指到小指，越向尺侧屈曲程度越大，各指尖指向舟骨结节，拇指轻度向掌侧外展，其指腹接近或触及示指远侧指间关节桡侧。

[单选题]45. 关于动脉危象，下列哪项不正确

- A. 皮色苍白
- B. 皮温降低
- C. 毛细血管回流加快
- D. 毛细血管回流缓慢或消失
- E. 指腹瘪陷

正确答案：C

参考解析：当手指发生动脉危象时，手指皮色苍白，皮温降低，毛细血管回流缓慢或消失，指腹瘪陷. 动脉搏动消失。

[单选题]46. 当一手五指离断时，下列哪种再植顺序是正确的

- A. 环指—中指—小指—拇指—示指
- B. 拇指示指—中指—环指—小指
- C. 示指—中指—环指—小指—拇指
- D. 中指—拇指—示指—环指—小指
- E. 小指—环指—中指—示指—拇指

正确答案：B

参考解析：当五指完全离断时，再植时应以功能重要的优先，功能重要的顺序为：拇指、示指、中指、环指、小指。

[单选题]47. 神经修复后的固定时间正确的是

- A. 1~2 周
- B. 2~3 周
- C. 3~4 周
- D. 4~6 周
- E. 4~8 周

正确答案：D

参考解析：神经修复后应根据其缝合时张力的大小，固定 4~6 周，张力小时固定 4 周，张力大时固定 6 周。

[单选题]48. 手部损伤时，上肢止血带应上在哪个部位

- A. 腕部
- B. 前臂
- C. 肘部
- D. 上臂
- E. 上臂上段

正确答案：E

参考解析：上肢止血带应位于上臂上段，因为前臂有骨间掌侧和背侧动脉供血，止血带无法压迫它们，因而无法起到止血的作用。肘腕部亦如此。

[单选题]49. 下外伤后手指不能主动活动，被动正常，提示可能

- A. 手指的指骨骨折
- B. 手指的血供中断

- C. 手指的指神经损伤
- D. 手指的肌腱断裂
- E. 手指的关节脱位

正确答案：D

参考解析：手外伤后手指不能主动活动，提示有于指的肌腱断裂。

[单选题]50. 手外伤一般应争取在什么时间内清创

- A. 6~8 小时
- B. 0~12 小时
- C. 12~16 小时
- D. 16~20 小时
- E. 20~24 小时

正确答案：A

参考解析：清创应尽量能在伤后 8 小时之内完成。

[单选题]51. 正中神经返支损伤，拇指则出现

- A. 不能屈曲
- B. 不能内收
- C. 不能外展
- D. 不能对掌
- E. 不能伸拇

正确答案：D

参考解析：正中神经返支损伤可表现为拇指不能对掌。

[单选题]52. 保存断肢最好的方法是

- A. 放于冰水中
- B. 放于林格液中
- C. 放于无菌生理盐水中
- D. 干燥冷藏法保存
- E. 放于 75%的酒精中

正确答案：D

参考解析：现场对断肢的保存，最好的方法是干燥冷藏。

[单选题]53. 支配鱼际肌的神经为

- A. 尺神经
- B. 正中神经
- C. 桡神经
- D. 尺神经和正中神经
- E. 尺神经和桡神经

正确答案：D

参考解析：支配鱼际肌的神经虽然主要是正中神经，但其中的屈拇短肌的一个头是由尺神经支配。所以正确答案应该是 D。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/918037074074006130>