2024河南省新蔡县《执业药师之西药学专业二》考试必刷200题通关秘籍题库含答案

第Ⅰ部分 单选题（100题）

1.对爆发性或严重的组织胞浆菌感染首选的药物是

A：两性霉素B

B：灰黄霉素

C：伏立康唑

D：氟胞嘧啶

答案：A

2.下列关于胺碘酮的描述，错误的是

A：脂溶性高，口服、静脉注射均可

B：主要经肾脏排泄

C：是广谱抗心律失常药

D：在肝中代谢

答案：B

3.糖尿病合并发热、感染者可选用()

A：格列齐特

B：格列喹酮

C：胰岛素

D：格列吡嗪

答案：C

4.高浓度溶液对皮肤和黏膜产生刺激性灼伤，形成一疼痛“白痂”

A：硼酸

B：克罗米通

C：过氧化氢

D：羟甲唑啉

答案：C

5.能升高血糖，对抗胰岛素的降血糖作用的是

A：格列喹酮

B：磺胺甲唑

C：甲状腺素

D：普萘洛尔

答案：C

6.应用强心苷期间或停用后7日内不宜使用的药物是

A：氯化钠

B：枸橼酸钾

C：氯化钙

D：氯化钾

答案：C

7.蒙脱石散是

A：抗动力药

B：吸附剂

C：微生态制剂

D：抗分泌药

答案：B

8.可用于鼻部血管收缩的肾上腺素α受体激动药是

A: 复方薄荷油

B: 羟甲唑啉

C: 西地碘

D: 桃金娘油

答案：B

9.羟甲唑啉滴鼻剂使用期间，可能发生的不良反应是

A: 鼻衄

B: 心率加快

C: 血压下降

D: 流量

答案：B

10.铋剂连续服用不得超过2个月，是因为长期服用可导致()

A: 神经毒性

B: 舌苔变黑

C: 肝功能损害

D: 大便呈黑色

答案：A

11.糖尿病合并轻度肾功能不全患者宜选用

A: 格列喹酮

B: 二甲双胍

C: 正规胰岛素

D: 珠蛋白锌胰岛素

答案：A

12.螺内酯利尿的作用机制是

A: 抑制碳酸酐酶

B: 拮抗醛固酮

C: 抑制Na+，K+-2Cl-同向转运系统

D: 抑制Na+，K+-2Cl-转运系统

答案：B

13.静脉注射速度不宜超过50mg/min的是

A: 枸橼酸钾

B: 氯化钙

C: 氯化钾

D: 氯化钠

答案：B

14.用于治疗慢性功能性便秘，也可用于高氨血症的治疗的是

A: 开塞露

B: 酚酞

C: 聚乙二醇4000

D: 乳果糖

答案：D

15.属于雄激素类的是()

A: 睾酮

B: 他莫昔芬

C: 甲地孕酮

D: 己烯雌酚

答案：A

16.关于青霉素不良反应的说法不正确的是

A: 可发生过敏性休克、荨麻疹、血管神经性水肿等

B: 可引起接触性皮炎、血清病样反应等

C: 局部刺激症状如注射部位疼痛、硬结较常发生

D: 有明显的肾毒性和耳毒性

答案：D

17.干扰敏感菌有丝分裂，对深部真菌无效的药物是

A: 两性霉素B

B: 灰黄霉素

C: 伏立康唑

D: 氟胞嘧啶

答案：B

18.常见体位性低血压的是

A: 非那雄胺

B: 十一酸睾酮

C: 多沙唑嗪

D: 舍尼通

答案：C

19.（2018年真题）不属于减鼻充血药的是（）

A: 麻黄碱

B: 伪麻黄碱

C: 羟甲唑啉

D: 色甘酸钠

答案：D

20.属于留钾利尿药的是

A: 依他尼酸
B: 依普利酮
C: 布美他尼
D: 托拉塞米
答案：B

21.很少单独缺乏，常伴其他维生素缺乏，大量服用可使尿液变黄，该物质是
A: 精氨酸
B: 维生素AD
C: 维生素B2
D: 维生素C
答案：C

22.通过改变虫体肌细胞膜的离子通透性发挥驱虫作用，适用于儿童，常见制剂为宝塔糖的药品是
A: 氯喹
B: 噻嘧啶
C: 青蒿素
D: 哌嗪
答案：D

23.肥胖性2型糖尿病患者控制血糖的一线药物是
A: 格列吡嗪
B: 格列齐特
C: 二甲双胍
D: 格列本脲
答案：C

24.华法林应用过量可选用的拮抗药是

A: 葡萄糖酸钙

B: 氨基己酸

C: 鱼精蛋白

D: 维生素K1

答案：D

25.（2019年真题）患者，女75岁，既往有2型糖尿病史18年，有青霉素过敏史，因车祸导致左下肢开放性骨折，术后发生骨髓炎，给予克林霉素治疗10余天，临床应关注的典型不良反应是（）

A: 急性溶血性贫血

B: 红人综合征

C: 肌肉震颤

D: 抗生素相关性腹泻

答案：D

26.患儿，女，10岁，体重35kg，因发热、咳嗽10日而入院。体温波动于38．5℃～39．5℃之间，咳嗽为刺激性干咳，少痰，以清晨及夜间为著。于外院先后静点青霉素及头孢类抗生素共6日，病情无明显好转。查体：一般状态良，双肺呼吸音粗糙，余无阳性体征。血常规正常，结核菌素试验阴性，X线胸片示右肺中叶大片状阴影。临床诊断考虑为支原体肺炎。

A: 莫西沙星

B: 甲硝唑

C: 阿奇霉素

D: 氟康唑

答案：C

27.抑制过敏介质释放，主要用于预防哮喘发作的药物是

A：异丙肾上腺素

B：色甘酸钠

C：特布他林

D：倍氯米松

答案：B

28.用1%麻黄素液滴鼻的主要目的是

A：收缩鼻黏膜，抑制腺体分泌

B：收缩鼻黏膜，改善鼻通气和鼻窦引流

C：收缩血管，降低其通透性

D：收缩血管，减轻炎症反应

答案：B

29.（2020年真题）患者，女，26岁。因心悸、手颤、易饥饿、烦躁易怒前来就诊，实验室检查游离甲状腺素(FT3、FT4)增高、促甲状腺素(TSH)降低，诊断为甲状腺功能亢进症。医师处方给予抗甲状腺药治疗。

A：碳酸锂

B：普萘洛尔

C：丙硫氧嘧啶

D：甲巯咪唑

答案：D

30.纳洛酮治疗的疾病或症状有

A：剧烈疼痛

B：惊厥

C: 阿片中毒

D: 失眠

答案：C

31.以肝细胞膜损害为主的急慢性肝炎患者,宜使用的药物是

A: 葡醛内酯

B: 多烯磷脂酸胆碱

C: 甘草酸二铵

D: 还原型谷胱甘肽

答案：B

32.滴眼后可能导致再生障碍性贫血的抗菌药物是

A: 妥布霉素

B: 氯霉素

C: 庆大霉素

D: 左氧氟沙星

答案：B

33.可用于中、重度细菌性感染，半衰期长，可以一日1次给药的是

A: 美罗培南

B: 西司他丁

C: 厄他培南

D: 亚胺培南

答案：C

34.患者女，55岁。晨练时突发窦性心动过速，症状持续不缓解，紧急人院，查体：138/90mmHg，心率120次/分，眼压高，医嘱普萘洛尔治疗。

A: 2天
B: 4天
C: 6天
D: 8天
答案：B

35.可用于治疗青光眼的是
A: 新斯的明
B: 阿托品
C: 哌替啶
D: 毛果芸香碱
答案：D

36.主要作用促使细胞中微管装配，抑制微管解聚的抗肿瘤药物是
A: 氟尿嘧啶
B: 紫杉醇
C: 放线菌素
D: 顺铂
答案：B

37.脂溶性强，能透过血一脑屏障，可通过阻断M1受体产生镇静、失眠、意识混乱和认知障碍等不良反应，用于治疗膀胱过度活动症用药的是
A: 托特罗定
B: 黄酮哌酯
C: 奥昔布宁
D: 索利那新
答案：C

38.下列对皮肤真菌感染治疗药叙述错误的是()

A：酮康唑为咪唑类抗真菌药

B：环吡酮胺为吡啶酮类抗真菌药

C：阿莫罗芬为唑类的局部抗真菌药

D：奈替芬是丙烯胺类抗真菌药

答案：C

39.（2015年真题）患者，男，56岁。有高血压病史4年。体检：血压156/96mmHg，无主动脉狭窄。医师处方依那普利片控制血压。该患者用药过程中可能发生的典型不良反应是（）。

A：低血糖

B：光过敏

C：水肿

D：干咳

答案：D

40.属于环氧酶抑制剂的是

A：阿司匹林

B：双嘧达莫

C：替格瑞洛

D：乙酰唑胺

答案：A

41.与胰岛素合用治疗高钾血症的药物是()

A：葡萄糖

B：碳酸钙

C：三磷酸腺苷

D: 二磷酸果糖

答案：A

42.高效选择性5-HT

A: 多潘立酮

B: 莫沙必利

C: 甲氧氯普胺

D: 西沙必利

答案：B

43.第一代蒽环类抗肿瘤药物，主要用于急性白血病的药物是

A: 多柔比星

B: 表柔比星

C: 柔红霉素

D: 吡柔比星

答案：C

44.关于甲氨蝶呤，下列说法中错误的是

A: 强酸条件下的水解产物是谷氨酸和蝶呤酸

B: 是二氢叶酸合成酶抑制剂

C: 是二氢叶酸还原酶抑制剂

D: 主要用于治疗急性白血病

答案：B

45.药师在急诊药房值班时，接听病房咨询电话，得知一新入院耐甲氧西林金黄色葡萄球菌肺部感染的7岁儿童患者，出现高热、肺纹理加重，患儿肾功能正常。欲静脉滴注万古霉素。

A: 40mg/kg

B: 60mg&g

C: 5mg / kg

D: 15mg / kg

答案：A

46.（2015年真题）可与吸入性糖皮质激素合用的长效M胆碱受体阻断剂是（）。

A: 噻托溴铵

B: 孟鲁司特

C: 多索茶碱

D: 沙美特罗

答案：A

47.属于 β2受体激动剂的是

A: 异丙托溴铵

B: 乙酰胆碱

C: 孟鲁司特

D: 福莫特罗

答案：D

48.与鲑降钙素合用，有可能急速降血钙，出现严重低钙血症的是

A: 维生素D

B: 双膦酸盐类骨吸收抑制剂

C: 钙剂

D: 铁剂

答案：B

49.急性缺血性脑卒中发作，应用溶栓药治疗时间窗是在发病后

A: 24小时内

B: 12小时内

C: 3小时内

D: 8小时内

答案：C

50.下列选项中，主要用于控制疟疾复发和传播的药物是()。

A: 氯喹

B: 伯氨喹

C: 青蒿素

D: 奎宁

答案：B

51.（2018年真题）蒽醌类抗肿瘤药柔红霉素可引起心脏毒性,临床应用的解毒方案是（）

A: 在用柔红霉素后30min,使用柔红霉素2倍量的右雷佐生

B: 在用柔红霉素前30min,使用柔红霉素2倍量的氟马西尼

C: 在用柔红霉素同时,使用柔红霉素等量的右雷佐生

D: 在用柔红霉素前30min,使用柔红霉素10倍量的右雷佐生

答案：D

52.应用华法林抗凝的过程中出现严重出血时，可应用的急救药物是()

A: 维生素K

B: 维生素B

C: 维生素K

D: 维生素K

答案：D

53.2岁以下儿童腹泻，禁用的药品是

A：双八面体蒙脱石散

B：双歧三联活菌胶囊

C：盐酸洛哌丁胺胶囊

D：地衣芽孢杆菌胶囊

答案：C

54.属于高效利尿剂，耳毒性低，适用于有听力缺陷及急性肾衰竭患者的药物是

A：布美他尼

B：呋塞米

C：托拉塞米

D：依他尼酸

答案：A

55.患者，男，45岁。以"间断巩膜黄染伴腹胀2年，加重1周"之主诉入院。患者2年前无明显诱因出现巩膜黄染，伴有腹胀，在当地医院诊断为酒精性肝硬化。1周前患者上述症状加重，胃镜检查：胃溃疡(A

A：复方甘草酸苷

B：氢化可的松琥珀酸钠

C：水飞蓟宾

D：还原型谷胱甘肽

答案：A

56.属于Ⅰa类抗心律失常药的是

A：奎尼丁

B：胺碘酮

C：利多卡因

D: 普罗帕酮

答案：A

57.抑制叶酸合成的抗癌药物是

A: 阿糖胞苷

B: 环磷酰胺

C: 顺铂

D: 甲氨蝶呤

答案：D

58.患者，女，60岁。凌晨突发脚痛，查体尿酸水平偏高，临床诊断为高尿酸血症，医生处方秋水仙碱胶囊、塞来昔布胶囊、碳酸氢钠治疗。

A: 短期口服给药

B: 长期口服给药

C: 注射给药

D: 注射与口服并用

答案：A

59.促进钙吸收()

A: 依降钙素

B: 葡萄糖酸钙

C: 阿法骨化醇

D: 阿仑膦酸钠

答案：C

60.用于高血压、冠心病、心绞痛的是

A: 绒促性素

B: 硝苯地平

C: 米非司酮

D: 噻嘧啶

答案：B

61.以下属于袢利尿药的禁忌证的是()

A: 高血压

B: 对试验剂量无反应的无尿者

C: 高钾血症

D: 高血糖

答案：B

62.阿卡波糖降血糖作用的机制是

A: 竞争性抑制 α-葡萄糖苷酶，减少碳水化合物的水解

B: 增强胰岛素的作用

C: 提高靶细胞对胰岛素的敏感性

D: 拮抗胰岛高血糖素的作用

答案：A

63.长期使用可引起听力减退、肾功能下降的抗结核药物是（）

A: 吡嗪酰胺

B: 乙胺丁醇

C: 链霉素

D: 利福平

答案：C

64.硫脲类药物的不良反应不包括()

A: 发热

B：诱发甲亢

C：过敏反应

D：粒细胞减少

答案：B

65.硝酸酯类、β 受体阻断药、Ca

A：减慢心率

B：降低心肌耗氧量

C：缩小心室容积

D：扩张冠状动脉

答案：B

66.骨化三醇可引起高钙血症，在服药后应监测血钙和血肌酐浓度，首次监测的时间建议是

A：服药后第6个月

B：服药后第4周

C：服药后第3个月

D：服药后第2周

答案：B

67.磺酰脲类药物最常见的不良反应

A：共济失调

B：腹痛、腹泻

C：眩晕嗜睡

D：低血糖

答案：D

68.具有杀灭痤疮丙酸杆菌作用，用于治疗痤疮的药品是

A：过氧苯甲酰

B：异维A酸

C：阿达帕林

D：维A酸

答案：A

69.能治疗强心苷中毒引起的窦性心动过缓的是

A：苯妥英钠

B：利血平

C：阿托品

D：哌替啶

答案：C

70.洋地黄毒苷的半衰期是()

A：7天以上

B：5天

C：72小时

D：48小时

答案：A

71.（2020年真题）使用奥沙利铂后最需要关注的典型不良反应是

A：肾毒性

B：消化道反应

C：神经毒性

D：肝毒性

答案：C

72.无雌激素、雄激素、肾上腺皮质激素样作用代谢物没有雌激素活性,可用于黄体功能不足的先兆流产治疗的药物是

A: 环丙孕酮

B: 屈螺酮

C: 地屈孕酮

D: 甲羟孕酮

答案：C

73.吗啡的镇痛作用机制主要是

A: 诱发精神错乱

B: 增强镇静作用

C: 加重呼吸抑制

D: 增强止痛效果

答案：B

74.肾上腺糖皮质激素类药物对电解质的影响是

A: 抑制磷的排泄

B: 抑制钙的排泄

C: 抑制钠的排泄

D: 抑制钾的排泄

答案：C

75.因易导致新生儿溶血,妊娠晚期妇女禁用的抗菌药物是（）

A: 呋喃妥因

B: 甲硝唑

C: 苄星青霉素

D: 庆大霉素

答案：A

76.耐甲氧西林金黄色葡萄球菌感染宜首选的抗菌药物是()。

A: 利奈唑胺

B: 罗红霉素

C: 头孢曲松

D: 头孢他啶

答案：A

77.下列常用于防止癌症化疗引起呕吐的糖皮质激素是

A: 甲泼尼龙

B: 地塞米松

C: 泼尼松

D: 泼尼松龙

答案：B

78.抗阿米巴原虫药的药物是()。

A: 氯喹

B: 甲硝唑

C: 伯氨喹

D: 奎宁

答案：B

79.在妊娠期，尤其是妊娠末期或分娩期不宜应用，易发生"灰婴综合征"的药物是()

A: 青霉素

B: 四环素

C: 氯霉素

D: 多西环素

答案：C

80.（2018年真题）属于肾上腺受体激动剂的降眼压药是（）

A：噻吗洛尔

B：地匹福林

C：毛果芸香碱

D：拉坦前列素

答案：B

81.主要以原型经肾脏排泄，终末消除相的时间较长，滴注后2～28日内在血浆中仍保持较低浓度，终末消除半衰期为146小时的是

A：依替膦酸二钠

B：阿仑膦酸钠

C：唑来膦酸

D：帕米膦酸二钠

答案：C

82.糖尿病患者、颅内活动性出血患者禁用()

A：甘油

B：硫酸镁

C：乳果糖

D：聚乙二醇4000

答案：A

83.属于广谱抗心律失常药物的是()

A：苯妥英钠

B：地高辛

C：利多卡因

D: 胺碘酮

答案：D

84.为克服服药初期的类早孕反应，双炔失碳酯肠溶片成分中增加了

A: 去氧孕烯

B: 维生素B6

C: 甲羟孕酮和炔雌醇

D: 炔雌醇

答案：B

85.可减弱吲达帕胺降压作用的是

A: 多巴胺

B: 考来烯胺

C: 拟交感药

D: 胺碘酮

答案：C

86.严重低钾血症、高钠血症、高血压、心力衰竭、肾功能衰竭者禁用的药物是

A: 甘草酸二铵

B: 雷尼替丁

C: 多烯磷脂酰胆碱

D: 甲氧氯普胺

答案：A

87.复方左炔诺孕酮片、去氧孕烯炔雌醇片、复方孕二烯酮片均含有的成分是

A：维生素B6

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：
https://d.book118.com/918051000043007022