

2024 海南省陵水黎族自治县《执业药师之西药学专业二》考试必背 200 题大全附参考答案（考试直接用）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 专供糖尿病患者使用的肠内全营养制剂的是

- A: 视黄酸
- B: TPF-D
- C: TP
- D: 视黄醇

答案：B

2. 下列属于超短效胰岛素的是()

- A: 门冬胰岛素
- B: 甘精胰岛素
- C: 精蛋白锌胰岛素
- D: 低精蛋白锌胰岛素

答案：A

3. 脂溶性较高，起效快，属于巴比妥类的镇静催眠药是()。

- A: 阿普唑仑
- B: 地西洋
- C: 异戊巴比妥
- D: 佐匹克隆

答案：C

4. 促使脓性痰中 DNA 分解，使脓痰黏度下降的药物是

- A: 氨溴索
- B: 乙酰半胱氨酸
- C: 糜蛋白酶
- D: 表面活性剂

答案：C

5. 某患者新诊断为退行性膝关节炎，既往有磺胺过敏史，不宜选用的非甾体抗炎药是（）

- A: 双氯芬酸
- B: 塞来昔布
- C: 布洛芬
- D: 吲哚美辛

答案：B

6. 治疗钙缺乏症（）

- A: 葡萄糖酸钙
- B: 阿仑膦酸钠
- C: 依降钙素
- D: 阿法骨化醇

答案：A

7. 抗瘤谱较广，恶性淋巴瘤疗效显著，还可治疗自身免疫性疾病的药物是（）

- A: 环磷酰胺
- B: 塞替派
- C: 丝裂霉素
- D: 奥沙利铂

答案：A

8. 长期大量使用林旦后可导致的不良反应是

- A: 肝脏损害
- B: 眼部水肿
- C: 中枢神经系统毒性
- D: 白细胞减少

答案：C

9. 可使维生素 B

- A: 糖皮质激素
- B: 雌激素
- C: 丙磺舒
- D: 异烟肼

答案：B

10. 患者，诊断为感染性心内膜炎，血液细菌培养为草绿色链球菌，拟用青霉素 G 和下列其中一药合用，应选

- A: 红霉素
- B: 奈替米星
- C: 庆大霉素
- D: 阿莫西林

答案：C

11. 阿昔洛韦的作用靶点是

- A: HIV-1 和 HIV-2 蛋白酶
- B: 神经氨酸酶
- C: HIV-1 反转录酶

D: 脱氧核糖核酸聚合酶

答案：D

12. 阻断 H

A: 奥美拉唑

B: 雷尼替丁

C: 氢氧化铝

D: 哌仑西平

答案：B

13. 下列属于新型非苯二氮

A: 阿普唑仑

B: 佐匹克隆

C: 劳拉西泮

D: 地西泮

答案：B

14. 婴儿尿布皮炎外用激素制剂应限于

A: 5~7 天

B: 3~5 天

C: 2 周

D: 3 天

答案：A

15. 盐酸多柔比星属于

A: 烷化剂

B: 抗代谢类抗肿瘤药物

C: 抗肿瘤抗生素类

D: 生物碱类

答案: C

16. 螺内酯临床常用于()

A: 脑水肿

B: 醛固酮升高引起的水肿

C: 急性肾衰竭

D: 尿崩症

答案: B

17. 男性，68 岁，发热伴咳嗽 1 周，表情淡漠，气急，近 2 天全身散在出血点及瘀斑，血压 60/40mmHg，血红蛋白 120g/L，白细胞 $12 \times 10^9/L$

A: 维生素 K

B: 鱼精蛋白

C: 维生素 C

D: 低分子肝素

答案: B

18. 属于核苷(酸)类抗肝炎病毒药的是

A: 阿昔洛韦

B: 奥司他韦

C: 司他夫定

D: 恩替卡韦

答案: D

19. 通过阻断血管紧张素 II 受体而逆转心肌肥厚，减轻心力衰竭的药物是

A: 美托洛尔

B: 氯沙坦

C: 氨力农

D: 地高辛

答案：B

20. 下述哪种疾病不适合外用糖皮质激素治疗

A: 钱币状湿疹

B: 未根治的体股癣

C: 固定性药疹

D: 异位性皮炎

答案：B

21. 尼尔雌醇属于

A: 雌激素

B: 孕激素

C: 糖皮质激素

D: 雄激素

答案：A

22. 洛伐他汀的作用是()

A: 主要影响胆固醇吸收

B: 主要影响甘油三酯合成

C: 影响脂蛋白合成、转运及分解

D: 主要影响胆固醇合成

答案：D

23. (2017 年真题) 眼底散瞳检查宜选用 ()

A: 氯霉素滴眼剂

B: 拉坦前列素滴眼剂

C: 托吡卡胺滴眼剂

D: 碘苷滴眼剂

答案：C

24. 以下属于第三代头孢菌素的是

A: 头孢噻肟

B: 头孢羟氨苄

C: 头孢克洛

D: 头孢噻吩

答案：A

25. 异烟肼联用对乙酰氨基酚使

A: 月经不规则

B: 肝毒性增加

C: 疗效减弱

D: 吸收减少

答案：B

26. 可引起血钾、血钙降低，血尿素氮、肌酐及尿酸升高的是

A: 氢氯噻嗪

B: 依他尼酸

C: 醛固酮

D: 乙酰唑胺

答案：A

27. 甲羟孕酮口服用于功能性闭经的用法用量是

专业《执业药师之西药学专业二》考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

A: 口服，一次 10~20mg，每 4~8 小时一次，连用 2~3 日；血止后每隔 3 日递减 1/3 剂量，直至维持量每日 100mg，连续用药至血止后 21 日停药

B: 口服一日 4~8mg，连服 5~10 日

C: 于月经后半周期(撤退性出血的第 16~25 日)开始口服，一次 10mg，一日 1 次，连用 10~14 日，酌情应用 3~6 个周期

D: 一日 30mg，连服 6 个月

答案：B

28. 阿哌沙班属于

A: 促凝血因子合成药

B: 直接凝血酶抑制剂

C: 凝血因子 Xa 抑制剂

D: 维生素 K 拮抗剂

答案：C

29. 蛇毒血凝酶的给药方式不包括

A: 皮内注射

B: 皮下注射

C: 静脉注射

D: 肌肉注射

答案：A

30. 属于 Ib 类抗心律失常药且具有抗癫痫作用的是()

A: 利多卡因

B: 维拉帕米

C: 普鲁卡因胺

D: 苯妥英钠

答案：D

31. 药师在急诊药房值班时，接听病房咨询电话，得知一新入院耐甲氧西林金黄色葡萄球菌肺部感染的 7 岁儿童患者，出现高热、肺纹理加重，患儿肾功能正常。欲静脉滴注万古霉素。患者可能发生与静脉滴注速度有关的不良反应是（）

- A: 血糖异常
- B: 急性肝衰竭
- C: 高血压危象
- D: 红人综合征

答案：D

32. 物质代谢过程中催化"一碳单位"转移反应的辅酶组成成分是

- A: 维生素 A
- B: 叶酸
- C: 维生素
- D: 维生素 B

答案：B

33. 维生素 K

- A: 促进凝血因子合成
- B: 抑制血小板聚集
- C: 促进四氢叶酸类辅酶的循环利用
- D: 促进纤溶

答案：A

34. 主要治疗躁狂症，对躁狂和抑郁交替发作的双相情感性精神障碍有很好的治疗和预防的药物是

- A: 利培酮
- B: 碳酸锂
- C: 阿立哌唑
- D: 氯氮平

答案：B

35. 属于 NK-1 受体阻断剂的止吐药物是

- A: 甲地孕酮
- B: 格雷司琼
- C: 阿瑞吡坦
- D: 甲氧氯普胺

答案：C

36. 奎尼丁对心肌细胞膜的作用主要是()

- A: 促进 K
- B: 促进 Ca
- C: 抑制 Ca
- D: 抑制 Na

答案：D

37. 四环素联用红霉素使

- A: 调整抗凝血药的剂量
- B: 口服吸收减少
- C: 增加麦角中毒的风险
- D: 肝毒性增加

答案：D

38. (2015 年真题) 属于多巴胺 D2 受体阻断剂的是 ()。

- A: 奥美拉唑
- B: 法莫替丁
- C: 多潘立酮
- D: 氯苯那敏

答案：C

39. 重度致吐性化疗药所引起恶心呕吐的治疗应选

- A: 每日化疗前，应用 5-HT₃ 受体阻断剂或口服地塞米松
- B: 奥美拉唑+口服地塞米松
- C: 5-HT₃ 受体阻断剂+口服地塞米松+阿瑞吡坦
- D: 5-HT₃ 受体阻断剂+口服地塞米松

答案：C

40. 属于 DNA 多聚酶抑制剂的是

- A: 甲氨蝶呤
- B: 吉西他滨
- C: 巯嘌呤
- D: 长春瑞滨

答案：B

41. 下列具有抗血小板作用的药物是

- A: 肝素
- B: 噻氯匹定
- C: 维生素 K
- D: 华法林

答案：B

42. 属于神经激肽-1 受体阻断剂的止吐药是()。

- A: 阿瑞吡坦
- B: 托烷司琼
- C: 甲氧氯普胺
- D: 维生素 B

答案：A

43. 用于高钾血症或普鲁卡因胺引起的心律失常伴有酸血症者的药品是
()

- A: 谷氨酸
- B: 乳酸钠
- C: 硫酸镁
- D: 氯化钾

答案：B

44. 四环素联用麦角生物碱

- A: 口服吸收减少
- B: 增加麦角中毒的风险
- C: 肝毒性增加
- D: 调整抗凝血药的剂量

答案：B

45. 关于地西泮的叙述，错误的是

- A: 在临床上可用于缓解炎症引起的反射性肌肉痉挛
- B: 抗癫痫作用强，可用于治疗癫痫小发作
- C: 抗焦虑作用时间长，是临床上常用的抗焦虑药之一
- D: 是一种长效镇静催眠药物

答案：B

46. 可产生 β 拟交感神经效应，刺激黏膜纤毛运动，增强黏膜纤毛清除功能的是

- A: 羟甲唑啉
- B: 桃金娘油
- C: 西地碘
- D: 复方薄荷油

答案：B

47. 以上药物镇咳作用最弱的是

- A: 喷托维林
- B: 右美沙芬
- C: 吗啡
- D: 可待因

答案：A

48. 患者男性，29 岁，阴茎头部出现下疳两个月就诊。有不洁性接触史。临床诊断为梅毒。立即给予青霉素注射治疗，十分钟后患者出现胸闷，全身瘙痒、面部发麻，查体：血压 85/60mmHg，脉率 110 次/分。

- A: 减少药物剂量
- B: 给予糖皮质激素
- C: 吸氧，给予普萘洛尔
- D: 给予肾上腺素

答案：D

49. (2017 年真题) 前庭功能失调 (眩晕) ()

- A: 哌拉西林
- B: 米诺环素
- C: 左氧氟沙星

D: 甲硝唑

答案: B

50. 噻托溴铵平喘的主要机制是 ABCDE

A: 拮抗 M 胆碱受体

B: 阻断腺苷受体

C: 激动肾上腺素 β_2 受体

D: 抑制白三烯受体

答案: A

51. 患者，男，38 岁。因“发作性喘息”3 个月入院，发作时憋喘、全身大汗、端坐不能平卧，肺部可闻及哮鸣音。诊断为支气管哮喘，静脉滴注地塞米松。

A: 氨茶碱

B: 特布他林

C: 氟替卡松

D: 异丙托溴铵

答案: C

52. 铁剂用于治疗

A: 巨幼红细胞性贫血

B: 溶血性贫血

C: 小细胞低血红蛋白性贫血

D: 再生障碍性贫血

答案: C

53. 治疗血吸虫病的药物是()

A: 乙胺嗪

B: 甲硝唑

C: 吡喹酮

D: 氯喹

答案: C

54. 袢利尿药中，耳毒性最小，对听力有缺陷及急性肾衰竭者宜选用的药物是()

A: 托拉塞米

B: 布美他尼

C: 依他尼酸

D: 呋塞米

答案: B

55. 减少胃肠道对氢氯噻嗪的吸收，应在口服该药 1 小时前或 4 小时后服用氢氯噻嗪，该药是

A: 多巴胺

B: 胺碘酮

C: 考来烯胺

D: 拟交感药

答案: C

56. 下列关于胺碘酮的叙述错误的是

A: 对室上性和室性心律失常均有效

B: 促心率失常反应少

C: 适用于合并器质性心脏病的心率失常

D: 可以用于窦房传导阻滞

答案: D

57. 2 岁以下儿童用药可能会发生致死性肝损害，临床用药需要重点关注的抗癫痫药是()

- A: 氯硝西洋
- B: 苯巴比妥
- C: 丙戊酸钠
- D: 苯妥英钠

答案：C

58. 下列关于肝素类药物的抗凝血作用描述正确的是

- A: 体内、体外均有强大的抗凝作用
- B: 仅在体内有效
- C: 仅在体外有效
- D: 用药 2 个月后需检测血小板计数

答案：A

59. 大剂量炔诺酮()

- A: 减少精子数目
- B: 促进蛋白质合成
- C: 抑制排卵作用
- D: 抗着床

答案：D

60. 按作用时间分类，属于超长效的胰岛素 / 胰岛素类似物的是

- A: 预混胰岛素
- B: 地特胰岛素
- C: 普通胰岛素
- D: 精蛋白锌胰岛素

答案：B

61. 头孢菌素类药的主要作用靶点是

- A: 细胞内膜 PBP
- B: 核糖体的 30S 亚基
- C: 细胞壁丙氨酰丙氨酸
- D: 核糖体的 50S 亚基

答案：A

62. 可用于金黄色葡萄球菌等革兰阳性菌所致严重感染的是

- A: 磷霉素钠+万古霉素
- B: 利奈唑胺+苯丙醇胺
- C: 利奈唑胺+哌替啶
- D: 磷霉素氨丁三醇

答案：A

63. 患者，男，65 岁。高血压病史 8 年，血压峰值 180/110mmHg，冠心病史 5 年，双侧肾动脉狭窄，不宜选用的抗高血压药是

- A: 巴达帕胺
- B: 普萘洛尔
- C: 赖诺普利
- D: 氨氯地平

答案：C

64. 属于抗雄激素类，可用于晚期前列腺癌治疗的药品是

- A: 他莫昔芬
- B: 乙烯雌酚
- C: 氟他胺
- D: 托瑞米芬

答案：C

65. 有促进骨骼致密作用，可用于绝经期妇女治疗骨质疏松的药物是

- A: 短效口服避孕药
- B: 雌激素
- C: 孕激素
- D: 长效避孕药

答案：B

66. (2015 年真题) 属于超强效的外用糖皮质激素是 ()。

- A: 曲安奈德
- B: 氢化可的松
- C: 地塞米松
- D: 卤米松

答案：D

67. 患者，女，54 岁，诊断为右侧乳腺浸润性导管癌术后，病理示：右乳浸润性导管癌 II 级，同侧腋下淋巴结 1 / 18，免疫组化：ER(-)，PR(-)，Her(+). 肝肾功能正常。化疗方案为环磷酰胺+多柔比星+多西他赛。

- A: 骨髓功能抑制
- B: 腰椎间盘突出
- C: 严重心脏病
- D: 妊娠及哺乳期妇女

答案：B

68. 多黏菌素主要作用于

- A: 革兰阴性杆菌

- B: 厌氧菌
- C: 革兰阳性菌
- D: 支原体

答案：A

69. 对革兰阳性菌作用强，对革兰阴性菌作用弱的药物是

- A: 第四代头孢菌素
- B: 第三代头孢菌素
- C: 第二代头孢菌素
- D: 第一代头孢菌素

答案：D

70. 属于促凝血因子合成药的是

- A: 鱼精蛋白
- B: 氨甲环酸
- C: 甲苯氢醌
- D: 酚磺乙胺

答案：C

71. 应用曲妥珠单抗治疗乳腺癌前对患者必须进行基因筛查，筛查的项目是()

- A: 表皮生长因子受体
- B: 血管内皮生长因子
- C: 人表皮生长因子受体-2
- D: B 淋巴细胞表面的 CD20 抗原

答案：C

72. 患儿，男，7 岁。长期偏食。近 1 个月面色渐苍白，自诉全身无力。体检：肝肋下 4cm，脾肋下 1cm。血常规：Hb70g / L，RBC 3.0×10^{12} / L，Ret2. 0%，WBC、Plt 均正常，MCV74fl，MCH26pg，MCHC30%，考虑为缺铁性贫血。

- A: 血清铁蛋白
- B: 血小板数量
- C: 血红蛋白测定
- D: 网织红细胞计数

答案：B

73. 镇静催眠药佐匹克隆的禁忌证是（）

- A: 重症肌无力
- B: 低蛋白血症
- C: 糖尿病
- D: 癫痫

答案：A

74. 硫脲类药物的不良反应不包括（）

- A: 粒细胞减少
- B: 过敏反应
- C: 诱发甲亢
- D: 发热

答案：C

75. 可引起尖端扭转型室性心律失常的药物是

- A: 异烟肼
- B: 吡嗪酰胺
- C: 红霉素

D: 乙胺丁醇

答案: C

76. 患者，女，56 岁，血清总胆固醇和低密度脂蛋白胆固醇异常，初诊医师建议首先改变生活方式(控制饮食、增加运动)。一个月后复查血脂水平仍未达标，医师处方辛伐他汀片 20mg/d 治疗。若采用强化治疗，辛伐他汀片的最大日剂量是()。

A: 40mg

B: 80mg

C: 20mg

D: 100mg

答案: B

77. 拮抗双香豆素类过量引起出血的适宜解毒药物是

A: 维生素 K

B: 氨甲环酸

C: 鱼精蛋白

D: 氨甲苯酸

答案: A

78. 克拉霉素与阿呋唑嗪合用，阿呋唑嗪的血药浓度水平显著升高，这是因为克拉霉素抑制

A: UGT287

B: p-糖蛋白

C: 血浆蛋白

D: CYP3A4

答案: D

79. 下列不属于局麻药物作用特点的是

- A: 可逆性阻断神经冲动产生和传导
- B: 作用消失后神经功能不可完全恢复
- C: 对各类组织无损伤性影响
- D: 可暂时、完全阻断神经传导

答案：B

80. 非麻醉性镇痛药中属于中枢性镇痛药的是

- A: 秋水仙碱
- B: 曲马多
- C: 布洛芬
- D: 吗啡

答案：B

81. 高血压合并痛风者不宜使用

- A: 氢氯噻嗪
- B: 依那普利
- C: 硝苯地平
- D: 阿替洛尔

答案：A

82. 维生素 K 参与合成的凝血因子不包括

- A: 凝血因子 VIII
- B: 凝血因子 IX
- C: 凝血因子 VII
- D: 凝血因子 II

答案：A

83. 患者，男，56 岁，有高血压病史 4 年，体检：血压 156/96mmHg，无主动脉狭窄。医师处方依那普利片控制血压。

- A: 血钙
- B: 血氯
- C: 血钾
- D: 血钠

答案：C

84. 可引起乳房肿大的药物是()

- A: 西咪替丁
- B: 阿司咪唑
- C: 组胺
- D: 苯海拉明

答案：A

85. 硝酸酯类药物舒张血管的作用机制是

- A: 激动血管平滑肌上的 β_2 受体，使血管扩张
- B: 产生 NO，激活腺苷酸环化酶，使细胞内 cAMP 升高
- C: 抑制磷酸二酯酶
- D: 产生 NO，激活鸟苷酸环化酶，使细胞内 cGMP 升高

答案：D

86. 下列哪种药物可使关闭的房角重新开放，从而降低眼内压

- A: 左氧氟沙星
- B: 毛果芸香碱
- C: 噻吗洛尔
- D: 丙美卡因

专业《执业药师之西药学专业二》考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

答案：B

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/918077032042007022>