


小儿泄泻的中医调护





目录

一、腹泻的概述

二、腹泻的病因病机

（一）、西医腹泻的病因

（二）、中医的病因病机

三、中医辨证

（一）、辨证论治


（二）、辨证施护

五、我院儿科的中医特色治疗



2002年发展中国家5岁以下儿童主要死因


WHO/UNICEF. Clinical management of acute diarrhea, 2004



概述

西医病名定义


腹泻是一组由多病原、多因素引起的以大便次数增多和大便性状改变为特点的消化道综合征。






概述

中医病名定义

- 中医将腹泻称为泄泻是由于湿盛与脾胃功能失调所致的排便次数增多、粪质稀薄或完谷不化，甚至泻出如水样为特征的病症。
 - 古代以大便溏薄、次数稍增者为泄，大便清稀、量多如水而直下者为泻，现在统称为泄泻。
- 



概述

- 年龄：6个月—2岁，<1岁者约占50%；
 - 季节：一年四季皆可发生，以夏秋两季为多见。
- 



西医的病因

易感因素

↓
消化系统发育不成熟

↓
机体防御功能差

↓
人工喂养

感染因素

↓
肠道内感染（病毒、细菌、寄生虫和真菌引起）

↓
肠道外感染（发热和病原体毒素作用）

非感染因素

↓
饮食因素

↓
过敏因素

↓
气候因素



中医的病因

脾胃虚弱

失宜 或久病迁延不愈
飧吞酸 脾虚 天枢
不分 并走大肠而成泄泻
脾胃虚弱引起的腹泻 常
反复 发作 甚则脾病及肾
迁延不愈。

内伤饮食

饮食不知自节 若调护失
或儿 脾不运 健运失
或不洁 过食生冷瓜果或
不消化食物 损伤脾胃
致宿食内停 清浊不分
并走大肠而成泄泻。


感受外邪

邪均可致泻 冬春多为风
寒 感 入 寒 侵 腹 部 湿 夏 秋 多
暑 湿 热 内 迫 大 肠 骤 成
暴 泻。

病机

- 为脾胃运化失常，清浊不分，并走大肠，合污而下，致成泄泻。





分类

按病程分：

- 1、急性期：病程2周以内。
- 2、迁延性期：病程2周至2个月。
- 3、慢性期：病程大于2个月。



分类

按病情分：

重型

烦躁 精神萎靡 嗜睡 面色苍
重 度 倦 怠 疲 劳 明 显 绅 膊 计 数 疔 疔
增高。

中型

毒症状
轻至中度脱水或有轻度中

轻型

无脱水 无中毒症状。

风寒泄泻症

湿热泄泻症

伤食泄泻症

寒湿泄泻症

脾肾阳虚泄
泻症

脾虚泄泻症

中医
辨证



1、风寒泻

辨证论治

证候 大便清稀夹泡沫，色淡，臭气不甚，肠鸣腹痛，腹部喜温喜按，常伴发热，恶寒，鼻塞流涕，轻咳咽痒，唇舌色淡，舌苔薄白，脉浮紧。

治法：疏风散寒，化湿和中。

辨证施护

- (1) 病室应避风，患儿出现腹痛、肠鸣时，腹部宜保暖。
- (2) 兼有恶寒发热者，可艾灸神阙穴，每次10~15分钟；也可用暖脐膏加丁香、胡椒粉各0.5g敷于脐部，或用食盐60g，生姜、大葱各9g炒热，布包后熨肚脐，可散寒止痛。



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/918117033003006054>