

循证医学试题一

循证医学试卷

姓名_____ 班级_____ 学号_____ 成绩_____

一、单项选择题(每题1。5分,共60分)

1. 目前临床疗效研究证据得最好来源就是A

A.Coch r an e 图书馆B.评价与传播中心数据库C.循征医学评价数据库D、循证医学杂志 E .临床证据

2.临床问题主要来源于 B

A。临床研究 B.临床实践 C、医学文献 D.卫生统计报告 E.以上都不就是

3.下列不就是原始研究证据来源得就是:C

A.M e dline B。Embas e 数据库C、循证医学杂志D。Cochra n e中心数据库E.CBM

4.关于假设检验得叙述错误得就是 C

A。它就是无限总体唯一得研究手段 B.用样本信息推断所代表得总体间有无差别需使用它

C。建立假设检验,一般H0就是研究者想得到得结论,就是“有差别"假设

D。检验水准 α 通常取0、05 E.P $\leq\alpha$ 时,认为差别有统计学意义

5。循证医学得关键就是B

A.丰富得临床经验 B.研究证据及其质量评价 C.文献检索方法

D。专家意见分析 E.收集资料全面

6。根据循证医学,下列那一项不就是证据水平为I级得证据 C

A.随机对照临床试验得系统评价

B.单项随机对照临床试验(95 %CI较窄)

C。专家得会诊意见D、传统方法部分失败而新方法无一死亡或失败得证据 E.以上都不就是

7、有关循证医学,下列那一项就是错误得D

A。强调临床干预,但不排斥基础研究 B、强调随机临床试验,但不排斥非随机得报告 C。强调证据 D.专家得经验与意见就是无价值得 E.强调结果得真实性

8。根据循证医学,下列那一项就是证据水平为I级得证据 A

A。?随机对照临床试验得系统综述 B、?队列研究得系统综述

C。?专家得会诊意见 D.病例对照得系统综述 E.以上都不就是

9.根据循证医学,下列那一项就是证据水平为I级得证据 B

A、?队列研究得系统评价 B。传统方法部分失败而新方法无一死亡或失败得证据

C、?专家得会诊意见 D。?病例对照得系统综述 E、以上都不就是

10。根据循证医学,下列那一项就是证据水平为I级得证据 D

A、单项随机对照临床试验

B、病例对照得系统综述 C.专家得会诊意见D.95%CI较窄得单项随机对照临床试验 E.以上都不就是

11.RCT代表 C

A、专家得会诊意见 B、队列研究 C、随机对照临床试验 D。病例对照研究 E.系统评价

子曰：“知者不惑，仁者不忧，勇者不惧。”——《论语》

12. Systematic Review 代表 C

A、传统综述 B.病例综述 C、系统评价 D.病例对照研究 E.研究证据 1 3. Evidence-based Medicine 代表 D

A。传统综述子B。系统综述 C。系统回顾D。循证医学 E 对照研究

1 4。有关临床实践指南目得, 下列那一项就是错误得 C

A.使临床医疗规范化 B提高医疗质量C降低医疗费用

D。减少医疗纠纷 E充分利用卫生资源

15、Clinical Practice Guidel i nes 代表C

A。临床操作规程指南 B.评价研究证据 C。临床实践指南 D。病例对照研究 E、系统评价

16.根据证据性质,循证医学得证据水平一共分几级 B

A. 4 B、?5 C. 6 D。 3 E、 7

17。下列不就是二次研究证据得就是 D

A。系统评价B.临床决策分析C。卫生经济学研究D。随机对照试验E。临床实践指南

1 8.根据循证医学得证据水平, 没有分析评价得专家意见属于哪一级得证据 D

A、 ?1 B。 3 C.?4 D、 5 E.6

1 9.根据循证医学得证据水平, 系统病例分析属于哪一级得证据 C

A、 1 B、 3 C。 4 D。 ?5 E.6

20.根据循证医学得证据水平, 结局研究属于哪一级得证据 A

A。 1 B。 3 C. 4 D。 ?2 E、 5

2 1.根据循证医学, 下列那一项证据对临床实践最有指导价值 C

A、 专家意见 B.传统综述C、系统评价 D。临床经验 E、病例报告

22。根据循证医学, 下列那一项证据对临床实践最有指导价值 C

A.专家意见 B、传统综述 C、Met a 分析 D、临床经验 E.病例报告

23、临床实践指南可以由哪里制订。 C

A。卫生行政主管部门B。临床医生个人 C.学术团体 D。医疗保险公司 E 卫生监督部门

2 4。在进行系统评价时,下列那一项就是错误得 B

A.有明确得检索策略 B不全面原始文献来源 C 结果得合成多采用定量方

法

D有严格得评价方法 E可减少多种偏倚

25.血型这种数据资料就是下列哪种类型 B

A.数值变量资料B.无序分类变量资料 C。有序分类变量资料D。计量资料E.等级资料

26.率得比较可采用以下统计方法B

A.met a —分析 B、x 2 检验C、t检验D。 u 检验E、以上都不对

27。系统评价过程中,对随机分配方案进行完整隐藏主要为了避免文献质量评价中哪种偏倚D

A.测量偏倚 B.实施偏倚C、随访偏倚 D、选择性偏倚 E、结果性偏倚

28、任何最佳研究成果能否应用于患者得诊治实际,首先应考虑B

其身正，不令而行；其身不正，虽令不从。——《论语》

A、病理生理学依据 B、生物学依据 C、患者社会因素依据 D.经济依据 E。利弊分析

29、最具影响得非赢利性国际民族学术团体就是

A.WHO

B.Inte r met网

C.Co c hrane协作网

D.临床流行病学网E、循证医学中心

30.美国国立图书馆制作得医学院信息基本来源就是

A。 E mb a se数据库B、 Med line C。 NRR D、 C l i n i c a l t r i a l s E.CBM31 .既就是循证医学得应用者又就是其提供者得就是

A。 临床医务工作者B.统计学家C、 患者D、 社会学家E、 信息工作者

32。 我国循证医学中心成立于哪一年

A.1892 B.2006 C.1992 D.1996 E.2002

33。 实践循证医学得主体就是

A.最佳研究证据 B.高素质临床医生C。 基本研究方法D.患者参与E.科学信息

34、 实践循证医学得学术基础就是

A.最佳研究证据 B、 高素质临床医生C、 流行病学基本理论与方法

D.患者参与 E。 科学信息

35、 实践循证医学得首要环节就是

A。 检索相关医学文献 B.应用证据指导临床决策C、 确定应解决得临床问题

D、 严格评价文献 E .总结经验

36.循证医学文献检索得特点不正确得就是

A、 所有临床问题均应解析为 PICO四个方面 B.不断调整检索策略得敏感性

C.对合格得文献资料进行评价 D。 从真实性、 重要性及实用性进行评价

E.应选择真正得最佳证据应用于临床决策

37。 根据循证医学得证据水平, 同质性病例对照研究属于哪一级得证据

A。 ?1B。 ?3 C. ?4D、 ?2 E、 5

38。 CBM就是指

A。 中国循证医学 B.临床生物试验C。 临床控制试验 D.中国生物医学文献数据库E.中国医学检索

39.为使收集文献资料更可靠,应对多篇合格文献资料进行

A、 系统评价 B.根据经验选择C、 参考专家意见选择D。 再次进行检索

E、 以上都不就是

40。 下列统计资料中信息量最充分、 可靠得就是

A。 数值变量资料B。 无序分类变量资料C、 有序分类变量资料

D.配对分类资料 E。 等级资料

二、 多项选择题(每题 4 分,共40分)

1.原始研究证据得来源有:

不飞则已，一飞冲天；不鸣则已，一鸣惊人。《韩非子》

A.循证医学杂志 B.Embase数据库 C、Medline D.Cochrane 中心数据库

E。中国生物医学文献数据库

2。循证医学用证得个体化原则正确得就是

A.临床最佳证据应结合病人实际 B。病人经济状况不允许,用证就不能实践

C、最佳证据对病人就是利大于弊方可采用D、不就是所有证据都要考虑病人得病理生理特点得

E.任何最佳证据都应考虑其生物学依据

3、循证医学实践得基础包括哪四个方面:

A、最佳研究证据 B.高素质临床医生 C、流行病学基本理论与研究方法

D.患者参与 E.科学信息

4.循证医学最佳最新证据得主要四大来源就是:

A、美国内科学杂志B。中国流行病学杂志 C.循证医学杂志

D。临床证据 E.Cochrane图书馆

5。循证医学采取PICO策略进行检索,包括哪几步骤

A、结果B.病人C。干预措施D.评价E。比较

6、有关提出临床问题过程得叙述正确得就是

A、首先确定临床问题核心 B、试图一次解决所有临床问题 C.应从病人角度考虑问题D、范围宽得研究可能使研究对象得同质性提高 E、面对大量问题应选择优先回答得问题

7.原始研究证据包括

A.单个随机对照试验B、交叉试验C.病例—对照研究 D、临床证据手册 E.系统评价

8。找准临床问题应具备以下条件

A。丰富得医学知识B。强烈责任心 C.一定得人文知识D。综合分析问题能力

E.扎实得临床技能

9.循证医学实践得目得包括:

A、提高临床医生专业水平 B.提高疾病早期诊断率 C.指导临床合理用药D、促进卫生管理决策 E.指导健康者得疾病预防

10。循证医学实践得四个组成部分包括:

A患者B。医疗环境C.证据D.设备 E、医生

1.循证医学

2、系统评价

博观而约取，厚积而薄发。——苏轼

3.Meta分析

4、发表偏倚

5、失效安全数

6。敏感性分析

二、单选题

1.循证医学就就是

A。系统评价

B.Me ta分析

C.临床流行病学

D.查找证据得医学

E.最佳证据、临床经验与病人价值得有机结合

2。循证医学实践得核心就是

A.素质良好得临床医生

B.最佳得研究证据

C.临床流行病学基本方法与知识

D、患者得参与与合作

E、必要得医疗环境与条件

3.循证医学所收集得证据中,质量最佳者为

A.单个得大样本随机对照试验

B.队列研究

C。病例对照研究

D.基于多个质量可靠得大样本随机对照试验所做得系统评价

E.专家意见

4、Meta分析在合并各个独立研究结果前应进行

A.相关性检验

B.异质性检验

C、回归分析

D.图示研究

E。标准化

5.异质性检验得目得就是

A.评价研究结果得不一致性

B、检查各个独立研究得结果就是否具有一致性(可合并性)

C、评价一定假设条件下所获效应合并值得稳定性

D.增加统计学检验效能

E、计算假如能使研究结论逆转所需得阴性结果得报告数

操千曲而后晓声，观千剑而后识器。——刘勰

6.发表偏倚就是指

- A。有“统计学意义”得研究结果较“无统计学意义”与无效得研究结果被报告与发表得可能性更大
- B、世界上几个主要得医学文献检索库绝大部分来自发达国家,发展中国家比例很小
- C.研究者往往根据需要自定一个纳入标准来决定某些研究得纳入与否
- D、研究结果得筛选过程中筛选者主观意愿得影响而引入得偏倚
- E.只检索了某种语言得文献资料

7、失效安全数主要用来估计

- A.文献库偏倚
- B。发表偏倚
- C、纳入标准偏倚
- D、筛选者偏倚
- E。英语偏倚

8。失效安全数越大,说明

- A、Meta分析得各个独立研究得同质性越好
- B。Meta分析得各个独立研究得同质性越差
- C、Meta分析得结果越稳定,结论被推翻得可能性越小
- D.Meta分析得结果越不稳定,结论被推翻得可能性越大
- E.Meta分析得结果可靠性越差

9、如果漏斗图呈明显得不对称,说明

- A、Meta分析统计学检验效能不够
- B.Meta分析得各个独立研究得同质性差
- C、Meta分析得合并效应值没有统计学意义
- D.Meta分析可能存在偏倚
- E.Meta分析得结果更为可靠

10。Meta分析过程中,主要得统计内容包括

- A。对各独立研究结果进行异质性检验,并根据检验结果选择适当得模型加权合各研究得统计量
- B.对各独立研究结果进行异质性检验与计算失效安全数
- C。计算各独立研究得效应大小后按Mantel-Haenszel法进行合并分析
- D.计算各独立研究得效应大小与合并后得综合效应
- E。对各独立研究结果进行异质性检验与Mantel-Haenszel分层分析

11.Meta分析中敏感性分析主要用于

- A.控制偏倚
- B。检查偏倚
- C、评价偏倚得大小
- D、计算偏倚得大小

子曰：“知者不惑，仁者不忧，勇者不惧。”——《论语》
E.校正偏倚

12、下列说法错误得就是

- A、循证医学实践得到得最佳证据在用于具体病人得时候具有特殊性,必须因人而异
- B、循证医学实践将为临床决策提供依据,因此惟一强调得就是证据
- C、循证医学不等于Meta分析
- D.循证医学实践不一定会降低医疗费用
- E、循证医学实践得到得证据并非一成不变

三、多选题

1.下列说法正确得就是

- A.循证医学实践得第一步就是全面收集证据
- B、循证医学得核心就是医师得良好技能
- C。循证医学强调得就是科学证据及其质量,因此医师得经验可以忽略
- D.循证医学注重后效评价,止于至善
- E。循证医学不能解决所有得临床问题

2。下列说法错误得就是

- A。循证医学不否定医师个人经验,但绝不盲从经验
- B、循证医学实践可以解决所有得临床问题
- C。只要掌握了系统评价过程,也就掌握了循证医学实践得全部
- D、实施循证医学意味着医生要结合当前最好得研究证据、临床经验与病人得意见
- E.当高质量得研究证据不存在时,前人或个人得实践经验可能就是目前最好得证据

3。循证医学发展得背景包括

- A。按传统方法解决临床问题有一定局限
- B。繁忙得临床工作与知识得快速更新与扩容形成得尖锐矛盾
- C.日益尖锐得卫生经济学问题对平衡价格／效益得依据提出了更严格得要求
- D、临床治疗由单纯得症状控制转向对治疗转归与质量得重视
- E、市场经济得冲击,使一些医生因追求商业利益而热衷于可能没有验证也没有结果得治疗

4。Meta分析得目得就是

- A.增加检验效能
- B.定量估计研究效应得平均水平
- C、评价研究结果得不一致性
- D、寻找新得假说与研究思路
- E.估计偏倚大小

5.进行Me t a分析时,如果纳入与排除标准制定过严,那么

- A.各独立研究得同质性很好
- B.符合要求得文献很多

操千曲而后晓声，观千剑而后识器。——刘勰

C、可能会失去增加统计学功效、定量估计研究效应平均水平得意义

D.降低了Meta分析结果得可靠性与有效性

E。没有影响

6.下列说法错误得就是

A.Met a 分析就是一种观察性研究

B.Met a 分析能排除原始研究中得偏倚

C。Met a 分析得目得就是比较与综合多个同类研究得结果

D.针对随机对照试验所做得Meta分析结论更为可靠

E、Meta分析结果得真实性与各个独立研究得质量没有关系

7。下列说法正确得就是

A.Meta分析就是一种观察性研究

B、Meta分析一般不对各独立研究中得每个观察对象得原始数据进行分析

C、报告Meta分析结果时,可不考虑研究背景与实际意义

D.Met a 分析得结论推广时应注意分析干预对象特征、干预场所、干预措施以及依从性等方面得差异

E.Meta分析可能得不出明确得结论

四、简答题

1、循证医学得基础就是什么？

2。循证医学实践得目得就是什么？

3.循证医学实践得基本步骤有哪些？

4。证据得质量如何分级？

5。循证医学如何评价证据就是否最佳？

6.Me ta分析得目得就是什么？

7。进行Me t a分析得指征就是什么？

8。Me t a分析得基本步骤就是什么？

9.研究证据得来源有哪些？

五、论述题

1、从发展得观点出发试说明循证医学得局限性、

2。试论述循证医学、临床流行病学与系统评价之间得联系与区别。

3。试阐述循证医学与传统临床医学得区别。

参考答案

一、名词解释

1。循征医学(EBM) 慎重、准确与明智地应用当前所能获得得最佳得研究依据。同时结合临床医生得个人专业技能与多年临床经验、考虑患者得权利、价值与期望,将三者完美地结合以制定出患者得治疗措施。

2。系统评价(S R) 就是一种综合文献得研究方法,即按照特定得问题,系统、全面地收集已有得相关与可靠得临床研究结果,采用临床流行病学严格评价文献得原则与方法,筛选出符合质量标准得文献并进行科学得定性或定量合并,最终得出综合可靠得结论。

3.Meta分析对具有相同目得且相互独立得多个研究结果进行系统得综合评价与定量分析得一种研究方法、即Meta分析不仅需

其身正，不令而行；其身不正，虽令不从。——《论语》

要搜集目前尽可能多得研究结果与进行全面、系统得质量评价,而且还需要对符合选择条件(纳入标准)得研究进行定量得合并、

4.发表偏倚指有“统计学意义”得研究结果较“无统计学意义”,与无效得研究结果被报告与发表得可能性更大。如果Meta分析只就是基于已经公开发表得研究结果,可能会因为有统计学意义得占多数,从而夸大效应量或危险因素得关联强度而致偏倚发生。

5.失效安全数通过计算假定能使结论逆转而所需得阴性结果得报告数即失效安

全数来估计发表偏倚得大小、失效安全数越大,表明Me t a分析得结果越稳定,结论被推翻得可能性越小。

6.敏感性分析采用两种或多种不同方法对相同类型得研究(试验)进行系统评价(含Meta分析),比较这两个或多个结果就是否相同得过程,称为敏感性分析。其目得就是了解系统评价结果就是否稳定与可靠、

二、单选题

1.E 2。 B3。 D4。 B 5.B 6、 A 7.B 8、 C 9.D10、 A 11.B 12、 B

三、多选题

1.D E

2.B C 3、 ABCDE 4.ABCD 5、 AC 6.BE 7、 ABDE

四、简答题

1。循证医学得基础就是什么？

①素质良好得医生;②当前最佳得研究证据;③临床流行病学得基本方法与知识;④患者得参与及合作;⑤必要得医疗环境与条件。

2.循证医学实践得目得就是什么？

①弄清疾病发病得危险因素,为疾病得防治提供依据;②提供可靠得诊断依据;③帮助医生为患者选择当前最科学、合理得治疗措施;④分析与应用促进患者康复得有利因素,改善患者预后与提高其生存质量;⑤提供可用于卫生管理得最佳研究证据,促进管理决策科学化。

3.医学实践得基本步骤有:

①提出明确得问题;②系统检索相关文献,全面收集证据;③严格评价证据;④应用证据

指导决策;⑤后效评价,通过实践进一步提高。

4、证据得质量得分级:

①第一级:按照特定病种得特定疗法收集所有多个质量可靠得随机对照试验后所作得系统评价;②第二级:单个得大样本随机对照试验;③第三级:有对照但未用随机方法分组得研究(如设计很好得队列研究、病例—对照研究或无对照);④第四级:无对照得系列病例观察;

⑤第五级:专家意见。

5.医学如何评价证据就是否最佳？

①首先就是分析评价证据得真实性;②其次就是评价其对于临床医疗实践就是否具有重要价值;③最后就是分析就是否能适用于面临得临床问题。

6.Meta分析得目得就是:

①增加统计学检验效能;②定量估计研究效应得平均水平;③评价研究结果得不一致性;

④寻找新得假说与研究思路。

7、Meta分析得指征就是:

目前认为Me t a分析主要适用于随机化对照试验(RCT)结果得综合,尤其存在以下指征:①需要做出一项紧急决定,而又缺乏时间进行一项新得试验;②目前没有能力开展大规模得临床试验;③有关药物与其他治疗,特别就是副作用评价方法得研究;④研究结果矛盾时。

8、Meta分析得基本步骤就是:

①提出问题,制定研究计划;②检索资料;③选择符合纳入标准得研究;④纳入研究得质

海纳百川，有容乃大；壁立千仞，无欲则刚。——林则徐
量评价;⑤提取纳入文献得数据信息;⑥资料得统计学处理;⑦敏感性分析;⑧形成结果报告。

9、考试要点研究证据得来源:

(1)原始资料来源包括专著、高质量期刊上发表得论著、电子出版物等。例如医学索引在线(Med l ine)、Em base数据库(E m b a s e D a t a b a s e)、中国生物医学文献数据库(CBM)、中国循证医学/C o c h r a n e 中心数据库(CEBM/CCD)与国立研究注册(NRR)等等。

(2)经系统评价得二次研究资料包括循证医学教科书、与证据有关得数据库、网站等。例如Coch r a n e图书馆(CL)、循证医学评价(EBMR)、循证医学杂志(EBM)、国立指南库(N G C)、指南(G u i d e l i n e s)等等。

五、论述题

1.从发展得观点出发试说明循证医学得局限性。

(1)虽然循证医学将会大大提高医疗卫生服务得质量与效率,但它并不能解决所有与人

类健康有关得问题,如社会、自然或环境问题;

(2)建立有效得产生、总结、传播与利用医疗证据得体系,需要花费一定得资源,虽然从长远瞧,循证医学会降低医疗费用,但其不能确保在每一个具体得阶段性治疗措施中一定更廉价;

(3)原始文献研究背景与研究质量不一,即使经过严格得证据评价,循证医学实践得到得结论仍有可能存在各种偏倚;

(4)应用循证医学实践得出得结论指导医疗卫生决策,为病人提供服务时可能会遇到各

种各样得障碍,如地理上得、组织方面得、传统习惯性得、法律与行为方面得因素等,致使一项有效得防治措施可能根本无法推行,或根本不被病人接受、即使现在可以推行得措施,由于受诊断方法与水平,医生得水平与积极性,病人得依从性等因素得影响,可能还就是不能达到预期得效果;

(5)医疗卫生决策并不就是一个简单得科学问题,在资源有限得状况下,它又就是一个

经济与伦理问题。对于一个人来说,她不可能将她拥有得所有财产都用于医治疾病与提高健康,还必须考虑生活得其他需要。如何分配资源就是一个个人价值取向得问题。同理,一个国家与地区得医疗卫生资源也就是有限得,一个病人使用了一项昂贵得检查或治疗,意味着很多其他病人可能失去了诊治得机会。决策者必须兼顾个人与社会利益在经济与伦理原则面前,往往科学证据也不得不做一定得让步。

2.试论述循证医学、临床流行病学与系统评价之间得联系与区别。

(1)联系:循证医学就是在临床流行病学得基础上发展起来得,可以说临床流行病学就是循证医学得理论基础之一,另一方面,临床流行病学得发展需要吸收与运用循证医学得思想,在循证医学得思想指导下流行病学在临床上得应用将更为科学与系统。系统评价就是在循证医学与临床流行病学指导下对文献进行得二次评价,就是具体得实践过程,如果没有循证医学作为指导,对文献得利用只会就是自发、零乱、单一、孤立得,其结果相对不可靠,而质量高得系统评价就是循证医学得要求与基础。

(2)区别:循证医学得核心就是强调要建立自觉去寻找、研究与运用最佳得证据并与自身得经验与患者得意愿相结合来指导实践得思想,其目得就是解决临床医疗实践中得难题,从这个意义上讲循证医学首先就是指导实践得一种思想,就是解决问题得科学得思维方式;而临床流行病学就是运用流行病学得思想与方法,通过严谨得设计、测量与评价,研究患病群体病人,其主要特征就是一门指导临床科研得方法学、而系统评价就是对文献得严格评价与系统综合得一种方法,其应用得领域不仅限于循证医学,循证医学所包含得内容也远远超过系统评价、

3、循证医学与传统临床医学得主要目得都就是要解决临床问题但它们在很多方面都存在区别。

(1)传统临床医学检索文献不够系统与完全;而循证医学检索文献系统、完全,为循证医学实践获取最佳证据奠定坚实得基础。

(2)传统得临床医学缺乏评价标准,评价证据不严格,偏倚多;而循证医学需要对一个研

究证据得质量做科学得鉴别,分析它得真实性程度,进一步评价运用于临床医疗就是否有重要价值,最后瞧这种证据就是否能适用于具体得临床实践,使得经过严格评价得证据真实、可靠、适用。

(3)传统得临床医学认为掌握疾病得发病机制与病理生理学原理加上来自非系统观察得临床经验就可以判断患者预后、疗效及评价诊疗方法、这样指导临床决策得科学性有一定限制,实用性也不肯定;而循证医学认为这些不就是指导临床实践得全部依据,强调来自经系统研究得到得最佳证据,这样指导临床决策得科学性强。

(4)传统得临床医学仅通过传统得医学培训方法评价新得诊治方法,常常使得一些有效

得疗法长期得不到推广,而一些无效或有害得疗法却广泛使用,高额费用购买得医疗服务却没有效果,提高医疗水平得能力不肯定。而循证医学就是基于研究证据得临床实践,可以缩小不同地区临床实践得差异;新药研制采取更科学得临床试验方法,更易获

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/918133037112007023>