

2024 年安徽省广德县《执业药师之西药学专业二》资格考试内部题库附答案【夺分金卷】

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 可抑制骨髓造血功能，或引起“灰婴综合征”，新生儿禁用的抗菌药物是

- A: 酰胺醇类(氯霉素)
- B: 四环素类
- C: 林可霉素类
- D: 氨基糖苷类

答案：A

2. 对曲霉无效的药物是

- A: 两性霉素 B
- B: 伊曲康唑
- C: 氟康唑
- D: 伏立康唑

答案：C

3. 患者，女性，63 岁，诊断为支气管哮喘急性发作，使用布地奈德、沙丁胺醇吸入、氨茶碱静脉滴注治疗。

- A: 惊厥
- B: 血压下降
- C: 心律失常
- D: 支气管痉挛

答案：C

4. 缺铁性贫血患者最宜选用的治疗药物是

- A: 维生素 C
- B: 铁剂
- C: 叶酸
- D: 维生素 B12

答案：B

5. 治疗肺孢子菌肺病的首选药物的是()

- A: 磺胺米隆
- B: 复方磺胺甲噁唑
- C: 柳氮磺吡啶
- D: 磺胺嘧啶

答案：B

6. 与氯霉素特点不符的是()

- A: 口服难吸收
- B: 易透过血脑屏障
- C: 骨髓毒性明显
- D: 适用于伤寒的治疗

答案：A

7. 下列药物中，能促进食物消化的药物是

- A: 胶体果胶铋
- B: 乳酶生
- C: 雷尼替丁
- D: 兰索拉唑

答案：B

8. 对蛔虫、蛲虫、钩虫、鞭虫感染有良效的是()

- A: 噻嘧啶
- B: 氯硝柳胺
- C: 哌嗪
- D: 甲苯咪唑

答案：D

9. (2020 年真题) 哮喘急性发作首选的药物是

- A: 孟鲁司特片
- B: 羧甲司坦口服液
- C: 沙丁胺醇气雾剂
- D: 布地奈德福莫特罗吸入剂

答案：C

10. 可用于治疗厌氧菌及产 ESBL 的革兰阴生杆菌感染的药物是()

- A: 头孢米诺
- B: 头孢呋辛
- C: 头孢他啶
- D: 头孢唑林

答案：A

11. 抑制二氢叶酸合成酶的药物是

- A: 红霉素
- B: 甲氧苄啶
- C: 磺胺甲
- D: 青霉素

答案：C

12. 雌激素替代疗法应在绝经后几年之内开始

A: 8

B: 6

C: 2

D: 4

答案：B

13. 下列药物中，与蛋白同化激素无相互作用的是

A: 环孢素

B: 他克莫司

C: 华法林

D: 青霉素

答案：D

14. （2017 年真题）减少钠离子内流而使神经细胞膜稳定，属于乙内酰胺类抗癫药的是（）

A: 苯妥英钠

B: 卡马西平

C: 苯巴比妥

D: 加巴喷丁

答案：A

15. 主要用于房颤与心房扑动(房扑)的复律、复律后窦性节律的维持和危及生命的室性心律失常的是()

A: 奎尼丁

B: 利卡多因

C: 普萘洛尔

D: 维拉帕米

答案: A

16. 以下食物与华法林钠不存在相互作用的是

A: 洋葱

B: 红叶苋菜

C: 菠菜叶

D: 脱皮黄瓜

答案: D

17. 急性化脓性中耳炎的局部治疗方案, 正确的是()

A: 鼓膜穿孔前可先用 3%过氧化氢溶液彻底清洗外耳道脓液, 再用无耳毒性的抗生素滴耳液, 鼓膜穿孔后可使用 2%的酚甘油滴耳继续治疗

B: 鼓膜穿孔前可使用 3%过氧化氢溶液清洗外耳道, 鼓膜穿孔后可用 2%酚甘油滴耳, 再用无耳毒性的抗生素滴耳液治疗

C: 鼓膜穿孔前可使用 2%酚甘油滴耳, 鼓膜穿孔后先以无耳毒性的抗生素滴耳液抗感染, 再用 3%过氧化氢溶液清洗外耳道, 以防止进一步感染

D: 鼓膜穿孔前可使用 2%酚甘油滴耳, 鼓膜穿孔后可先用 3%过氧化氢溶液清洗外耳道脓液, 再用无耳毒性的抗生素滴耳液治疗

答案: D

18. 关于应对顺铂所致肾毒性的措施, 下列说法错误的是()

A: 必要时给予碳酸氢钠碱化尿液和别嘌醇

B: 肾功能不全者可以使用

C: 定期检测电解质、肾功能, 同时观察 24 小时尿量及尿颜色

D: 使用时应充分水化, 并及时给予利尿剂

答案：B

19. 长期使用可引起维生素 K 缺乏的药物是

- A: 华法林
- B: 二甲双胍
- C: 阿司匹林
- D: 头孢哌酮

答案：D

20. 激动 α

- A: 胍屈嗪
- B: 哌唑嗪
- C: 硝普钠
- D: 可乐定

答案：D

21. 以下关于奥利司他使用的叙述，错误的是

- A: 应在餐时或餐后 1 小时内服用，如有一餐未进或食物中不含脂肪，可省略一次服药
- B: 脂溶性维生素应在服用本品 2 小时后或在睡前服用
- C: 药效在给药后 24~48 小时即可显现，停止治疗后 48~72 小时恢复
- D: 体重指数为 23 的人可使用

答案：D

22. 患者，女，46 岁。肝硬化腹水患者，长期使用噻嗪类利尿药不会引起

- A: 低钙血症
- B: 低钾血症

C: 高尿酸血症

D: 低氯性碱中毒

答案：A

23. (2018 年真题) 通过分解产生新生态氧而发挥杀菌除臭作用，用于治疗痤疮的药物是 ()

A: 过氧苯甲酰

B: 壬二酸

C: 阿达帕林

D: 维 A 酸

答案：A

24. 治疗斑疹伤寒的首选药是

A: 四环素

B: 青霉素

C: 氯霉素

D: 诺氟沙星

答案：A

25. 属于抗雄激素类，可用于晚期前列腺癌治疗的药品是

A: 氟他胺

B: 乙烯雌酚

C: 托瑞米芬

D: 他莫昔芬

答案：A

26. 临床上最常用的内分泌治疗药物是

A: 氨氯米特

- B: 雌激素
- C: 雄激素
- D: 他莫昔芬

答案：D

27. 镇静作用明显的 H

- A: 阿司咪唑
- B: 组胺
- C: 西咪替丁
- D: 苯海拉明

答案：D

28. 主要降低血中胆固醇且具有首过效应的是

- A: 普萘洛尔
- B: 苯扎贝特
- C: 洛伐他汀
- D: 氯贝丁酯

答案：C

29. 属于促凝血因子合成药的是

- A: 甲萘氢醌
- B: 酚磺乙胺
- C: 鱼精蛋白
- D: 氨甲环酸

答案：A

30. 作用机制是抑制纯化的 HIV-1 和 HIV-2 蛋白酶，与蛋白酶的活性部位直接结合，是蛋白酶的竞争性抑制剂，这种竞争性结合阻碍了病毒颗粒成熟过程中病毒前体多蛋白的裂解过程，由此产生的不成熟的病毒颗粒不具有感染性，无法建立新一轮感染，该类药物是

- A: 整合酶抑制剂
- B: 非核苷类反转录酶抑制药
- C: 蛋白酶抑制药
- D: 核苷类反转录酶抑制药

答案：C

31. 糖皮质激素的禁忌证不包括()

- A: 妊娠初期和产褥期
- B: 角膜炎、虹膜炎
- C: 严重的高血压、糖尿病
- D: 创伤或手术恢复期

答案：B

32. 患者，女，40 岁。癫痫病史 3 年，近来常觉头痛，测量血压为 170 / 110mmHg。

- A: 维拉帕米
- B: 氨氯地平
- C: 尼莫地平
- D: 硝苯地平

答案：C

33. 关于氨基糖苷类和第三代头孢菌素类联合应用，错误的是

- A: 治疗急性感染通常疗程不宜超过 7~14 日
- B: 可在身体同一部位给药

专业《执业药师之西药学专业二》资格考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

C: 两类药不能混入同一容器内

D: 联合应用治疗败血症、肺炎等革兰阴性杆菌引起的严重感染

答案：B

34. 可能引起心悸、心绞痛发作的药物是

- A: 碘及碘化物
- B: 鲨肝醇
- C: 丙硫氧嘧啶
- D: 左甲状腺素

答案：D

35. 应用磺酰脲类降糖药治疗 5 年，患者发生继发性失效的比例是

- A: 30%~40%
- B: 1%~5%
- C: 5%~15%
- D: 50%~60%

答案：A

36. 抗心绞痛的首选联合治疗方案是()

- A: 长效硝酸酯类+普萘洛尔
- B: 维拉帕米+普萘洛尔
- C: 短效硝酸酯类+螺内酯
- D: 维拉帕米+氢氯噻嗪

答案：A

37. 肾毒性大的是

- A: 庆大霉素
- B: 头孢噻肟
- C: 阿莫西林
- D: 头孢哌酮

答案：A

38. 抗酸作用较强、快而持久，可引起反跳性胃酸分泌增多

- A: 氢氧化镁
- B: 碳酸钙
- C: 三硅酸镁
- D: 氢氧化铝

答案：B

39. 长期频繁使用可致眼部真菌感染

- A: 更昔洛韦
- B: 氯霉素
- C: 利巴韦林
- D: 四环素可的松

答案：D

40. 糖皮质激素用于结缔组织病、肾病综合征、顽固性支气管哮喘宜选择的给药方法是

- A: 一般剂量长期疗法
- B: 隔日一次给药法
- C: 大剂量冲击疗法
- D: 小剂量替代疗法

答案：A

41. 对 I 型和 II 型单纯疱疹病毒作用最强的是

- A: 干扰素
- B: 阿糖腺苷
- C: 奥司他韦

D: 阿昔洛韦

答案: D

42. (2018 年真题) 镇痛药的合理用药原则, 不包括 ()

A: 用药剂量个体化, 根据患者需要由小剂量开始逐渐加大剂量

B: 按阶梯给药, 对于轻度疼痛者首选弱阿片类药物

C: 尽可能选口服给药

D: “按时” 给药, 而不是“按需” 给药

答案: B

43. 患者, 男, 55 岁。1 小时前因右侧腰背部剧烈疼痛。难以忍受, 出冷汗, 服颠茄片不见好转, 来院急诊。尿常规检查: 可见红细胞。B 型超声波检查: 肾结石。

A: 镇痛和解痉作用

B: 增加镇痛作用

C: 防止成瘾

D: 增加解痉作用

答案: A

44. 外科皮肤伤口或肢体溃疡的局部治疗宜选用

A: 阿霉素

B: 地屈孕酮

C: 聚甲酚磺醛

D: 环磷酰胺

答案: C

45. 关于糖皮质激素对血液成分影响的描述, 错误的是

A: 降低纤维蛋白原浓度

- B: 使血小板增多
- C: 使红细胞和血红蛋白含量增加
- D: 使中性白细胞数增多

答案：A

46. 可增加溶血性尿毒症的发生危险的是

- A: 红霉素
- B: 维生素 C
- C: 他莫昔芬
- D: 氯丙嗪

答案：C

47. (2019 年真题) 长期使用可能导致血钾升高的降压药物是 ()

- A: 硝普钠
- B: 贝那普利
- C: 氨氯地平
- D: 美托洛尔

答案：B

48. 抗高血压药物不包括

- A: 血管紧张素转化酶抑制药
- B: 血管收缩药
- C: 肾素抑制药
- D: α 、 β 受体阻断药

答案：B

49. (2020 年真题) 餐后 1~2 小时、睡前或胃部不适时服用的抗酸剂是

- A: 米索前列醇

- B: 兰索拉唑
- C: 铝碳酸镁
- D: 枸橼酸铋钾

答案: C

50. 属于胆固醇吸收抑制剂的是()。

- A: 阿昔莫司
- B: 非诺贝特
- C: 阿托伐他汀
- D: 依折麦布

答案: D

51. 关于容积性泻药的叙述，错误的是

- A: 服用容积性泻剂的同时应摄入足够水分
- B: 可能会影响华法林的吸收
- C: 主要用于轻度便秘患者的治疗
- D: 促进钙和铁的吸收

答案: D

52. 以下给药途径不能使用氟尿嘧啶的是

- A: 静脉注射
- B: 静脉滴注
- C: 动脉插管注药
- D: 鞘内注射

答案: D

53. 磷霉素的主要抗菌作用机制是

- A: 抑制细菌蛋白质合成

- B: 抗叶酸代谢
- C: 增加细菌胞浆膜的通透性
- D: 干扰细菌细胞壁的合成

答案：D

54. 联合应用可使部分患者血压升高的药物是

- A: 利奈唑胺+苯丙醇胺
- B: 利奈唑胺+哌替啶
- C: 磷霉素氨丁三醇
- D: 磷霉素钠+万古霉素

答案：A

55. 适用于心功能比较稳定的 II～III 级心力衰竭患者的是

- A: 氯沙坦
- B: 卡维地洛
- C: 氢氯噻嗪
- D: 米力农

答案：B

56. 属于时间依赖性且短 PAE 的大环内酯类药是

- A: 氨曲南
- B: 阿奇霉素
- C: 克拉霉素
- D: 红霉素

答案：D

57. 维生素 K

- A: 促进纤溶

- B: 促进凝血因子合成
- C: 抑制血小板聚集
- D: 促进四氢叶酸类辅酶的循环利用

答案：B

58. 可能导致牙齿黄染的抗菌药物是

- A: 庆大霉素
- B: 甲砒霉素
- C: 多西环素
- D: 加替沙星

答案：C

59. 氟替卡松吸入气雾剂用于重度哮喘时的用法和用量为

- A: 一次 100~250 μg ，一日 2 次
- B: 一次 500~1000 μg ，一日 2 次
- C: 一次 50~100 μg ，一日 2 次
- D: 一次 250~500 μg ，一日 2 次

答案：B

60. 30 岁，农民，头昏乏力，粪中钩虫卵(+++)，血红蛋白 60g/L，诊断：钩虫感染，缺铁性贫血。

- A: 驱钩虫+注射右旋糖酐铁
- B: 驱钩虫
- C: 驱钩虫+口服铁剂
- D: 输血+注射右旋糖酐铁

答案：C

61. 主要用于复发转移乳腺癌、乳腺癌术后转移的辅助治疗和子宫内膜癌的治疗的药物是

- A: 依西美坦
- B: 他莫昔芬
- C: 氟维司群
- D: 来曲唑

答案：B

62. (2016 年真题) 可用于缓解绝经后更年期症状的药品是

- A: 地屈孕酮
- B: 他莫昔芬
- C: 依普黄酮
- D: 戊酸雌二醇

答案：D

63. 用于治疗便秘，也可在结肠镜检查或 X 线检查时用作肠道清洁剂，与碳酸氢钠等碱性药物作用，能引起尿液变色的是

- A: 开塞露
- B: 聚乙二醇 4000
- C: 酚酞
- D: 乳果糖

答案：C

64. 应用硝普钠时的注意事项及用药监护不包括()

- A: 血硫氰酸盐水平
- B: 避光使用
- C: 监测血压
- D: 缓慢静脉注射

答案：D

65. 肾上腺糖皮质激素类药物的共同药理作用不包括

- A: 抗休克
- B: 抗病毒
- C: 抗炎
- D: 免疫抑制

答案：B

66. 抗菌谱广，抗菌活性均类似于头孢噻肟的药物是

- A: 头孢孟多
- B: 拉氧头孢
- C: 头孢氨苄
- D: 氨曲南

答案：B

67. 对伴有同型半胱氨酸升高的高血压患者在降压的同时应注意补充

- A: 叶酸+维生素 B12
- B: 维生素 B2+维生素 C
- C: 维生素 C+维生素
- D: 维生素 K+维生素 B

答案：A

68. 哌拉西林

- A: 对支原体有效
- B: 对 G⁺、G⁻球菌，特别是对 G⁻杆菌有效
- C: 对 G⁺、G⁻球菌及螺旋体等有效
- D: 抗菌作用强，对铜绿假单胞菌、厌氧菌有效

答案：D

69. 作用机制是抗代谢的是

- A: 巯嘌呤
- B: 吉非替尼
- C: 紫杉醇
- D: 枸橼酸他莫昔芬

答案：A

70. 患者，女，55 岁，2 型糖尿病史 5 年；心律失常病史 2 年长期使用胺碘酮治疗。关于胺碘酮的不良反应的说法，错误的是

- A: 可致甲状腺功能亢进，同时会加重心房颤动或出现快速室性心律失常
- B: 可致肺毒性，早期一般表现为咳嗽，但病情发展时可出现发热和呼吸困难，表现为急性肺炎
- C: 可致甲状腺功能减退较为常见发病隐匿
- D: 可掩盖低血糖症状（如心悸、手抖），但低血糖的其他症状（如出汗）仍然存在

答案：D

71. 属于合成的麻醉性镇痛药的是

- A: 吗啡
- B: 美沙酮
- C: 布洛芬
- D: 可待因

答案：B

72. 下列药物与甲氧氯普胺合用，可增加锥体外系不良反应风险的是

- A: 干扰素
- B: 奥司他韦
- C: 阿昔洛韦
- D: 金刚烷胺

答案：D

73. 患者，女，66 岁，5 天前无明显诱因出现发热，最高 39℃，伴寒战；无咳嗽、咳痰。于门诊阿莫西林抗感染治疗 4 日无改善，遂转入院治疗。入院查体：T38. 8℃，R21 次，BP110 / 70mmHg，HR110 次 / 分。神清、精神差、颈软，咽不红、双扁桃体不大；双肺呼吸音清，无明显干湿啰音。查血常规白细胞 $13.4 \times 10^9 / L$ ，中性粒细胞 82. 1%，胸片、肝肾功能未见明显异常。入院后给予亚胺培南西司他丁 0. 59，每 6 小时一次。

- A: 有可能引起维生素 D 缺乏症状
- B: 询问过敏史，使用期间密切关注过敏反应
- C: 需关注中枢神经系统不良反应
- D: 如需连续给药 1 周以上，应进行肝功能检查

答案：A

74. 膦甲酸钠不能与静脉滴注喷他咪联合使用，以免发生

- A: 低钙血症
- B: 高钾血症
- C: 高钙血症
- D: 低钾血症

答案：A

75. 能升高血糖，对抗胰岛素的降血糖作用的是

- A: 磺胺甲唑

- B: 普萘洛尔
- C: 甲状腺素
- D: 格列喹酮

答案：C

76. 患者，女，49 岁。身高 164cm，体重 55kg，因更年期月经不调，经药物治疗效果不佳，而行“子宫切除术”。无药物过敏史。

- A: 左氧氟沙星
- B: 阿奇霉素
- C: 头孢西丁
- D: 克林霉素

答案：C

77. 可作为氨基糖苷类的替代品，与其合用可加强对铜绿假单胞菌和肠杆菌作用的药物是

- A: 克拉维酸
- B: 亚胺培南
- C: 氨曲南
- D: 阿莫西林

答案：C

78. 急性化脓性中耳炎局部治疗，鼓膜穿孔前可使用()

- A: 2%酚甘油滴耳液
- B: 3%酚甘油滴耳液
- C: 2%过氧化氢溶液
- D: 3%过氧化氢溶液

答案：A

79. 与卡比马唑合用应谨慎的是

- A: 放射性碘
- B: 丙硫氧嘧啶
- C: 糖皮质激素
- D: 甲状腺素

答案：A

80. 长期大剂量服用可产生欣快感，可能出现药物依赖性的具有阿片样作用的止泻药是

- A: 洛哌丁胺
- B: 地芬诺酯
- C: 硫酸镁
- D: 蒙脱石散

答案：B

81. 患者，男，43 岁，诊断为感染性心内膜炎，血液细菌培养为草绿色链球菌，拟用青霉素 G 和下列其中一药合用，应合用的药物是

- A: 阿莫西林
- B: 庆大霉素
- C: 红霉素
- D: 奈替米星

答案：B

82. 中毒后可用等剂量维生素 B

- A: 乙胺丁醇
- B: 对氨基水杨酸
- C: 异烟肼
- D: 利福平

答案：C

83. (2016 年真题) 可升高红细胞，用于肾性或非肾性贫血的药品是

- A: 硫酸亚铁
- B: 人血白蛋白
- C: 维生素 B12
- D: 重组人促红素

答案：D

84. 下列描述中，哪一项是胰岛素的禁忌证

- A: 酮症酸中毒
- B: 胰岛素抵抗
- C: 对胰岛素过敏和低血糖者
- D: 用于细胞内缺钾

答案：C

85. 肝素过量可选用的拮抗药是()

- A: 鱼精蛋白
- B: 维生素 K
- C: 葡萄糖酸钙
- D: 氨基己酸

答案：A

86. 抑制排卵避孕药的较常见的不良反应是()

- A: 增加哺乳期妇女的乳汁分泌
- B: 多毛、痤疮
- C: 肾功能损害

专业《执业药师之西药学专业二》资格考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

D: 子宫不规则出血

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/925024004123012033>