

# 医院感染防控考试-医生专场试题

## 一、选择题

1.飞沫传播是指带有病原微生物的飞沫核( $\leq 5\mu\text{m}$ ), 在空气中短距离(1m 内)移动到易感人群的口、鼻粘膜或眼结膜等导致的传播。

A.正确

B.错误✓

2.当出现医院感染病例时,经治医生须在 24 小时内填表,报告医院感染科。

A.正确✓

B.错误

3.新冠病毒抗原检测阳性结果可诊断为新冠病毒感染临床诊断病例。

A.正确

B.错误✓

4.发生针刺伤,由远心端向近心端轻轻挤压伤口,再用肥皂水和流动水进行冲洗,用 75%乙醇或 0.5%碘伏进行消毒,并包扎伤口。

A.正确

B.错误✓

5.凝固酶阴性葡萄球菌属于常居菌,一般情况下不致病,在一定条件下能引起导管相关感染和手术部位感染等。

A.正确✓

B.错误

6.疑似医院感染暴发是在医疗机构或其科室的患者中,短时间内发生医院感染病例增多,并超过历年散发发病率水平的现象。

A.正确

B.错误✓

7.在原感染已知病原体基础上又分离出新的病原体(排除污染和原来的混合感染)的感染,这种情况不属于医院感染。

A.正确

B.错误✓

8.发生特殊病原体或者新发病原体的医院感染应当在12小时内向所在地县级卫生行政部门报告,并同时间向所在地疾病预防控制机构报告。

A.正确

B.错误✓

9.导管相关血流感染是指带有血管内导管或者拔除血管内导管48小时内的患者出现菌血症或真菌血症,并伴有发热( $>38^{\circ}\text{C}$ )、寒颤或低血压等感染表现,除血管导管外没有其他明确的感染源。

A.正确✓

B.错误

10.预防用药的目的是预防手术部位感染,包括浅表切口感染、深部切口感染和手术所涉及的器官/腔隙感染;也包括与手术无直接关系的、术后可能发生的其他部位感染。

A.正确

B.错误✓

11.空气传播是指由悬浮于空气中、能在空气中远距离传播,并长时间保持感染性飞沫核导致的传播,飞沫核是要( ) [单选题]\*

A.  $\leq 5\mu\text{m}$  ✓

B.  $\leq 10\mu\text{m}$

C.  $\geq 5\mu\text{m}$

D.  $\geq 10\mu\text{m}$

12. 肠道感染、多重耐药菌感染、皮肤感染等的患者应采用 ( ) [单选题]\*

A. 标准预防+经空气传播隔离

B. 标准预防+经飞沫传播隔离

C. 标准预防+经接触传播隔离 ✓

D. 标准预防

13. 经飞沫传播的隔离标志为 ( ) [单选题]\*

A. 蓝色

B. 粉色 ✓

C. 黄色

D. 红色

14. 根据患者获得感染危险性的程度，重症监护病房属于 ( ) [单选题]\*

A. 高度风险区域 ✓

B. 中度风险区域

C. 低度风险区域

15. 进行呼吸道传染病诊治的病区中的患者通道、出入口应设在 ( ) 一端 [单选题]\*

A. 清洁区

B. 污染区 ✓

C. 潜在污染区

D.缓冲间

16.关于安全注射,下列说法不正确的是( ) [单选题]\*

A.每次注射均使用一次性无菌注射器及针头

B.可使用多剂量包装的注射剂✓

C.输液及给药装置只能用于一位患者,不应多位患者共用,每次使用后合理处置

D.应严格遵守无菌操作规范,一次性使用无菌物品应一人一用一丢弃

17.最有效的空气消毒方法是( ) [单选题]\*

A.化学消毒

B.通风换气✓

C.紫外线照射

D.空气消毒机

18.关于医院感染的概念错误的是( ) [单选题]\*

A.入院时处于潜伏期的感染不是医院感染

B.医院感染是指在医院内获得的感染

C.慢性感染急性发作是医院感染✓

D.与上次住院有关的感染是医院感染

19.有关隔离的描述,错误的选项是( ) [单选题]\*

A.是控制传染病流行的重要措施

B.便于管理传染源

C.可防止病原体向外扩散给他人

D.根据传染病的平均传染期来确定隔离期限✓

20.有关标准预防以下哪项是错误的( ) [单选题]\*

A.要防止血源性疾病的传播也要防止非血源性疾病的传播

B.强调双向防护

C.脱去手套后可以不洗手✓

D.要根据疾病的主要传播途径，采取相应的隔离措施

21.在医疗诊治活动中高度危险性物品，必须选用什么处理方法（ ）[单选题]\*

A.消毒法

B.灭菌法✓

C.一般消毒

D.清洗处置

22.进入组织或器官内部的器械，或与破损的组织、皮肤、黏膜密切接触的器材和用品的危险性分类是

( ) [单选题]\*

A.高度危险性物品✓

B.中度危险性物品

C.低度危险性物品

D.无危险性物品

23.16 周胎龄以下或重量不足 500 克的胚胎组织，属于哪一类废物（ ）[单选题]\*

A.化学性废物

B.感染性废物

C.损伤性废物

D.病理性废物✓

24.某医师给乙肝患者查体时，手部被患者血液污染时，此时该医师应选择下列哪项手卫生方式（ ）[单

选题]\*

A.洗手

B.卫生手消毒

C.先流动水洗手，然后进行卫生手消毒✓

D.外科手消毒

25.导管相关尿路感染的预防要点不正确的是什么（ ）[单选题]\*

A.插管时严格遵守无菌操作原则

B.集尿袋应与膀胱水平✓

C.保持导尿系统的通畅和密闭

D.断开导尿系统时，包括放尿，应做手卫生

E.尽早拔除导管

26.预防用药维持时间的要求错误的是（ ）[单选题]\*

A.手术时间较短（ <2 小时 ）的清洁手术术前给药一次

B.手术时间>3 小时或超过所用药物半衰期 2 倍以上，或成人出血量超过 1500ml，术中应追加一次

C.清洁手术预防用药不超过 24 小时

D.污染手术的预防用药时间亦为 24 小时，污染手术必要时延长至 48 小时

E.延长用药时间并不能进一步提高预防效果，且预防用药时间超过 24 小时，耐药菌感染机会增加✓

27.以下哪项情况需要穿防护服（ ）[单选题]\*

A.为乙肝孕妇进行胎心监测

B.为新冠病毒感染患者进行病史询问

C.为新冠病毒感染患者进行气管插管✓

D.为单纯疱疹病毒感染患者进行一般查体

28.口罩佩戴注意事项中哪一项错误（ ）[单选题]\*

A.使用医用防护口罩或外科口罩时防止鼻夹处形成死角漏气，降低防护效果

B.外科口罩只能一次性使用

C.口罩潮湿后可以晾干后使用✓

D.口罩受到病人血液、体液污染后应及时更换

29.住院患者出现下列情况应判定为医院感染，除外（ ）[单选题]\*

A.有明确潜伏期的感染，自入院至发病的时间超过其平均潜伏期的感染

B.无明确潜伏期的感染，入院第三个日历日以后(入院当日为第一个日历日)发生的感染

C.新生儿经产道获得的感染

D.在原有感染部位的基础上出现新的部位的感染(应排除脓毒血症的迁徙病灶及原有感染的并发症)

E.同一感染部位在已知病原体的基础上，7天后再次分离到新的病原体，并且排除污染、定植或混合感

染者✓

30.尿培养送检标本的指征除外（ ）[单选题]\*

A.患者出现尿频、尿急、尿痛、血尿、肾区疼痛等症状，同时可能伴有寒战、高热、白细胞计数升高，怀疑存在泌尿系感染

B.尿常规结果有大量白细胞

C.留置导尿管患者出现发热时

D.采集前清洗尿道口，采集前段尿液进行培养✓

31.应佩戴口罩的情形（ ）[多选题]\*

A.新型冠状病毒抗原或核酸检测阳性期间✓

B.出现发热、咽痛、咳嗽、流涕、肌肉酸痛、乏力等疑似新型冠状病毒感染症状期间✓

C.生活、工作或学习的社区、学校发生聚集性疫情时✓

D.前往医疗机构就诊、陪诊、陪护、探视时✓

E. 医护、餐饮、保洁、保安等公共服务人员工作期间✓

32. 以下医嘱正确的是 ( ) [多选题]\*

A. 新冠患者隔离医嘱: 单间隔离/集中隔离、空气隔离、接触隔离

B. 新冠患者隔离医嘱: 单间隔离/集中隔离、飞沫隔离、接触隔离✓

C. 流感患者隔离医嘱: 单间隔离/集中隔离、飞沫隔离、接触隔离✓

D. 乙肝患者隔离医嘱: 单间隔离/集中隔离、飞沫隔离、接触隔离

33. 感染性腹泻临床诊断: 符合下述三条之一即可诊断, 正确的是 ( ) [多选题]\*

A. 急性腹泻, 粪便常规镜检白细胞 $\geq 10$  个高倍视野✓

B. 急性腹泻, 或伴发热、恶心、呕吐、腹痛等✓

C. 急性腹泻每天 3 次以上, 连续 2 天, 或 1 天水泻 5 次以上✓

D. 急性腹泻每天 2 次以上, 连续 2 天, 或 1 天水泻 5 次以上✓

34. 职业暴露后报告处理程序 ( ) [多选题]\*

A. 报告科室负责人✓

B. 填写职业暴露个案登记表✓

C. 主管部门尽快评估职业暴露情况✓

D. 24 小时内采取预防措施✓

35. 关于悬挂隔离标识以下叙述不正确的是 ( ) [多选题]\*

A. 粉色为空气传播的隔离✓

B. 黄色为飞沫传播的隔离✓

C. 蓝色为接触传播的隔离

D. 黄色为接触传播的隔离✓

36. 不同传播途径疾病的隔离原则是什么 ( ) [多选题]\*

A.在标准预防的基础上,应根据疾病的传播途径(接触传播、飞沫传播、空气传播和其它途径的传播),  
结合实际情况,制定相应的隔离与预防措施✓

B.一种疾病可能有多种传播途径时,应在标准预防的基础上,采取相应传播途径的隔离与预防✓

C.隔离病室应有隔离标志,并限制人员的出入✓

D.房间受条件限制时,疑似传染病患者可安置于一室

E.传染病患者或可疑传染病患者应安置在单人隔离✓

37.以下概念正确的是( ) [多选题]\*

A.杀灭或去除媒介物上病原微生物,使其到达无害化水平的处理为消毒✓

B.杀灭或去除媒介物上所有微生物的处理为灭菌✓

C.抑制媒介物上的病原微生物的处理为消毒

D.杀灭或去除媒介物上的病原微生物,使其到达无害化水平的处理为灭菌

E.杀灭或清除媒介物上的绝大局部病原微生物的处理为灭菌

38.常见传染病传播途径以下正确的是( ) [多选题]\*

A.甲肝、乙肝、丙肝、梅毒、细菌性痢疾均为接触传播✓

B.百日咳、流行性腮腺炎为飞沫传播✓

C.麻疹、水痘为飞沫传播+接触传播+空气传播✓

D.流行性感、手足口病、新冠病毒感染为飞沫传播+接触传播✓

E.肺结核为空气传播✓

39.呼吸机相关肺炎诊断时间段是指( ) [多选题]\*

A.气管插管或气管切开患者接受机械通气 48h 后发生的肺炎✓

B.机械通气撤机、拔管后 48h 内出现的肺炎✓

C.气管插管或气管切开患者接受机械通气 24h 后发生的肺炎

D.机械通气撤机、拔管后 24h 内出现的肺炎

40.手术部位感染的预防控制措施包括哪几项 ( ) [多选题]\*

A.抗生素的合理使用✓

B.正确备皮,术中保持患者体温✓

C.严格无菌操作,尽量缩短手术持续时间✓

D.手术室减少人员出入、避免不必要的走动和交谈✓

E.有效控制糖尿病患者的血糖✓

41.导管相关血流感染的预防措施是什么 ( ) [多选题]\*

A.严格执行手卫生✓

B.最大限度的消毒屏障,执行严格的无菌操作✓

C.尽量选择股静脉穿刺

D.静脉穿刺点无菌敷料:无菌纱布每 3 天更换一次,专用贴膜 5 天更换一次,有潮湿、污染随时更换

E.每日评估是否能拔除导管✓

42.预防和控制多重耐药菌传播的隔离方面措施有哪些 ( ) [多选题]\*

A.必须进行接触隔离,医生要下接触隔离医嘱,护士在床位上挂接触隔离标识✓

B.首选单间隔离,不能将同类多重耐药菌感染患者或者定植患者安置在同一房间

C.与患者直接接触的相关医疗器械、器具及物品,如听诊器、血压计、体温表、输液架等要专人专用,

出院时再消毒处理

D.医务人员对患者实施诊疗护理操作时,应当将高度疑似或确诊多重耐药菌感染患者或定植患者安排在最后进行✓

E.在接触多重耐药菌感染患者时,应穿防护服

43.下列哪些情况应穿医用一次性防护服 ( ) [多选题]\*

A.接触甲类及乙类按甲类管理的传染病患者时√

B.接触传播途径不明的新发传染病患者时√

C.为高致病性、高病死率的传染病患者进行诊疗护理操作时√

D.接触多重耐药菌感染的患者时

44.以下哪些情况需要使用护目镜或防护面罩 ( ) [多选题]\*

A.在进行诊疗、护理操作，可能发生患者血液、体液、分泌物喷溅时√

B.近距离接触经飞沫传播的传染病患者时√

C.为呼吸道传染病患者进行气管切开、气管插管等近距离操作，可能发生患者血液、体液、分泌物喷溅时，应使用全面型防护面罩√

D.为可疑新冠病毒感染者核酸采样时√

45.以下哪些情形可视为体液暴露风险 ( ) [多选题]\*

A.经皮注射或穿刺后√

B.移除侵入性医疗器械后√

C.移除尿布后√

D.清洁脏床单后√

46.接触麻疹或开放性肺结核病人时，医护人员如何防护 ( ) [多选题]\*

A.严格按照区域流程，在不同的区域穿戴使用不同的防护用品，离开时按要求摘脱，并正确处理使用后物品√

B.进入确诊或疑似传染病患者房间时，应戴帽子、医用防护口罩√

C.进行可能产生喷溅的诊疗操作时，应使用全面型防护面罩、穿防护服√

D.当接触患者及其血液、体液、分泌物、排泄物等物质时，应戴手套√

E.正确使用防护用品√

47.污染区是指进行呼吸道传染病诊治的病区中,传染病患者和疑似传染病患者接受诊疗的区域,以及被其体液(血液、组织液等)、分泌物、排泄物污染物品暂存和处理的场所。下列哪些区域属于污染区( ) [多选题]\*

- A.病室✓
- B.患者用后复用物品和医疗器械等的处置室✓
- C.污物间✓
- D.患者入院、出院处理室✓
- E.治疗室

48.关于医院感染监测,以下叙述正确的是( ) [多选题]\*

- A.导尿管相关尿路感染发病率是指使用导尿管住院患者单位导尿管日导尿管相关尿路感染的发病频率✓
- B.医院感染发病(例次)率是指定时间段内住院患者中新发医院感染(例次)的比例✓
- C.住院患者抗菌药物使用率是指住院患者中使用抗菌药物(全身给药)患者数占同期住院患者总数的比例✓
- D.抗菌药物治疗前病原学送检率是指以治疗为目的使用抗菌药物的住院患者中,使用抗菌药物前病原学检验标本送检患者数占同期使用抗菌药物治疗患者总数的比例✓
- E.多重耐药菌医院感染发生率是指多重耐药菌医院感染住院患者数(例次数)占同期住院患者总数的比例✓

49.关于经飞沫传播疾病患者的隔离病区建筑布局与隔离要求中,下列说法正确的是( )。 [多选题]\*

- A.建筑布局应设在医院相对独立的区域,并符合普通病区的建筑布局要求✓
- B.疑似患者应单独安置✓
- C.应配备适量非手触式开关的流动水洗手设施✓

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/925211143034011104>