

2024 年广西壮族自治区《执业药师之西药学综合知识与技能》考试题库及答案（全国通用）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 填写具体；如患卵巢囊肿合并肺部感染注射头孢曲松引起不良反应，应填写肺部感染

A: 不良反应 / 事件的结果

B: 用药起止时间

C: ADR / ADE 过程描述

D: 用药原因

答案：D

2. 在日常饮食因素中，对高血压患者用药疗效影响最大的是

A: 饮茶

B: 食盐

C: 高糖

D: 食醋

答案：B

3. 由于药物的利尿作用，服用后需要大量饮水以防止脱水的是

A: 莫西沙星

B: 苯溴马隆

C: 依替膦酸二钠

D: 氨茶碱

答案：D

4. (2017 年真题) 患者女，6 岁，因发热体温 38.6℃、头痛、鼻塞、流清涕咳嗽、无痰就诊。实验室检查：白细胞、中性粒细胞计正常。临床诊断为普通感冒。

- A: 双氯芬酸钠
- B: 美洛昔康
- C: 尼美舒利
- D: 对乙酰氨基酚

答案：D

5. 女性，32 岁，3 年来月经量增多，乏力、心悸。体检面色较苍白。血红蛋白 80g/L，呈小细胞低色素性贫血，白细胞 $7 \times 10^9 / L$ ，血小板 $120 \times 10^9 / L$ ，血清铁 $300 \mu g / L$ 。

- A: 溶血性贫血
- B: 再生障碍性贫血
- C: 巨幼细胞性贫血
- D: 缺铁性贫血

答案：D

6. 单核细胞正常值参考范围是

- A: 0.03~0.08
- B: 0.20~0.40
- C: 0.01~0.05
- D: 0~0.01

答案：A

7. 属于胆固醇吸收抑制剂的药物是

- A: 辛伐他汀

- B: 甲基多巴
- C: 依折麦布
- D: 非诺贝特

答案：C

8. 对于绝经综合征患者，可根据患者的病情或用药需求，采用不同的药物制剂或给药方式进行绝经激素治疗（MHT）

- A: 雌二醇 / 雌二醇-地屈孕酮片
- B: 17 β -雌二醇
- C: 戊酸雌二醇 / 雌二醇-醋酸环丙孕酮片
- D: 雌二醇-屈螺酮片

答案：D

9. 用于评估癌痛患者疼痛程度的是()

- A: Cochrane 证据分级
- B: APACHE 评分系统
- C: 数字评分法
- D: CTP 评分标准

答案：C

10. 餐后血糖升高为主，伴餐前血糖轻度升高的 2 型糖尿病患者首选

- A: 阿卡波糖
- B: 格列喹酮
- C: 二甲双胍
- D: 比格列酮

答案：D

11. 不属于早期杀菌性抗结核药物的是

- A: 链霉素
- B: 吡嗪酰胺
- C: 异烟肼
- D: 利福平

答案：B

12. (处方容易混淆的常用外文缩写的识别)生理盐水

- A: LD
- B: O
- C: NS
- D: DOL

答案：C

13. 老年增龄导致机体内环境改变，肝肾功能下降，药物在体内的吸收、分布、代谢、排泄及药效发生一系列变化，一些药物的治疗剂量与中毒剂量更加接近，药物不良反应的发生率增高。

- A: 阿司匹林
- B: 维生素 B1
- C: 磺胺异恶唑
- D: 苯巴比妥

答案：B

14. 躯干部出现鞭打状色素沉着的是

- A: 柔红霉素
- B: 白消安
- C: 氟尿嘧啶
- D: 博来霉素

答案：D

15. (2019 年真题) 关于口腔溃疡药物治疗的说法，错误的是

- A: 补充复合维生素 B 和维生素 C 有利于促进溃疡面愈合
- B: 复方甘菊利多卡因凝胶局部涂敷，一日 3 次，稍加按摩
- C: 西地碘含片，一次 6mg，一日 4 次，含服
- D: 氯己定含漱液，每次 15-20ml，一日 2~3 次，含漱

答案：C

16. 能早期发现患者伤害、尽快地采取干预措施的是

- A: 病历审查
- B: 岗位工作问责
- C: 计算机检测方法
- D: 直接观察

答案：C

17. 在中成药活胃胶囊、神曲胃痛片、陈香白露片、复方陈香味片、复方田七胃痛片中，所含有的共同组分是

- A: 氢氧化铝
- B: 碳酸镁
- C: 碳酸氢钠
- D: 氧化镁

答案：C

18. 纳洛酮作解毒剂用于

- A: 有机氟中毒
- B: 阿片中毒
- C: 阿米替林中毒
- D: 巴比妥类中毒

答案：B

19. 阿昔洛韦可导致药源性肾病的机制是

- A: 前列腺素合成障碍
- B: 阻塞肾小管、肾小球
- C: 肾间质纤维化
- D: 不可逆性肾小管坏死

答案：B

20. 混合型高脂血症，首选用的药物是

- A: 贝特类
- B: 烟酸
- C: ω -3 脂肪酸
- D: 他汀类

答案：D

21. 最可能引起血小板计数减少的药物是

- A: 乳酸钠
- B: 阿莫西林
- C: 阿司匹林
- D: 氯丙嗪

答案：C

22. (2019 年真题) 患者，女，56 岁，诊断为高血压伴快速型心律失常，首选的药物是

- A: 美托洛尔
- B: 螺内酯
- C: 维拉帕米

D: 氯沙坦

答案: A

23. 某男性，53 岁，参加婚礼后 5 小时突发左脚第 1 跖趾关节剧痛，3 小时后局部出现红、肿、热、痛和活动困难。实验室检查示血尿酸为 500mol/L;足部 X 线示非特征性软组织肿胀。

A: 尼美舒利

B: 布洛芬

C: 对乙酰氨基酚

D: 阿司匹林

答案: C

24. 易引起心动过缓的药物是

A: 环磷酰胺

B: 氟尿嘧啶

C: 阿霉素

D: 紫杉醇

答案: D

25. 可引起头晕、失眠、抑郁、幻觉、心动过缓、低血压，严重者可诱发支气管哮喘的兴奋剂是

A: B 受体阻断剂

B: 蛋白同化激素

C: 人生长激素

D: 精神刺激剂

答案: A

26. 乳母服用华法林，乳汁中几乎不会含有华法林的机制是其

- A: 呈弱碱性
- B: 呈弱酸性
- C: 解离度大
- D: 在母体血浆中处于结合状态

答案：D

27. 患者，男，46 岁。胃癌根治术后，病理为胃窦低分化腺癌，肝、肾功能正常，化疗方案为奥沙利铂+氟尿嘧啶+亚叶酸钙。

- A: 与氯化钠存在配伍禁忌
- B: 在葡萄糖溶液中稳定
- C: 遇冷可加重其神经毒性
- D: 其神经毒性与剂量大小无关

答案：D

28. 患者，男，64 岁，因“右足肿痛”就诊。查体：右足第一跖趾关节红肿、触痛明显。化验结果：血尿酸 $588.1 \mu\text{mol/L}$ 。诊断为“急性痛风性关节炎”。患者既往有高血压、高胆固醇血症、冠心病病史，目前正服用氢氯噻嗪片 25mgqd、美托洛尔缓释片 47.5mgqd、赖诺普利片 20mgqd、辛伐他汀片 10mgqd、阿司匹林肠溶片 100mgqd。

- A: 阿司匹林片（300mg）
- B: 贝诺酯片
- C: 双氯芬酸钠片
- D: 别嘌醇片

答案：C

29. 依据咳嗽的发病时间，夜间咳嗽者宜首选（）。

- A: 吗啡
- B: 可待因

C: 苯丙哌林

D: 右美沙芬

答案: D

30. 肌酸激酶超过正常值可

A: 诊断痛风

B: 诊断黄疸

C: 诊断心肌梗死

D: 诊断贫血

答案: C

31. 用于治疗溃疡性结肠炎，应晨起服用，达到症状完全缓解后开始减量，减药速度不宜太快的药物是

A: 格列吡嗪

B: 西格列汀

C: 二甲双胍

D: 阿卡波糖

答案: C

32. 代表乙型肝炎病毒核心抗体的是

A: HBeAg

B: HBcAb

C: HBsAb

D: HBeAb

答案: B

33. (毒物及药物中毒解救)，烯丙吗啡用于解救

A: 氰化物中毒

- B: 水银中毒
- C: 吗啡中毒
- D: 有机磷中毒

答案：C

34. 以下有关高血压的药物治疗方案的叙述中，不正确的是

- A: 采用最小有效剂量，根据需要可考虑逐渐增加
- B: 药物治疗高血压时要考虑患者的合并症
- C: 可采用两种或两种以上药物联合用药
- D: 首先选用血管扩张剂和中枢性抗高血压药

答案：D

35. 单个样品量足够的随机对照试验结果属于

- A: 一级证据
- B: 四级证据
- C: 二级证据
- D: 三级证据

答案：C

36. 举重运动员使用后,可短时间内急速降低体重, 因此需按兴奋剂管理的药物是()

- A: 普茶洛尔
- B: 硝苯地平
- C: 呋塞米
- D: 缬沙坦

答案：C

37. 中成药舒肝丸具有舒肝和胃、理气止痛的功效，与其合用会导致作用相反、降低药效的药物是

- A: 地高辛
- B: 氯苯那敏
- C: 复方利血平
- D: 甲氧氯普胺

答案：D

38. 下列药物中服用后不影响驾驶行为的是（）

- A: 左甲状腺素钠片
- B: 东莨菪碱片
- C: 氟桂利嗪胶囊
- D: 阿米洛利片

答案：A

39. 口服或静脉滴注 β 受体拮抗剂用于解救

- A: 异烟肼中毒
- B: 麦角胺中毒
- C: 亚硝酸盐中毒
- D: 克仑特罗中毒

答案：D

40. 以下药物中，可引起粒细胞减少症的是（）。

- A: 甲氨蝶呤
- B: 巯嘌呤
- C: 吲哚美辛
- D: 环磷酰胺

答案：C

41. 患者，女，55 岁，患骨质疏松症伴食管裂孔疝，该患者避免使用的治疗药是

- A: 阿仑膦酸钠
- B: 特立帕肽
- C: 雷洛昔芬
- D: 鲑鱼降钙素

答案：A

42. 粪便隐血可见于

- A: 口腔溃疡
- B: 胃溃疡
- C: 湿疹
- D: 痛经

答案：B

43. 高度心脏传导阻滞抗高血压药物的禁忌证

- A: 依那普利
- B: 维拉帕米
- C: 氢氯噻嗪
- D: 美托洛尔

答案：D

44. 上消化道出血(>50ml)可呈现

- A: 白陶土便
- B: 乳凝块便
- C: 鲜血便
- D: 柏油黑便

答案：D

45. 据统计，全国高血压患者已经超过 2 亿，高血压患者中不足三成的人知道自己患病；而知道自己患有高血压的患者中，一半多没有应用药物治疗；而接受治疗的患者中，能达到治疗要求的仅占三成左右。高血压死亡率不断升高，因此熟悉高血压及其相关治疗用药，对更有效地防治高血压非常重要。

- A: 依那普利
- B: 哌唑嗪
- C: 氢氯噻嗪
- D: 美托洛尔

答案：D

46. 抗高血压药物中，噻嗪类利尿药的主要不良反应为()。

- A: 房室传导阻滞，心功能抑制
- B: 直立性低血压
- C: 血钾增高
- D: 血钾减低、血钠减低、血尿酸升高

答案：D

47. (2018 年真题) 患者,女,67 岁,有高血压病史,右手抖动行走缓慢 4 年,诊断为帕金森病。服用复方左旋多巴治疗,症状一度好转后又反复加重,随后采用加大复方左旋多巴剂量,并加用苯海索。患者同时服用氨氯地平、缬沙坦等药物控制血压近日出现运动症状波动,伴有异动症。导致该不良反应的药物是()

- A: 左旋多巴
- B: 苄丝肼
- C: 苯海索

D: 氨氯地平

答案：A

48. (2018 年真题) 患者, 男, 57 岁, 化验结果: TC4.6mmol/L (参考值 <5.2mmol/L), TG11.0mmol/L (参考值 0.56——1.70mmol/L) 尿酸 508umol/L (参考值 <420umol/L), 应首选的调脂药物为 ()

A: 考来烯胺

B: 烟酸

C: 非诺贝特

D: 依折麦布

答案：C

49. 能用结论较肯定的药物就不用新药, 即

A: 选用对胎儿危害较小的药物

B: 可用可不用的药物应尽量不用或少用

C: 用药必须有明确的指征和适应证

D: 禁止用试验性药

答案：D

50. (2016 年真题) 下列药物中服用后可在乳汁中分泌较多的是 ()。

A: 头孢呋辛

B: 青霉素 G

C: 华法林

D: 地西洋

答案：D

51. 患者，男性，45 岁，无痛性肉眼血尿 6 个月来诊，患者于 6 个月前无意中发现排尿全程尿色发深，呈酱油色，无腰痛，尿频，排尿困难，排尿后尿不尽，结合尿常规检查，诊断为良性前列腺增生。

- A: 特拉唑嗪
- B: 坦索罗辛
- C: 非那雄胺
- D: 奥昔布宁

答案：C

52. 噻嗪类利尿剂的主要不良反应是

- A: 支气管痉挛
- B: 足踝部水肿
- C: 直立性低血压
- D: 血尿酸升高

答案：D

53. （2017 年真题）治疗水疱型脚癣宜选用（）

- A: 阿昔洛韦软膏
- B: 复方苯甲酸酊
- C: 维 A 酸乳膏
- D: 氢化可的松软膏

答案：B

54. 噻托溴铵平喘的主要机制是

- A: 拮抗 M 胆碱受体
- B: 阻断腺苷受体
- C: 抑制白三烯受体
- D: 激动肾上腺素 β_2 受体

答案：A

55. 患者，女，42 岁。临床诊断“小三阳”，其临床意义是

- A: HBeAg 阳性
- B: HBsAg、HBeAg 和 HBcAb 同为阳性
- C: HBsAg、HBeAb 和 HBcAb 同为阳性
- D: HBsAg 阳性

答案：C

56. 患者，男，53 岁，因纳差、食欲减退来药店购药，药师应推荐的药品是
()

- A: 多潘立酮片
- B: 酵母片
- C: 乳酶生片
- D: 甲氧氯普胺片

答案：B

57. 药品临床评价具有“公正性和科学性”是基于

- A: 应用医药学理论和实践的前沿知识
- B: 在多学科新进展的基础上进行
- C: 药品临床评价重在实践
- D: 药品临床评价采用多中心、大样本、随机、双盲、对照的方法，经数理统计得出结论

答案：D

58. 通过直接阻断 α

- A: 硝苯地平
- B: 利血平

C: 甲基多巴

D: 哌唑嗪

答案: D

59. (2018 年真题) 患者, 女, 49 岁, 近日因发热、咳嗽、咳黄痰就诊, 临床诊断为下呼吸道细菌性感染, 处方如下:

A: 服药期间及停药一周内, 避免饮用含酒精饮品

B: 用牛奶服药, 减少对胃肠道的刺激

C: 服药期间, 可能会发生便秘

D: 服药时避免与钙片同服, 以免影响药物的作用

答案: B

60. 氟马西尼用于解救

A: 氰化物中毒

B: 三唑仑中毒

C: 有机磷中毒

D: 汞中毒

答案: B

61. 提示"药物都应保存在原始包装中, 并不要将瓶外的标签撕掉", 是针对

A: 药品贮存

B: 药品有效期

C: 特殊剂型用法

D: 特殊装置药品

答案: A

62. 主要用于降低三酰甘油的药物是

- A: 普罗布考
- B: 贝丁酸类
- C: 考来烯胺
- D: 他汀类

答案：B

63. 患者,女,68岁,体重45kg,因发热、咳嗽咳痰入院治疗,临床诊断为社区获得性肺炎。化验结果:白细胞计数 $11.76 \times 10^9/L$,肌酐清除率 18ml/min。该患者使用下列抗菌药物治疗时不需要减量的是()

- A: 左氧氟沙星
- B: 头孢噻肟钠
- C: 阿莫西林
- D: 莫西沙星

答案：D

64. 相互作用延缓或降低抗药性的联合用药是

- A: 普萘洛尔联用硝苯地平
- B: 青蒿素联用乙胺嘧啶
- C: 阿托品联用普萘洛尔
- D: 阿托品联用氯磷定

答案：B

65. (处方缩写)餐后的缩写为

- A: iv
- B: qid
- C: q4h
- D: pc

答案：D

66. 糖尿病患者尿常规检查可发现

- A: 尿葡萄糖阳性
- B: 尿胆红素阳性
- C: 尿淀粉酶增高
- D: 尿血红蛋白阳性

答案：A

67. （2019 年真题）用药时宜限制饮水的药物是

- A: 胶体果胶铋胶囊
- B: 环丙沙星片
- C: 苯溴马隆胶囊
- D: 利托那韦片

答案：A

68. 下列情况不宜选用的抗高血压药，直立性低血压不宜选用

- A: 利尿药
- B: 哌唑嗪
- C: 非二氢吡啶类钙拮抗剂
- D: ACEI

答案：B

69. 药师在接受护士用药咨询时，应重点关注的内容是

- A: 注射剂的配制和滴注速度等
- B: 药品的生产厂商和批号
- C: 药品经济学知识
- D: 药物制剂的等效性

答案：A

70. 患者，女，42 岁。左足背部出现严重冻疮，可考虑应用

- A: 樟脑软膏
- B: 紫云膏
- C: 赛庚啶
- D: 肝素钠乳膏

答案：D

71. 查找药物信息的正确顺序是()。

- A: 二级信息源→一级信息源→三级信息源
- B: 三级信息源→二级信息源→一级信息源
- C: 二级信息源→三级信息源→一级信息源
- D: 一级信息源→二级信息源→三级信息源

答案：B

72. 为氧化剂，不能用于乐果中毒的洗胃液是

- A: 活性炭混悬液
- B: 淀粉溶液
- C: 1：5000 高锰酸钾
- D: 3%鞣酸溶液

答案：C

73. (2015 年真题) 患者，女，51 岁，体检时发现血压 160/105mmHg，糖耐量试验餐后 2 小时血糖为 9.56mmol/L (参考范围 <7.8mmol/L)，甘油三酯 1.52mmol/L (参考范围 0.56~1.70mmol/L)，总胆固醇 6.26mmol/L (参考范围 <5.2mmol/L)，低密度脂蛋白胆固醇 4.85mmol/L (参考范围 2.1~3.1mmol/L)，高密度脂蛋白胆固醇 1.20mmol/L (参考范围 1.2~1.65mmol/L)，肌酐 $60\mu\text{mol/L}$ (参考范围 $45\sim 84\mu\text{mol/L}$)，蛋白尿：++。临床诊断为高血压病、高脂血症、糖耐量异常。

- A: 减少脂肪摄入
- B: 控制体重
- C: 不必限盐
- D: 适当运动

答案：C

74. 患者，男，54 岁，2 周前痛风急性发作，经治疗后病情缓解，后期针对其痛风的治疗不宜选用的药物是()

- A: 别嘌醇
- B: 秋水仙碱
- C: 苯溴马隆
- D: 非布索坦

答案：B

75. 可单独用于轻度、早期高血压的是

- A: 阿米洛利
- B: 氢氯噻嗪
- C: 呋塞米
- D: 甘露醇

答案：B

76. 根据循证医学研究，与利尿药和 β 受体拮抗剂相比，硝苯地平可有效降低血压，但可能增加何种危险

A: 心动过缓

B: 肾衰竭

C: 心肌梗死和死亡

D: 肝功能不全

答案: C

77. 能刺激骨骼、肌肉和组织生长发育的是

A: 麻醉药品

B: 利尿剂

C: 蛋白同化激素

D: 肽类激素

答案: D

78. 患者，女，36 岁。餐后出现恶心、呕吐，可选用的药物是

A: 鞣酸蛋白

B: 甲氧氯普胺或多潘立酮片

C: 二甲硅油制剂

D: 维生素 C

答案: B

79. 在配制静脉输液时，不宜用葡萄糖注射液溶解的药品是

A: 两性霉素 B

B: 青霉素

C: 盐酸万古霉素

D: 维生素 K

答案: B

80. 对目标适应证患者的治疗作用的初步评价是指

A: III期临床试验

B: I 期临床试验

C: 临床预试验

D: II 期临床试验

答案: D

81. 适用于有完整子宫、绝经后期不希望有月经样出血的妇女()

A: 雌孕激素连续联合用药

B: 单纯雌激素补充治疗

C: 雌孕激素序贯用药

D: 单纯孕激素补充治疗

答案: A

82. 药学服务的特殊人群

A: 血液透析者

B: 医务人员

C: 广大公众

D: 护理人员

答案: A

83. 患者，男，45 岁，临床诊断肝内胆管梗阻。下列指标最可能出现的是

A: 血肌酐降低

B: 白蛋白升高

C: γ -谷氨酰转移酶升高

D: 肌酸激酶降低

答案: C

84. 心力衰竭伴心绞痛应首选的药物是

A: 硝酸甘油

B: 单硝酸异山梨酯

C: 美托洛尔

D: 氨氯地平

答案: C

85. 可迅速崩解和释放药物的制剂

A: 透皮贴剂

B: 滴丸剂

C: 膜剂

D: 泡腾片剂

答案: D

86. 饮用含葡萄柚汁的饮料可能影响一些药物药动学的机制是

A: 诱导 CYP3A4

B: 抑制 CYP2C9

C: 抑制 CYP3A4

D: 抑制 CYP1A2

答案: C

87. 氟西汀与血浆蛋白的结合力强，使同服的华法林或洋地黄毒苷游离型浓度超出安全范围归属

A: 药物的使用

B: 药理作用

C: 药物制剂因素

D: 药动学相互作用

答案: D

88. 可出现锥体外系反应的是

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

A: 双嘧达莫

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/925234140122012033>