

2024 年广东省博罗县《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题真题下载答案

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 关于丁螺环酮治疗焦虑症的优点，下列说法不正确的为

- A: 起效快
- B: 镇静作用轻
- C: 无呼吸抑制
- D: 较少引起运动障碍

答案：A

2. （2015 年真题）患儿，女，4 岁半，身高 110cm，体重 15kg，一天前开始发热（39.1℃），咽稍痛，无咳嗽，无吐泻，家长在家选用退烧药对症治疗。发热 20h 左右出现腹泻，约 2~3h 一次大便，量少，黄色粘液便，呕吐 1 次。体格检查，T38.8℃，P118 次/分，R28 次/分，咽微充血。出现轻微脱水症状。双肺呼吸音清，腹平软，肝脾未触及，肠鸣音活跃。实验室检查：WBC $18.5 \times 10^9/L$ （参考值 $4.0 \times 10^9 \sim 10.0 \times 10^9$ ），粪便镜检可见红、白细胞。

- A: 小檗碱和鞣酸蛋白不宜同时服用
- B: 腹泻可致电解质丢失，故须特别注意补充
- C: 药用炭可以吸附细菌和毒素，可与抗生素同时服用
- D: 首选口服补液，必要时静脉补液

答案：C

3. 关于他汀类和贝特类的联合使用，下列说法正确的是

- A: 晚间服用
- B: 早晚分别服用
- C: 早晨服用贝特类、而晚上服用他汀类
- D: 早晨服用

答案：C

4. 患者男性，35 岁，髋关节置换术后 7 天，患者右侧下肢肿胀、疼痛，抬高患肢后可好转。

- A: 病理性骨折
- B: 下肢动脉栓塞
- C: 下肢深静脉血栓形成
- D: 肺动脉栓塞

答案：C

5. 患者，男性，36 岁，主因“反复上腹部疼痛 3 年，加重伴黑便 2 天”以“胃溃疡”收住入院。患者于入院 3 年前，餐后偶感上腹部隐痛不适，曾在当地医院做胃镜检查示“胃溃疡”。经住院给予对症治疗（具体药物及剂量不详）后症状有所好转。入院前 2 天开始，上述症状发作较为频繁，以胃灼痛为主，多以辛辣刺激及不良饮食为诱因，伴反酸及暖气，并伴有黑便，呈糊状，共排 3 次，每次约 250g 左右，同时伴有恶心。患者自发病以来，无头晕及头痛，有恶心但无呕吐，无胸闷及心慌，无咳嗽及咳痰，无腹泻，体重未见明显增减。查体：T36.2℃、P84 次/分、R20 次/分、BP110/70mmHg，腹平软，未见腹壁静脉显露及胃肠型和蠕动波，中上腹压痛但无反跳痛，肝、脾未扪及，肝、肾区无叩痛，移动性浊音阴性，肠鸣音 3~5 次/分。辅助检查：①便常规：红细胞满视野，隐血阳性；②胃镜检查：胃壁左侧有 1.5cm×2cm 椭圆形溃疡；③尿素酶试验（+）。诊断结论：胃溃疡合并上消化道出血，幽门螺杆菌感染。

- A: 尿素呼气试验
- B: 尿素酶试验
- C: 尿酮体试验
- D: 粪便隐血试验

答案：A

6. 高热不退、头痛、谵妄以致昏迷

- A: 神经型
- B: 胃肠型
- C: 病毒型
- D: 肺炎型

答案：A

7. 属于选择性 5-HT₄ 受体激动剂，促进乙酰胆碱释放的促胃肠动力药是

- A: 甲氧氯普胺
- B: 多潘立酮
- C: 莫沙必利
- D: 昂丹司琼

答案：C

8. 中成药血脂康中航油的化学成分是

- A: 洛伐他汀
- B: 阿托伐他汀
- C: 辛伐他汀
- D: 依折麦布

答案：A

9. 解救经口急性铅中毒的洗胃液是

- A: 1%硫酸铜
- B: 1%氯化钠
- C: 1%硫酸镁
- D: 3%过氧化氢

答案：C

10. 可稀释痰液，并借助咳嗽反射以帮助痰液排出，避免阻塞气道的药品是

- A: 羧甲司坦
- B: 沙丁胺醇
- C: 布地奈德
- D: 扎鲁司特

答案：A

11. 患者，男，68 岁，既往体健，因“受凉后咳嗽、咳黄脓痰，伴发热 2 天”入院。查体：体温 39.1℃，血压 138 / 80mmHg，心率 102 次 / 分，呼吸 32 次 / 分，左肺可闻及湿性啰音。化验结果：白细胞计数 $11.2 \times 10^9 / L$ ，中性粒细胞百分比 85%。胸部 x 线：左肺下叶渗出性阴影。痰培养结果待归。入院诊断：社区获得性肺炎。

- A: 阿莫西林-克拉维酸钾+阿奇霉素
- B: 多西环素
- C: 左氧氟沙星+阿奇霉素
- D: 阿奇霉素

答案：A

12. 预激综合征伴房颤患者，控制心室率时慎用的药物为

- A: 硝苯地平

B: 去乙酰毛花苷

C: 胺碘酮

D: 利伐沙班

答案：B

13. 结核病、水痘、麻疹、百日咳、流行性腮腺炎等传染病可呈现

A: 单核细胞增多

B: 中性粒细胞增多

C: 嗜酸性粒细胞增多

D: 淋巴细胞增多

答案：D

14. 患者，男性，30 岁，确诊为支气管哮喘，入院治疗 3 周，经正规治疗病情缓解，仅偶有胸闷，出院时医生嘱咐了一些用药注意事项。

A: B 受体阻断剂

B: 抗胆碱能药物

C: B 受体激动剂

D: 钙通道阻滞剂

答案：A

15. （2016 年真题）患者，女，35 岁，临床诊断为高甘油三酯血症，临床上给予非诺贝特进行治疗，该药正确的用量为（）。

A: 0.5g，tid

B: 0.2g，qd

C: 0.5g，qd

D: 0.1g，tid

答案：D

16. 香豆素类杀鼠药中毒的特效解毒剂是（）

- A: 青霉胺
- B: 维生素 K1
- C: 纳洛酮
- D: 乙酰胺

答案：B

17. 治疗痔疮的常用内服药是

- A: 九华膏
- B: 聚甲酚磺醛栓
- C: 地奥司明
- D: 联苯苄唑乳膏

答案：C

18. 急诊处方药品用量一般不宜超过

- A: 7 日用量
- B: 3 日用量
- C: 1 日用量
- D: 15 日用量

答案：B

19. 以下药物中毒事例中不宜用硫酸镁导泻的是

- A: 降血糖药中毒
- B: 抗结核药中毒
- C: 镇静药中毒
- D: 解热镇痛药中毒

答案：C

20. (2019 年真题) 患儿，男，1 岁 4 个月，家长为预防幼儿缺钙，每日给患儿服用维生素 D5000IU，3 个月后患儿出现乏力、恶心、呕吐、食欲不振等症状，化验结果：血钙 18mg/dl，25-OH-D3 水平 632ng/ml。诊断为维生素 D 中毒，下列处理措施错误的是

- A: 停用维生素 D 及强化食品
- B: 停用钙剂
- C: 停饮牛奶
- D: 增加日晒

答案：D

21. 下列药物中，能解救香豆素类灭鼠药中毒的是

- A: 阿托品
- B: 维生素 K
- C: 乙酰胺
- D: 维生素 B

答案：B

22. “药师参与临床药物治疗，提供药学服务的重要方式和途径”的工作是

- A: 处方调剂
- B: 治疗药物监测
- C: 静脉药物配置
- D: 参与临床药物治疗

答案：B

23. 可引起血清总蛋白降低的是

- A: 摄入不足、消化不良时
- B: 慢性肝炎、肝硬化、肝实质性损害

C: 各种原因脱水所致的血液浓缩

D: 自身免疫性疾病如风湿热、红斑狼疮等

答案：A

24. 用于解救苯二氮草类药物中毒的特殊解毒剂是

A: 氟马西尼

B: 亚甲蓝

C: 乙酰半胱氨酸

D: 纳洛酮

答案：A

25. 遭遇蛇类咬伤，最先采取的应急措施是

A: 就地取材将伤口捆扎

B: 用布带等在伤口的近心端 5cm 处捆住

C: 用绳索等在伤口的近心端捆扎

D: 就地取材在伤口的远心端捆扎

答案：B

26. 向患者发放合理用药宣传材料是

A: 质问方式

B: 主动方式

C: 指令方式

D: 被动方式

答案：B

27. (2021 年真题) 静脉滴速过快，易致红人综合征的药物是 ()

A: 头孢哌酮

B: 克拉霉素

C: 美罗培南

D: 万古霉素

答案: D

28. 适用于伴快速型心律失常的高血压患者服用的药物是

A: 阿利吉仑

B: 阿替洛尔

C: 多沙唑嗪

D: 氢氯噻嗪

答案: B

29. 可用口服吐根糖浆 15ml，饮水 500ml 催吐解救的中毒是

A: 三唑仑中毒

B: 丙戊酸钠中毒

C: 丙米嗪中毒

D: 磷化锌中毒

答案: C

30. 患者，女性，46 岁。半年来食欲减退、易疲劳，查体发现多处淋巴结肿大，尤以颈部淋巴结为甚。骨髓抽取及切片、放射线检查（X 线、淋巴摄影）后诊断为恶性淋巴瘤。

A: 脱发

B: 骨髓抑制

C: 恶心、呕吐

D: 食欲下降

答案: B

31. 血脂调节药的合理应用有效降低 LDL-C 和 TG 水平，升高 HDL-C 水平的是（）

- A: 他汀类与贝特类联用
- B: 依折麦布
- C: 伊曲康唑
- D: 普罗布考

答案：A

32. 分娩前应用氯霉素可引起新生儿

- A: 核黄疸
- B: 灰婴综合征
- C: 腹泻
- D: 肺炎

答案：B

33. 可导致胎儿颅面部畸形、腭裂的药物是

- A: 雌激素、孕激素、雄激素
- B: 叶酸拮抗剂
- C: 沙利度胺
- D: 苯巴比妥

答案：B

34. 洋地黄中毒引起的快速性心律失常，首选下列哪种药物

- A: 阿托品
- B: 苯妥英钠
- C: 普鲁卡因胺
- D: 普萘洛尔

答案：B

35. 患者，男，70 岁，2 周以来出现尿频、夜尿次数明显增多，且尿流变细、间断，排尿踌躇、费力等排尿困难现象，排尿后滴沥、尿不尽，近几天又出现睡眠障碍。

- A: 急迫性尿失禁
- B: 急性肾盂肾炎
- C: 膀胱炎
- D: 压力性尿失禁

答案：B

36. 苯丙胺中毒出现

- A: 明显的锥体外系症状
- B: 肌肉震颤、抽搐
- C: 心血管毒性
- D: 谵妄、躁狂、幻觉

答案：D

37. 下述“药物治疗慢性阻塞性肺疾病的目的”中，不正确的是

- A: 排痰化痰
- B: 减少病死率
- C: 预防疾病进展
- D: 缓解呼吸道症状

答案：A

38. 孕妇的急性膀胱炎治疗时间为（）

- A: 8-10 天
- B: 5-10 天
- C: 3-7 天

D: 10-15 天

答案：C

39. 患者,男,53 岁,因纳差、食欲减退来药店购药,药师应推荐的药品是
()

A: 酵母片

B: 甲氧氯普胺片

C: 多潘立酮片

D: 乳酶生片

答案：A

40. (2017 年真题) 可分泌到乳汁中引起新生儿黄疸的药物是 ()

A: 阿莫西林

B: 诺氟沙星

C: 头孢克洛

D: 复方磺胺甲噁唑

答案：D

41. 治疗干眼症人工泪液合理的起始应用剂量是每只眼

A: 一滴, 一日 4 次

B: 三滴, 一日 4 次

C: 二滴, 一日 4 次

D: 一滴, 一日 2 次

答案：A

42. 以下药品中, 可能导致老年人中枢神经系统高反应性等不良反应的是

A: 氯苯那敏

B: 氨氯地平

C: 地西泮

D: 呋塞米

答案: C

43. 关于改善认知功能的药物治疗，下列说法不正确的为

A: 氯化铵抑制美金刚的排泄

B: 帕罗西汀可使加兰他敏作用增强

C: 应用多奈哌齐时要监测胃出血

D: 卡巴拉汀于早晨和晚上与食物同服

答案: A

44. 氯化钾注射液的正确给药方法是

A: 直接肌肉注射

B: 鞘内注射给药

C: 直接静脉注射

D: 稀释后静脉滴注

答案: D

45. 成人末梢血白细胞的参考范围是

A: $(4.0 \sim 10.0) \times 10^9/L$

B: $(4.0 \sim 5.5) \times 10^9/L$

C: $(3.5 \sim 10.0) \times 10^9/L$

D: $(15.0 \sim 20.0) \times 10^9/L$

答案: A

46. 患者，男，35 岁，髋关节置换术后 7 天，患者右侧下肢肿胀、疼痛，抬高患肢后可好转。

- A: 肝素
- B: 华法林
- C: 利伐沙班
- D: 氯吡格雷

答案：D

47. 1 类手术切口应用第三代头孢菌素，应评判为

- A: 联合用药不适宜
- B: 有禁忌证用药
- C: 过度治疗用药
- D: 无适应证用药

答案：D

48. 提示：不要驾车，操作机器或高空作业等，是针对

- A: 卡托普利
- B: 氯苯那敏
- C: 铋制剂
- D: 氟西汀

答案：B

49. 根据循证医学研究，与利尿药和 β 受体拮抗剂相比，硝苯地平可有效降低血压，但可能增加何种危险

- A: 肾衰竭
- B: 心动过缓
- C: 肝功能不全
- D: 心肌梗死和死亡

答案：D

50. 治疗急迫性尿失禁的首选药物是

- A: 抗胆碱能药物
- B: α_1 阻断剂
- C: 选择性 α_1 激动剂
- D: 5α 还原酶抑制剂

答案：A

51. 吩噻嗪类抗精神病药中毒癫痫发作时给予（）

- A: 阿托品
- B: 苯妥英钠
- C: 去甲肾上腺素
- D: 有机硫类

答案：B

52. （2019 年真题）配制下列化疗药时，只能选择葡萄糖注射液做溶媒的是

- A: 环磷酰胺
- B: 博来霉素
- C: 依托泊苷
- D: 奥沙利铂

答案：D

53. 以下治疗咳嗽的药物中，白天工作的驾驶员可选用止咳的非处方药是

- A: 苯丙哌林
- B: 可待因
- C: 氨溴索
- D: 羧甲司坦

答案：A

54. 接种乙肝疫苗后，血清免疫学检查可呈现阳性反应的指标是

- A: 乙型肝炎病毒 e 抗体？
- B: 乙型肝炎病毒 e 抗原？
- C: 乙型肝炎病毒表面抗体？
- D: 乙型肝炎病毒表面抗原？

答案：C

55. 纳洛酮作解毒剂用于

- A: 巴比妥类中毒
- B: 阿米替林中毒
- C: 阿片中毒
- D: 有机氟中毒

答案：C

56. 低致吐性化疗药物所引起的恶心、呕吐，宜选用止吐治疗方案是

- A: 化疗联合使用昂丹司琼和地塞米松，化疗结束后给予地塞米松或昂丹司琼
- B: 化疗前使用阿瑞吡坦，化疗后需要继续使用止吐药
- C: 化疗前联合使用昂丹司琼、地塞米松和阿瑞吡坦，化疗结束后给予阿瑞吡坦和地塞米松
- D: 化疗前使用昂丹司琼，化疗后不需要继续使用止吐药

答案：D

57. HMG-CoA 还原酶抑制剂

- A: 考来烯胺
- B: 吉非贝齐

C: 阿昔莫司

D: 辛伐他汀

答案: D

58. 药品不良反应 (ADR) 的机制和影响因素错综复杂，遇到可疑 ADR 时，需要进行因果关系评价

A: 可能

B: 可能无关

C: 肯定

D: 很可能

答案: C

59. 人体正常体温的标准是直肠温度不超过

A: 36.6℃

B: 37.6℃

C: 36.9

D: 37.2℃

答案: B

60. 用药后有可能出现球后视神经炎的抗结核药是

A: 乙胺丁醇

B: 链霉素

C: 吡嗪酰胺

D: 利福平

答案: A

61. 胃食管反流病的患者应避免使用的药物是

A: 特拉唑嗪

- B: 阿司匹林
- C: 阿仑膦酸钠
- D: 美托洛尔

答案：C

62. 患者，男，72 岁，以“间断发热、纳差、精神抑郁半年，再发高热 1 天”为主诉入院，既往体健，无高血压、糖尿病、冠心病史。入院时查体：T36.9℃，P88 次/分，R22 次/分，BP112/77mmHg，可触及颈部、锁骨上、腋下多部位浅表淋巴结肿大。经实验室检查、影像学检查，确诊为非霍奇金淋巴瘤。

- A: 根据患者的体重计算抗肿瘤药物给药剂量
- B: 抗肿瘤药物选择在每个疗程的第一天给药
- C: 抗肿瘤药物均采用静脉给药
- D: 每 21 天为 1 个疗程

答案：A

63. 关于新型抗凝药物，下列说法不正确的是

- A: 与食物和药物相互作用小
- B: 需监测 INR
- C: 达比加群酯直接作用于凝血酶(主要是 IIa 因子)
- D: 可特异性阻断凝血瀑布中的某关键环节

答案：B

64. 一些药品吸收二氧化碳发生碳酸化，归属于

- A: 温度
- B: 日光
- C: 湿度
- D: 空气

答案：D

65. 下列哪种药物不会引起丙氨酸氨基转移酶 (ALT、GPT) 升高 ()。

- A: 阿昔洛韦
- B: 克林霉素
- C: 氟康唑
- D: 硝苯地平

答案：D

66. 根据血红蛋白含量评估缺铁性贫血程度重度贫血为

- A: 120~160g / L
- B: 30~60g / L
- C: 60~90g / L
- D: 90~120g / L

答案：B

67. 属于中枢和外周多巴胺 D₂ 受体阻断剂，具有镇吐、刺激泌乳素释放的促胃肠动力药是

- A: 甲氧氯普胺
- B: 莫沙必利
- C: 多潘立酮
- D: 昂丹司琼

答案：A

68. 通风急性发作期应禁用的药物是：

- A: 碳酸氢钠
- B: 别嘌醇
- C: 秋水仙碱

D: 布洛芬

答案：B

69. 连续使用可以引起便秘，宜在清晨空腹服用，并大量饮水，以加速导泻并防止脱水的药物是

A: 聚乙二醇 4000

B: 比沙可啶

C: 乳果糖

D: 硫酸镁

答案：D

70. 处方用药须与临床诊断密切相符，医师开具的处方在病情与诊断栏中应明确记录对患者的临床诊断。药师应审查处方用药与临床诊断的相符性，以加强合理用药监控。

A: 无适应证用药

B: 无正当理由过度治疗用药

C: 有禁忌证用药

D: 无正当理由超适应证用药

答案：D

71. 少数人用后可出现视力降低和辨色困难

A: 金刚烷胺

B: 硝酸甘油

C: 布洛芬

D: 西咪替丁

答案：C

72. “沟通技能”在药学服务工作中最重要的作用是

- A: 用药监督作用
- B: 药物警戒作用
- C: 应对投诉作用
- D: 双向交流作用

答案：D

73. 属于妊娠 C 级毒性药品的是

- A: 氧氟沙星
- B: 辛伐他汀
- C: 水溶性维生素
- D: 青霉素、头孢哌酮-舒巴坦

答案：A

74. 患者，男，50 岁，血压 170 / 95mmHg，伴有双侧肾动脉狭窄，单药治疗控制血压效果不佳，宜选用的联合用药方案是

- A: 利尿剂+AR
- B: α 受体阻断剂+ACEI
- C: 利尿剂+D-CCB
- D: β 受体阻断剂+ARB

答案：C

75. 女，30 岁。G2P1 既往月经规律，月经量少，身体健康，要求长期采取避孕措施。

- A: 长效口服避孕药
- B: 紧急避孕药
- C: 宫内节育器
- D: 安全期避孕

答案：C

76. 患者女，64 岁，10 天来夜间咳嗽，痰多，诊断为急性支气管炎，除了抗感染治疗外，在选服右美沙芬时应加用的药品是

- A: 氨茶碱
- B: 氨溴索
- C: 洛贝林
- D: 可待因

答案：B

77. 属于容积性泻药的药物是

- A: 甘油栓
- B: 硫酸镁
- C: 比沙可啶
- D: 乳果糖

答案：B

78. 药师应对处方进行审核、依照处方准确、快速地调配

- A: 有效性
- B: 经济性
- C: 法律性
- D: 技术性

答案：D

79. 1g 葡萄糖可提供机体的能量是

- A: 2kcal
- B: 3kcal
- C: 4kcal
- D: 1kcal

答案：C

80. (2021 年真题) 哺乳期妇女使用，可致男婴乳房增大的药物是 ()

- A: 胰岛素
- B: 依那普利
- C: 复方磺胺甲噁唑
- D: 复方炔诺酮

答案：D

81. 用药时宜限制饮水的药物是 ()

- A: 苯溴马隆胶囊
- B: 环丙沙星片
- C: 利托那韦片
- D: 胶体果胶铋胶囊

答案：D

82. 患者，男性，36 岁，主因“反复上腹部疼痛 3 年，加重伴黑便 2 天”以“胃溃疡”收住入院。患者于入院 3 年前，餐后偶感上腹部隐痛不适，曾在当地医院做胃镜检查示“胃溃疡”。经住院给予对症治疗（具体药物及剂量不详）后症状有所好转。入院前 2 天开始，上述症状发作较为频繁，以胃灼痛为主，多以辛辣刺激及不良饮食为诱因，伴反酸及暖气，并伴有黑便，呈糊状，共排 3 次，每次约 250g 左右，同时伴有恶心。患者自发病以来，无头晕及头痛，有恶心但无呕吐，无胸闷及心慌，无咳嗽及咳痰，无腹泻，体重未见明显增减。查体：T36.2℃、P84 次/分、R20 次/分、BP110/70mmHg，腹平软，未见腹壁静脉显露及胃肠型和蠕动波，中上腹压痛但无反跳痛，肝、脾未扪及，肝、肾区无叩痛，移动性浊音阴性，肠鸣音 3~5 次/分。辅助检查：①便常规：红细胞满视野，隐血阳性；②胃镜检查：胃壁左侧有 1.5cm×2cm 椭圆形溃疡；③尿素酶试验（+）。诊断结论：胃溃疡合并上消化道出血，幽门螺杆菌感染。

A: 左氧氟沙星 500mgqd+呋喃唑酮 100mgbid+四环素 500mgqid+枸橼酸铋钾 220mgbid，疗程 2 周

B: 克拉霉素 500mgbid+左氧氟沙星 200mgbid+甲硝唑 400mgqid+艾司奥美拉唑 20mgbid，疗程 2 周

C: 阿莫西林 1000mgbid+克拉霉素 500mgbid+艾司奥美拉唑 20mgbid+枸橼酸铋钾 220mgbid；疗程 2 周

D: 四环素 500mg tid+甲硝唑 400mg tid+艾司奥美拉唑 20mgbid+枸橼酸铋钾 220mgbid。疗程 2 周

答案：D

83. 羧甲基纤维素钠治疗痉挛性便秘，老年人的一日量不宜超过

A: 2g

B: 1g

C: 2.5g

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

D: 3g

答案：A

84. 用于治疗前列腺增生症的高选择性 α_1A 受体阻断剂为

A: 托特罗定

B: 坦索罗辛

C: 特拉唑嗪

D: 索利那新

答案：B

85. 服药时饮酒可引起低血糖的是

A: 硫酸亚铁

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/926215041101011030>