北京住院医师儿外科Ⅰ阶段：新生儿外科

姓名:_____ 年级:_____ 学号:_____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

1、单项选择题：一个 7d 足月新生儿，生后 3d 出现黄疸，吃奶及精神好。血红蛋白 155g／L，血清胆红素 170μmol／L，结合胆红素 3．5μmol／L，可能的诊断为（　　）。A.新生儿溶血病

B.新生儿肝炎

C.新生儿败血症

D.生理性黄疸

E.先天性甲状腺功能低下

2、单项选择题：新生儿溶血病发生胆红素脑病（核黄疸）一般在生后（　　）。A.1d 内

B.1～2d

C.2～3d

D.2～5d

E.2～7d

3、单项选择题：关于新生儿感染疾病，哪项是正确的（　　）。

①新生儿早期病原菌以革兰阳性球菌为多

②血清 IgM 测定作为宫内感染的辅助诊断是有用的

③胎膜早破母亲生的新生儿易发生感染疾病

④新生儿败血症时，发热、白细胞增多是必发的症状

A.①、④

B.②、④

C.①、③、④

D.②、③

E.①、②、③

4、单项选择题：一足月新生儿，出生时发生窒息，复苏后仍有呼吸困难、青紫。胸片检查显示两肺气肿，诊断胎粪吸入综合征。经气管插管、机械通气等治疗后，患儿青紫未改善，经皮血氧饱和度 70%～80%，应首先考虑发生下列哪种情况（　　）。A.气胸

B.感染性肺炎

C.肺动脉高压

D.动脉导管开放

E.支气管肺发育不良

5、单项选择题：新生儿溶血病最常见的是（　　）。A.RhD 血型不合

B.RhE 血型不合

C.MN 血型不合

D.Rh 血型不合

E.ABO 血型不合

6、单项选择题：评价新生儿窒息程度的 Apgar 评分指标不包括（　）。A.呼吸

B.体温

C.心率

D.肌张力

E.皮肤颜色

7、单项选择题：对早期快速诊断新生儿败血症最有意义的是（　）。A.血细菌培养

B.血白细胞层直接涂片检菌

C.急相蛋白测定

D.分泌物涂片检菌

E.外周血检查

8、单项选择题：男孩，生后 10 天，足月顺产，母乳喂养。近 2 日来哭声低弱，不吃奶，黄疸加深。体检：体温不升，面色发灰，脐部有脓性分泌物。血清总胆红素 221μmol/L（13mg/dl），直接胆红素 17μmol/L（1mg/dl），子血型”O”，母血型”A”。引起黄疸的原因是（　）。A.母乳性黄疸

B.新生儿肝炎

C.新生儿败血症

D.新生儿 ABO 溶血病

E.新生儿 Rh 溶血病

9、单项选择题：母体的免疫球蛋白能通过胎盘转移给胎儿的是（　）。A.IgA

B.IgM

C.IgG

D.IgD

E.IgE

10、单项选择题：一足月顺产儿，25 天，出生体重 3.2kg，母乳喂养，生后第三天出现黄疸，至今黄疸不退，小儿吃奶好，体温正常。体检：体重 3.85kg，除皮肤黄染外，无其他异常，血、尿常规均正常，血清胆红素 170μmol／L，如何处理（　）。A.光照疗法

B.交换输血

C.口服泼尼松

D.停用苯巴比妥

E.停母乳，向家长解释

11、单项选择题：生后 24h 内出现的黄疸，首先应考虑（　）。A.母乳性黄疸

B.胆道闭索

C.新生儿溶血病

D.新生儿肝炎

E.败血症

12、单项选择题：下列有关新生儿肠肝循环特点的叙述，正确的是（　）。A.新生儿肠道内没有建立正常菌群

B.肠道内的未结合胆红素不能被还原成尿胆原、粪胆原

C.新生儿肠道内-葡萄糖醛酸酶活性高

D.未结合胆红素可经肠黏膜吸收经门静脉到达肝脏

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/927036101016006102