

2023 年湖南省医疗三严三基理论考试试题及答案

医院科室：_____ 姓名：_____ 考场：_____ 考号：_____

一、选择题

1. 脑梗死、短暂性脑缺血发作(TIA)的早期诊断,应首选以下哪种诊断手段()

A、局部脑血流断层核素显像

B、X-CT 脑扫描

C、磁共振脑部检查

D、B 超检查

E、X 线脑血管造影

答案：

A

2. 关于医院感染概念错误的是()

A、医院感染是指在医院内获得的感染

B、入院时处于潜伏期的感染一定不是医院感染

C、出院之后发生的感染可能不是医院感染

D、与上次住院有关的感染是医院感染

E、婴幼儿经胎盘获得的感染是医院感染

答案：

E

3. 以下哪项是左心室扩大的 X 线征象()

A、正位上右心缘双边或双房影

B、正位上左心缘第三弓突出

C、右前斜位食管压迹加深

D、右前斜位胸骨后间隙缩小

E、左前斜位心后下缘膨隆突出

答案：

E

4. 对急性肾盂肾炎的描述下列哪项是正确的

A、是病原微生物侵入肾盂、肾间质所引起的炎症

B、是病原微生物侵入肾盂、肾实质所引起的炎症

C、是病原微生物侵入肾盂、肾间质和肾实质所引起的炎症

D、是自身免疫性疾病

E、主要是病毒或葡萄球菌所引起

答案:

E

5. 正常止血过程取决于

A、血小板的质和量及血管壁的正常

B、皮肤的完整性和凝血因子的正常

C、血小板的质和量、完整的血管壁和凝血因子的正常

D、血小板的质和量、凝血因子的正常

E、凝血因子,骨髓、血小板的质和量的正常

答案:

C

6. 诊断消化性溃疡最可靠的方法是()

A、根据临床症状

B、测胃酸

C、钡餐

D、胃镜

E、大便隐血试验

答案:

D

7. 慢性肾衰竭病人尿量的变化特点是()

A、早期多尿,晚期夜尿

B、早期少尿,晚期多尿

C、早期多尿、夜尿,晚期少尿

D、早期夜尿,晚期多尿

E、早期多尿、血尿,晚期少尿

答案:

C

8. 属脂溶性维生素的是()

A、维生素 B

B、维生素 C

C、维生素 D

D、维生素 B

E、维生素 PP

答案:

C

9. 电泳的基本原理是()

A、溶液中带正电颗粒与带负电颗粒之间的静电引力产生的移动

B、在电场中带电颗粒向着与本身电性相反的电极移动

C、带电颗粒向电极移动的力只与电场强度有关

D、带电颗粒向电极移动的迁移率必须相等

E、带电颗粒向电极移动的迁移率必须相同

答案:

B

10. 病理反射的出现是由于()

A、脊髓反射弧的损害

B、神经系统兴奋性增高

C、脑干网状结构损害

D、锥体束受损

E、基底节受损

答案:

D

11. 阿托品的禁忌症是:()

- A、心动过缓
- B、感染性休克
- C、肾上腺素
- D、前列腺肥大
- E、支气管哮喘

答案:

D

12. 有关脊柱生理弯曲的描述,正确的是()

- A、胸曲前凸,腰曲后凸
- B、颈曲前凸,胸曲后凸
- C、颈曲前凸,胸曲前凸
- D、骶曲前凸,腰曲前凸
- E、颈曲后凸,胸曲前凸

答案:

B

13. 蛔虫病的主要感染途径是

- A、血液接触

- B、经小便污染
- C、经口吞入虫卵
- D、经中间宿主传播
- E、皮肤

答案：

C

14. 雾化吸入疗法选用药物时,下列哪种药物特性不适宜()

- A、无强烈刺激征
- B、水溶性差,相对较稳定的药物
- C、无难闻气味
- D、耐热稳定
- E、机体对该药不过敏

答案：

B

15. 什么病人术前用药应该酌增()

- A、甲亢病人
- B、冠心病病人

- C、休克病人
- D、产科病人
- E、青壮年病人

答案：

E

16. 最易引起枕骨大孔疝的颅内占位性病变是()

- A、蝶鞍区肿瘤
- B、额顶叶肿瘤
- C、颞叶脑脓肿
- D、侧脑室肿瘤
- E、小脑半球肿瘤

答案：

E

17. 治疗尖端扭转型室速时不宜选用下列哪种药物

- A、镁盐
- B、普萘洛尔
- C、普罗帕酮

D、异丙肾上腺素

E、利多卡因

答案：

C

18. 子宫颈原位癌累及腺体是指()

A、子宫腺体发生的原位癌

B、子宫颈表面发生的原位癌

C、子宫颈原位癌突破基膜,浸润至腺体

D、子宫颈原位癌延伸至腺体,基膜未突破

E、早期浸润癌

答案：

D

19. 局部浸润麻醉选用普鲁卡因时,其常用浓度为()

A、0.5%

B、1%

C、1.5%

D、2%

、2.5%

A

20. 下列哪项最能表现溃疡病的特征 ()

A、恶心呕吐

B、腹胀暖气

C、出汗心悸

D、上腹节律性痛

E、明显反酸

答案:

D

21. 目前妇科恶性肿瘤中对妇女威胁最大的是()

A、宫颈癌

B、子宫内膜癌

C、外阴癌

D、输卵管癌

E、卵巢癌

E

22. 影响硬膜外阻滞平面的因素是()

A、导管的位置与方向

B、药物的容量

C、注药的速度

D、病人的情况

E、以上都是

答案:

E

23. 急、慢性肾衰竭病人宜用下列哪种膳食()

A、高蛋白饮食

B、高纤维膳食

C、少渣膳食

D、麦淀粉膳食

E、低铜膳食

答案:

24. 休克期血中儿茶酚胺的含量()

A、高于正常

B、低于正常

C、近于正常

D、可高可低

E、以上均可

A

25. 病床使用率标准值为()

A、70%~80%

B、80%~85%

C、85%~90%

D、90%~95%

E、100%

答案:

C

· Rh 阴性母亲,若其胎儿是 Rh 阳性,可引起胎儿出现()

- A、血友病
- B、白血病
- C、新生儿溶血病
- D、红细胞增多症
- E、巨幼细胞贫血

C

27. 下列哪种不属性传播疾病()

- A、疥疮
- B、阴虱病
- C、外阴湿疹
- D、生殖器疱疹
- E、尖锐湿疣

答案:

C

28. 杀灭物体上病原微生物繁殖体的方法称为()

、无菌操作

B、防腐

C、无菌

D、灭菌

E、消毒

E

29. 早产女婴,4天,因不吃不哭、下肢硬肿2天而于1月24日来院急诊。生后食少,仅喂以糖水及少量母乳。体格检查:体温不升,反应低下,双下肢硬肿,皮肤呈暗红色。有关发病机制,下列哪项不符()

A、新生儿皮下饱和脂肪酸含量较多

B、新生儿体温调节中枢不够完善

C、早产儿棕色脂肪含量多,产热储备能力差

D、摄食不足,机体产热少

E、天气寒冷,致皮下脂肪凝固

答案:

C

· 输血时主要考虑

- A、给血者红细胞不被受血者细胞所凝集
- B、给血者红细胞不被受血者血清所凝集
- C、给血者血浆不使受血者血浆发生凝集
- D、给血者血浆不使受血者红细胞凝集
- E、受血者红细胞不与其血浆发生凝集

B

31. 尿毒症性高钾血症最有效的治疗方法是()

- A、静脉滴注碳酸氢钠
- B、静脉滴注葡萄糖酸钙
- C、静脉滴注高渗葡萄糖和胰岛素
- D、血液透析
- E、口服钠型阳离子交换树脂

答案:

D

32. 高钾血症时心电图的特点是()

A、T波高尖,QRS波群增宽

B、T波低平,QT间期缩短

C、T波低平,QT间期延长

D、T波正常,QT间期延长

E、T波低平,出现U波

答案:

A

33. 上唇疔可并发()

A、面部蜂窝织炎

B、眼睑炎

C、口炎

D、牙龈炎

E、化脓性海绵状静脉窦炎

答案:

E

34. 尖锐湿疣的病因是()

A、HPV感染

B、HSV 感染

C、CMV 感染

D、衣原体感染

E、细菌感染

答案：

A

35. 输入大量库存过久的血液可导致()

A、高钠血症

B、低钠血症

C、高钾血症

D、低钾血症

E、低镁血症

答案：

C

36. 神经细胞静息电位的形成是由于:()

A、K 平衡电位

B、K 外流及 Na 内流

C、K 外流及 Cl 外流

D、Na 内流及 Cl 内流

E、Na 内流及 K 内流

答案：

A

37. 我国急性胰腺炎最常见的病因是()

A、酗酒

B、胆源性

C、遗传性

D、暴饮暴食

E、高脂血症

答案：

B

38. 属非细胞型微生物的是()

A、立克次体

B、衣原体

C、真菌

D、支原体

E、病毒

答案：

E

39. 核医学诊断方法所依据的共同原理是()

A、放射性配体结合分析法原理

B、 γ 闪烁显像原理

C、脏器功能检测原理

D、放射自显影原理

E、放射性核素示踪原理

答案：

E

40. 产生房水的部位是()

A、虹膜

B、脉络膜

C、睫状体

D、晶状体

E、玻璃体

答案:

C

41. 颞区外伤引起急性硬膜外血肿,最常见损伤的血管是()

A、颞浅动脉

B、大脑中动脉

C、脑膜中动脉

D、板障静脉

E、乙状窦

答案:

C

42. 下列有关维生素 K 临床应用的叙述中,哪一条是错误的()

A、任何一种维生素 K 都可用于防止由于维生素 K 缺乏而引起的出血症

B、中国药典只收录了维生素 K[1.gif],但维生素 K[3.gif]和维生素 K 也是临床常用止血药

C、维生素 K 可用于肌肉注射或缓慢静脉滴注

D、本类药物是止血药,凡与此目的不符的应用应认为是不合理用药

E、肌肉注射维生素 K 比口服效果好

答案：

D

43. 抗组胺药的作用是()

A、减少组胺的释放

B、破坏组胺

C、拮抗组胺

D、与组胺竞争某些受体

E、抑制肥大细胞生成

答案：

D

44. 关于肺功能检查应用范围,下列哪项是错误的()

A、确定肺功能障碍的程度

B、判定肺功能障碍的类型

C、可以发现肺部较小的病变

D、可用以判断某些药物的疗效

E、可以区别心源性和肺源性呼吸困难

答案:

C

45. 平衡盐溶液的配方是()

A、1/3 复方氯化钠溶液和 2/3 的 1.9% 乳酸钠溶液

B、1/3 的 1.9% 乳酸钠溶液和 2/3 复方氯化钠溶液

C、1/3 的 5% 碳酸氢钠溶液和 2/3 生理盐水

D、2/3 的 5% 碳酸氢钠溶液和 1/3 生理盐水

E、1/3 的 11.2% 乳酸钠溶液和 2/3 生理盐水

答案:

B

46. 扪查乳房的方法哪项不正确()

A、扪查乳房内半侧时,嘱病人举臂

B、扪查乳房外半侧时,嘱病人垂臂

C、应用手指掌面循序轻轻触按乳房

D、乳房下部肿块,采平卧位举臂触诊

E、抓捏乳房以利鉴别良、恶性肿块

答案:

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/927136113161006043>