

北京住院医师儿内科 I 阶段《儿童保健测试题》模拟考试卷

姓名: _____ 年级: _____ 学号: _____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

- 单项选择题: 下列属于小儿体液分布特点的是 ()
A. 年龄越小体液总量占体重的百分比愈高
B. 间质区的液量占体液比例较小
C. 细胞内液量变化较大
D. 间质区的液量较为固定
E. 血浆区的液体变化较大
- 单项选择题: 佝偻病性手足搐搦症典型症状中喉痉挛主要见于 ()
A. 婴儿
B. 幼儿
C. 学龄前儿童
D. 学龄期儿童
E. 以上都不是
- 单项选择题: 治疗营养不良患儿时, 食物选择的原则是 ()
A. 选择适合患儿消化能力和营养需要的食物
B. 尽可能选用高糖、高热量的食物
C. 食物量应根据食欲来增加, 不必加以限制
D. 营养不良程度越重, 食物添加速度越快
E. 轻-中度营养不良, 不必补充各种维生素
- 单项选择题: 4 个月小儿, 患有维生素 D 缺乏性佝偻病, 在开始维生素 D 治疗时, 突然出现惊厥, 应立即采取的措施是 ()
A. 静脉点滴钙剂
B. 肌注维生素 D
C. 气管切开
D. 给予抗炎、脱水药
E. 立即将舌尖拉出口外, 人工呼吸
- 单项选择题: 小儿机体发育所遵循的规律, 正确的是 ()
A. 是一个连续平均的过程
B. 年龄越大发育越快
C. 婴儿期发育最快
D. 各系统发育快慢一致
E. 体格上的个体差异随年龄增长而逐渐减小
- 单项选择题: 婴儿每日水的需要量是 ()
A. 120ml / kg
B. 130ml/kg
C. 140ml/kg

- D. 150ml/kg
E. 160ml/kg
- 7、单项选择题：患儿囟门未闭，身材矮小，骨骼痿软，行走无力。主要是由于（ ）。A. 元气的功能减弱
B. 宗气的功能减弱
C. 肺气的功能减弱
D. 卫气的功能减弱
E. 营气的功能减弱
- 8、单项选择题：骨龄超前见于（ ）A. 生长激素缺乏症
B. 甲状腺功能减低症
C. 肾小管酸中毒
D. 先天性肾上腺皮质增生症
E. 以上都不是
- 9、单项选择题：符合幼儿期特点的是（ ）A. 体格发育最快
B. 语言思维和应人应物的能力增强
- 112、单项选择题：11个月婴儿提示维生素D缺乏的表现中不包括（ ）A. 方颅
B. 胸廓畸形
C. 手镯、脚镯征
D. 颅骨软化
E. 烦躁、多汗
- 13、单项选择题：佝偻病的最主要病因是（ ）A. 缺铁
B. 缺乏维生素D
C. 甲状旁腺功能不全
D. 缺钙
E. 婴儿生长速度快
- 14、单项选择题：儿童保健，应从何时做起（ ）A. 父母婚前做起
B. 妊娠期做起
C. 围生期做起
D. 新生儿期做起
E. 婴儿期做起
- 15、单项选择题：发热、感染和饥饿时易引发维生素D缺乏性手足搐搦症发生，其原因是（ ）A. 神经肌肉兴奋性增高
B. 组织细胞分解释放磷、使血磷升高，血钙离子下降
C. 血糖下降
D. 脑细胞代谢异常
E. 代谢性酸中毒使血钙离子下降
- 16、单项选择题：3日龄新生儿血电解质的特点下列哪项除外（ ）A. 血钾偏高
B. 血钠偏高
C. 血氯偏高
D. 血磷偏高
E. 血清乳酸值偏高
- 17、单项选择题：新生儿从母体获得的抗体IgG，渐消失的时间是（ ）。A. 1~2个月

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/928004011015006063>