

@精品辅导-只做好题

备考辅导系列

重点难点梯次总结汇编
精华考点合理提炼编排
不同模块全面备考提升
精选真题发现考试规律
章节训练逐一击破短板
全真模拟精确预测趋势
思维拓展强化考前冲刺

注：请仔细预览文本内容，确认后下载学习资料

@高分一次过

（最新）中药师职业资格综合知识与技能考试模拟练习（含解析）

1.下列治法中根据五行相克规律确定的是（ ）。

- A. 配土生金
- B. 金水相生
- C. 滋水涵木
- D. 益火补土
- E. 培土制水

【答案】：E

【解析】：

根据五行相生规律确定的治法主要有滋水涵木法、培土生金法、金水相生法、益火补土法。根据五行相克规律确定的治法主要有抑木扶土法、培土制水法、佐金平木法、泻南补北法。

2.婴幼儿患者合理使用中药的原则为（ ）。

- A. 不宜随便施补

- B. 用量宜轻
- C. 多宜温补
- D. 宜用轻清之品
- E. 尤宜兼顾健脾和胃

【答案】：A|B|D|E

【解析】：

A 项，小儿生机旺盛，宜饮食调理，不宜滥用滋补之品；B 项，小儿脏腑娇嫩，对药敏感，处方要精，用量要轻；C 项，小儿体质属“纯阳”，热病偏多，肝常有余，易出现肝热惊风、抽搐之证；D 项，小儿脏气轻灵，对大苦、大寒、大辛、大热、攻伐和药性猛烈的药物要慎用；E 项，小儿脾气不足，应佐以健脾和胃、消食导滞的中药。

3.与用药剂量无关的药物不良反应是（ ）。

- A. 副作用
- B. 毒性作用
- C. 继发反应
- D. 后遗作用
- E. 过敏反应

【答案】：E

【解析】：

药物不良反应有：①与用药剂量有关的药物不良反应：副作用、毒性作用、继发反应、首剂效应、后遗效应；②与用药剂量无关的药物不良反应：特异质反应、变态反应（又称药物过敏反应）。

4.（共用备选答案）

- A.食少腹胀，便溏浮肿
- B.食少腹胀，内脏下垂
- C.食少腹胀，遇怒加剧
- D.食少倦怠，便血崩漏
- E.食少腹胀，舌苔黄腻

(1)脾不统血，常见的症状是（ ）。

【答案】：D

【解析】：

脾不统血的临床表现为：①面色苍白或萎黄；②饮食减少，倦怠无力，气短；③肌衄，便血以及妇女月经过多，或崩漏；④舌质淡，脉细弱。其辨证要点为在脾气虚的基础上又见出血。

(2)脾胃湿热，常见的症状是（ ）。

【答案】：E

【解析】：

脾胃湿热的临床表现为：①面目皮肤发黄，鲜明如橘色；②脘腹胀满，不思饮食，厌恶油腻，恶心呕吐；③体倦身重，发热，口苦，尿少而黄；④舌苔黄腻，脉濡数。其辨证要点为脾的运化功能障碍和湿热内阻的症状。

(3)脾虚气陷，常见的症状是（ ）。

【答案】：B

【解析】：

脾虚下陷的临床表现为：①子宫脱垂，脱肛，胃下垂；②慢性腹泻，食纳减少，食后作胀，少腹下坠；③体倦少气，气短懒言，面色萎黄；④舌淡苔白，脉虚。其辨证要点为脾气虚和内脏下垂。

(4)脾不健运，常见的症状是（ ）。

【答案】：A

【解析】：

脾不健运的临床表现为：①食纳减少，食后作胀；②肢体浮肿，小便不利；③大便溏泻，时息时发；④身倦无力，气短懒言，面色萎黄；⑤舌质淡嫩，苔白，脉缓弱。其辨证要点为运化功能减退和气虚证共见。

5.导致血清碱性磷酸酶（ALP）升高的疾病是（ ）。

- A. 心肌梗死
- B. 溶血性疾病
- C. 胸腔积液
- D. 骨骼疾病
- E. 前列腺肿瘤

【答案】：D

【解析】：

血清碱性磷酸酶升高多见于肝胆疾病、骨骼疾病以及服用羟甲戊二酰辅酶 A 还原酶抑制剂的不良反应。

6.蒙药传统剂型有（ ）。

- A. 丸剂

- B. 膏
- C. 散
- D. 酒
- E. 油

【答案】：A|B|C|D|E

【解析】：

蒙药传统剂型有汤剂、散剂、丸剂、膏剂、酒剂、灰剂、油剂和搅和剂。

7.属证的是（ ）。

- A. 发热恶寒
- B. 肝胃不合
- C. 胸肋胀满
- D. 纳呆食少
- E. 头身疼痛

【答案】：B

【解析】：

症，是指疾病的外在表现，即症状。病，是机体在一定情况下对于外界有害因素作用的一种反应，具有特定的症状和体征。证，是机体在疾病发展过程中某一阶段的病理概括，包括病变的部位、原因、性质以及邪正关系，能够反映出疾病发展过程中某一阶段的病理变化的本质。ACDE 四项，发热恶寒、胸肋胀满、纳呆食少、头身疼痛属于症的范畴；B 项，肝胃不合属于证的范畴。

8.（共用备选答案）

- A.无汗
- B.盗汗
- C.战汗
- D.绝汗
- E.自汗

(1)伤寒表实证多见（ ）。

【答案】：A

【解析】：

出现伤寒表实证时，由于寒主收引凝滞，使腠理密闭、汗孔闭塞，而致无汗。

(2)气虚卫阳不固多见（ ）。

【答案】：E

【解析】：

出现气虚卫阳不固时，腠理开合失司，故见自汗。

9.老年慢性病患者长期服用中药应注意的事项有（ ）。

- A. 为增强疗效，可加大服用剂量，并坚持长期服用
- B. 从小剂量开始服用
- C. 辨证用药，严格掌握适应病症

- D. 对体质较弱的患者不随意加药
- E. 服用多种药物时，注意药物相互作用，间隔服药

【答案】：B|C|D|E

【解析】：

老年人合理应用中药的原则：①辨证论治，严格掌握适应证；②熟悉药品，恰当选择应用；由于老年人的靶器官或细胞的敏感性增强，使他们对药物的反应比年轻人强烈，特别是对中枢神经抑制药物、降血糖药物、心血管系统药物反应特别敏感，在正常剂量下的不良反应增加，甚至出现药源性疾病，因此在联合用药中应高度重视；③选择合适的用药剂量；老年人肝肾功能多有不同程度的减退或合并多器官严重疾病。因此，用药要因人而异，一般应从“最小剂量”开始。尤其对体质较弱，病情较重的患者切不可随意加药。

10.（共用备选答案）

- A.心
- B.肺
- C.脾
- D.肝
- E.肾

(1)主精神运动的脏是（ ）。

【答案】：A

【解析】：

心为神之居，主神志，主管精神、意识思维活动。

(2)主司调畅情志的脏是（ ）。

【答案】：D

【解析】：

肝主疏泄，能调畅情志。肝的疏泄功能正常，气机调畅，气血和平，则心情舒畅，情志活动才能正常。

11.养血荣筋丸功能（ ）。

- A. 舒筋止痛
- B. 祛风通络
- C. 燥湿止痛
- D. 清热散风
- E. 活血止痛

【答案】：B

【解析】：

养血荣筋丸药物组成为当归、赤芍、威灵仙（酒炙）、油松节、赤小豆、鸡血藤、白术（麸炒）、续断、伸筋草、陈皮、补骨脂（盐炒）、桑寄生、透骨草、党参、何首乌（黑豆酒炙）、木香。方中以补血药、补肾药及强筋骨药为主，共奏养血荣筋、祛风通络的功效，多用于跌打损伤日久引起的筋骨疼痛、肢体麻木等陈旧性疾患的治疗。

12.（共用备选答案）

- A.散寒止带

- B.开郁顺气
- C.理气健脾
- D.补气益血
- E.温阳散寒

(1)七制香附丸既能调经养血，又能（ ）。

【答案】：B

【解析】：

香附丸的药物组成为醋香附、当归、川芎、炒白芍、熟地黄、炒白术、砂仁、陈皮、黄芩。七制香附丸自香附丸中加入艾叶（炭）、山茱萸（酒炙）、酸枣仁（炒）、延胡索（醋制）等中药，能增强疏肝理气、行气开郁的功效。

(2)乌鸡白凤丸既能调经止带，又能（ ）。

【答案】：D

【解析】：

乌鸡白凤丸的药物组成为乌鸡（去毛爪肠）、人参、白芍、丹参、香附（醋炙）、当归、牡蛎（煅）、鹿角、桑螵蛸、甘草、熟地黄、青蒿等。方中以补益气血之品配伍收敛固涩药，共奏补气养血、调经止带之功。

13.根据中医理论，“病”“证”“症”的概念不同，下列表述中属于“病”的是（ ）。

- A. 厌食
- B. 暖气
- C. 腕痞
- D. 腹胀
- E. 便溏

【答案】：A

【解析】：

病，即疾病的简称，指有特定的致病因素、发病规律和病理演变的异常病变过程，具有特定的症状和体征。症，指疾病的外在表现，即症状。所谓“证”，是机体在疾病发展过程中某一阶段的病理概括，能够反映出疾病发展过程中某一阶段的病理变化的本质。

14. 体质偏阴者，受邪发病后，多表现为（ ）。

- A. 寒证、虚证
- B. 热证、虚证
- C. 里证、虚证
- D. 里证、实证
- E. 里证、寒证

【答案】：A

【解析】：

偏阴体质者对寒、湿等阴邪具有易感性，受邪发病后多表现为寒证、虚证；容易发生湿滞、水肿、痰饮、瘀血等病症。

15.具有生风动血致病特点的外感病邪是（ ）。

- A. 风邪
- B. 寒邪
- C. 暑邪
- D. 燥邪
- E. 火邪

【答案】：E

【解析】：

凡致病具有炎热升腾等特性的外邪，称为火邪。火邪具有燔灼、炎上、耗气伤津、生风动血等特性。生风动血是指火邪侵袭人体，燔灼肝经，耗伤阴津，易引起肝风内动和血液妄行。

16.因含有朱砂，如过量服用，可致急性肾功能衰竭的中成药是（ ）。

- A. 牛黄上清丸
- B. 天王补心丸
- C. 牛黄降压丸
- D. 冠心苏合丸

E. 牛黄解毒丸

【答案】：B

【解析】：

含朱砂、轻粉、红粉的中成药：牛黄清心丸、牛黄抱龙丸、抱龙丸、朱砂安神丸、天王补心丸、安神补脑丸、苏合香丸、人参再造丸、安宫牛黄丸、牛黄千金散、牛黄镇惊丸、紫雪、梅花点舌丸、紫金锭（散）、磁朱丸、更衣丸、复方芦荟胶囊。

17.某男，28 岁。突然发热，高热不退，周身酸痛，咽喉疼痛；舌红苔黄，脉浮数。自诉有多位同事出现类似症状。中医诊断是（ ）。

- A. 风寒感冒
- B. 风热感冒
- C. 暑湿感冒
- D. 体虚感冒
- E. 时行感冒

【答案】：E

【解析】：

时行感冒临床表现为突然发热，高热不退，甚则寒战，周身酸痛，无汗，咳嗽，口干，咽喉疼痛，伴明显全身症状，呈现流行性发作。舌红，苔黄，脉浮数。由关键字“突然发热、高热不退”且“有多位同事出现”即呈流行性发作，可辨证为时行感冒。

18.一般中药炮制品的绝对含水量应控制在（ ）。

- A. 5%~10%
- B. 5%~13%
- C. 7%~10%
- D. 7%~13%
- E. 7%~15%

【答案】：D

19.（共用备选答案）

- A.急性肾功能损害、皮疹、头晕、胃肠道反应、过敏样反应
- B.肝肾功能异常、粒细胞、白细胞和血小板减少精子数量减少
- C.肝损害、剥脱性皮炎
- D.胰腺炎、低钾血症、低氯血症、低钠血症

E.过敏性休克、急性喉头水肿、过敏性哮喘、过敏性间质性肾炎

(1)服用克银丸发生严重不良反应时可见（ ）。

【答案】：C

【解析】：

克银丸不良反应表现：肝损害、剥脱性皮炎。

(2)使用清开灵注射液发生严重不良反应时可见（ ）。

【答案】：E

【解析】：

反应包括过敏性休克、急性喉头水肿、过敏性哮喘，过敏性间质性肾炎。

(3)服用珍菊降压片发生严重不良反应时可见（ ）。

【答案】：D

【解析】：

珍菊降压片不良反应表现：①消化系统损害：肝功能异常、黄疸、胰腺炎；②精神神经系统损害：头晕、视物模糊、运动障碍、麻木；③皮肤及附件损害：剥脱性皮炎、全身水疱疹伴瘙痒；④代谢和营养障碍：低钾血症、低氯血症、低钠血症；⑤有肾功能异常、心前区疼痛、心律失常、白细胞减少等个例报告。

20.（共用备选答案）

A.行气利湿

B.分清化浊

C.清热利水

D.利湿行水

E.除湿祛痰

(1)五苓散除温阳化气外，又能（ ）。

【答案】：D

【解析】：

五苓散的功效为温阳化气、利湿行水，用于阳不化气、水湿内停所致水肿的治疗。

(2)排石颗粒除通淋排石外，又能（ ）。

【答案】：C

【解析】：

排石颗粒的功效为通淋排石、清热利水，用于下焦湿热证（肾脏结石、输尿管结石、膀胱结石等）的治疗。

(3)萆薢分清丸除温肾利湿外，又能（ ）。

【答案】：B

【解析】：

萆薢分清丸的功效为温肾利湿、分清化浊，用于肾气不化、清浊不分所致的白浊、小便频数的治疗。

21.梅核气证为痰气凝结于（ ）。

A. 经络

B. 咽喉

C. 筋骨

D. 胸肋

E. 胸膈

【答案】：B

【解析】：

痰与气凝结于咽喉，可出现咽中梗阻、吞之不下、吐之说不出的梅核气证。

22. 中药饮片斗谱的编排是否科学、合理，直接影响配方效率和质量。
处方中常以药对出现可放于同一斗中的饮片有（ ）。

A. 射干、北豆根

B. 盐杜仲、盐续断

C. 姜半夏、淡附片

D. 羌活、独活

E. 知母、浙贝母

【答案】：A|B|D|E

【解析】：

可同放于一个斗中饮片多为“相须”“相使”配伍的饮片，常用“药对”，如麻黄、桂枝；酸枣仁、远志；射干、北豆根；党参、黄芪；桃仁、红花；杜仲、续断；陈皮、青皮；泽泻、猪苓；山药、薏苡仁；板蓝根、大青叶；辛夷、苍耳子；火麻仁、郁李仁；羌活、独活；苍术、白术；麦冬、天冬；川乌、草乌；知母、浙贝母；蒲公英、紫花地丁；篇蓄、瞿麦；三棱、莪术；乳香、没药；小茴香、橘核。

23.系统论述医德规范，著有“大医精诚”专论的方书典籍是（ ）。

- A. 《普济方》
- B. 《千金翼方》
- C. 《备急千金要方》
- D. 《太平圣惠方》
- E. 《太平惠民和剂局方》

【答案】：C

24.气滞胃痛颗粒的功效是（ ）。

- A. 疏肝理气，和胃止痛
- B. 理气解郁，宽中除满

- C. 健脾和胃，行气化湿
- D. 消炎止痛，理气健胃
- E. 柔肝理气，制酸止痛

【答案】：A

【解析】：

气滞胃痛颗粒主治肝郁气滞引起的胸痞胀满、胃脘疼痛。其药物组成为柴胡、延胡索（制）、枳壳、香附（制）、白芍、甘草（制）。方中以疏肝理气药配伍行气药，共奏疏肝理气、和胃止痛之效。

25.（共用备选答案）

- A.通宣理肺丸
- B.二母宁嗽丸
- C.蛇胆川贝液
- D.固本止咳片
- E.小青龙合剂

(1)治疗咳嗽燥邪伤肺证，宜选用的中成药是（ ）。

【答案】：B

【解析】：

二母宁嗽丸药物组成为川贝母、知母、石膏、炒栀子、黄芩等。清肺化痰药配伍清热药，共奏清肺润燥、化痰止咳之功，主治燥热蕴肺所致的咳嗽。

(2)治疗咳嗽风寒犯肺证，宜选用的中成药是（ ）。

【答案】：A

【解析】：

通宣理肺丸药物组成为紫苏叶、前胡、桔梗、苦杏仁、麻黄、甘草等。发散风寒药配伍止咳药，共奏解表散寒、宣肺止嗽之功，主治风寒束

表、肺气不宣所致的感冒咳嗽。

(3)治疗咳嗽痰热壅肺证，宜选用的中成药是（ ）。

【答案】：C

【解析】：

蛇胆川贝液药物组成为蛇胆汁和平贝母。清热解毒药蛇胆配伍清热化痰、润肺止咳之平贝母共奏祛风止咳、除痰散结之功，主治肺热咳嗽、痰多、气喘。D 项，固本止咳片主治脾虚痰盛、肾气不固所致的咳嗽、痰多；E 项，小青龙合剂主治水饮内停之咳喘。

26.处方炒三仙、焦三仙中，“三仙”的组成是（ ）。

- A. 山楂、稻芽、神曲
- B. 槟榔、麦芽、神曲
- C. 麦芽、稻芽、谷芽
- D. 山楂、麦芽、神曲
- E. 仙茅、仙灵脾、仙鹤草

【答案】：D

【解析】：

处方中“三仙”指山楂、麦芽、神曲。

27.（共用题干）

患者，女，29 岁。咳嗽 2 月余，干咳无痰，咽喉干痒，时有声音嘶哑。舌红少苔，脉细数。

(1)根据八纲辨证，该证属于（ ）。

- A. 实证
- B. 虚证
- C. 表证
- D. 阳证
- E. 寒证

【答案】：B

(2)根据脏腑辨证，该证属于（ ）。

- A. 肺气虚
- B. 风寒袭肺
- C. 肺阴虚
- D. 风热犯肺
- E. 肝火犯肺

【答案】：C

(3)根据辨证结果，应采取的治法是（ ）。

- A. 滋阴润肺
- B. 补气益肺
- C. 辛凉清润
- D. 宣肺散寒
- E. 清肝滋肺

【答案】：A

【解析】：

患者辨病为咳嗽，干咳无痰，咽喉干痒，时有声音嘶哑可辨为肺阴亏虚之证，治宜滋阴润肺。

28.某女，25 岁。妊娠 7 周，近日脘腹胀满，噯腐吞酸，不欲饮食；舌苔薄白，脉滑。宜选用的中成药是（ ）。

- A. 清宁丸
- B. 开胸顺气丸
- C. 保和丸
- D. 槟榔四消丸
- E. 山楂化滞丸

【答案】：C

【解析】：

食滞胃脘（饮食伤胃证）的临床表现为：胃脘疼痛，胀满拒按，噯腐恶食，或吐不消化食物，吐后或矢气后痛减，大便不爽。舌淡红，苔

厚腻，脉滑。以胃脘胀闷疼痛、暖腐吞酸为辨证要点。由关键字“脘腹胀满”、“暖腐吞酸”可判断为食滞胃脘，中成药可选用保和丸。

29.（共用备选答案）

- A.肾衰竭
- B.心律不齐
- C.急性胃炎
- D.药源性肠炎
- E.药源性肝病

(1)朱砂与溴化钾片合用，会引起（ ）。

【答案】：D

【解析】：

汞离子与溴离子或碘离子在肠中相遇后，会生成有剧毒的溴化汞或碘化汞，从而导致药源性肠炎或赤痢样大便。

(2)地榆与无味红霉素合用，会引起（ ）。

【答案】：E

【解析】：

地榆含有水合型鞣质，对肝脏有一定毒性。其与有肝毒性的西药无味红霉素等联用，会加重对肝脏的毒性，导致药源性肝病的发生。

30.患者购药，执业药师必须提醒（ ）。

- A. 购药品种多时
- B. 购买贵重药品时
- C. 是否有过用药不良反应史
- D. 是否有特殊用法用量需要注意的
- E. 是否近期说明书有改变

【答案】：A|C|D|E

31.（共用备选答案）

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/928020055114006130>