孕产妇健康知识试题及答案

基本公共卫生服务规范测试题（孕产妇健康管理部分）

本测试题共有 50 道判断题，以下为答案及相关解释。

1.孕产期保健是指各级各类医疗保健机构为准备妊娠至产后 42 天的妇女及胎、婴儿提供全程系列的医疗保健服务。（正确）

2.孕产妇保健的服务对象为辖区内居住的准备妊娠夫妇。（错误）

3.对怀孕的妇女（包括流动人口）要求在孕 12 周前建立孕产期保健册。（正确）

4.在妊娠各期均应当对孕产妇进行危险因素筛查，发现高危孕产妇及时纳入高危孕产妇管理系统。（正确）

5.孕产妇健康管理服务规范是指：妇女从怀孕到产后42天的保健服务。（正确）

6.开展孕产妇健康管理的乡镇卫生院和社区卫生服务中心应当具备服务所需的基本设备和条件。（正确）

7.乡镇卫生院、社区卫生服务中心为正常产妇及异常产妇做产后健康检查。（错误）

8.孕产期保健应当以保障婴儿安全为目的，遵循保健与临床相结合的工作方针。（错误）

9.地市级以上地方人民政府卫生行政部门负责本辖区的孕产期保健工作管理。（错误）

10.县级以上医疗保健机构应当根据本机构的服务能力和范围，开展危重症孕产妇的抢救工作。（正确）

11.开展孕产妇自我监护方法、促进自然分娩、人工喂养以及孕期并发症、合并症防治指导。（错误）

12.从事孕产妇健康管理服务工作的人员可以未取得执业资格，只需接受过孕产妇保健专业技术培训，按照国家孕产妇保健有关规范要求，进行孕产妇全程追踪与管理工作。（错误）

13.卫生部负责全国孕产期保健工作的监督管理。（正确）

14.各级卫生行政部门制订辖区内孕产期保健工作规范实施细则，并负责组织实施。（正确）

15.各级妇幼保健机构自行制订本辖区孕产期保健工作相关规章。（错误）

16.妇幼保健机构受卫生行政部门委托，应当定期组织专家对辖区孕产期保健工作进行质量检查，提出改进建议。（正确）

17.严格执行孕产妇死亡和围产儿死亡评审制度，无需提供死亡孕产妇和围产儿的相关资料。（错误）

18.各级各类医疗保健机构接受卫生行政部门管理、指导和监督。（正确）

19.孕期保健是指从准备妊娠之日开始至临产前，为孕妇及胎儿提供的系列保健服务。（错误）

20.孕早期无需进行盆腔检查。（错误）

21.孕中期或孕晚期初诊者，无需进行检查，只需进行产科检查。（错误）

22.筛查孕期危险因素，发现高危孕妇，并进行专案管理。（正确）

23.孕早期重点筛查胎儿畸形。（错误）

24、对于发现的孕期高危因素，应进行专门管理，包括监测、治疗妊娠合并症和并发症，并在必要时进行转诊。

25、在分娩期，基本的检查项目包括血常规、尿常规和凝血功能。如果在孕期未进行血型、肝肾功能、乙肝表面抗原和梅毒血清学检测，那么可以不进行这些检查。

26、根据浙江省《孕产妇健康管理服务规范》，从孕 16 周开始应描绘妊娠图。

27、孕产期保健应包括孕期、分娩期和产褥期的各个阶段。

28、一般来说，孕前保健应在计划受孕前的三个月进行。

29、根据浙江省《孕产妇健康管理服务规范》，在怀孕妇女在居住地卫生院建册时，享受免费检查的实验室项目包括血常规、血型、血糖、尿常规、肝肾功能、心电图和肝炎标志物。

30、对于每一例高危孕产妇，应进行专门的登记和管理，并进行随访。

31、如果本级无法处理高危孕产妇，应将其转至省级医疗保健机构进行进一步检查和确诊。

32、危重孕产妇可以直接转诊至接诊医疗保健机构，无需事先联系。

33、各级妇幼保健机构应全面掌握辖区内高危孕产妇的诊治和抢救情况，并对高危孕产妇的追踪和转诊工作进行监督管理，并按照要求逐级上报。

34、妇幼保健机构应组织开展孕产妇死亡和围产儿死亡评审工作，卫生行政部门负责具体实施。

35、卫生部负责全国孕产期保健工作的信息管理。

36、各级各类医疗保健机构应指定专人负责机构内的信息收集和审核，按照要求填报相应表卡，按照规定及时、准确报送上级妇幼保健机构。

37、国家基本公共卫生服务中，孕产妇健康管理的服务对象为辖区内的户籍孕产妇。

38、在孕期梅毒的治疗中，应遵循早期确诊、及时治疗、用药足量、疗程规范的原则。

39、孕早检查率=某年辖区内产妇孕早孕产前检查人数/同期辖区内产妇人数×100%。

40、孕产妇系统管理率=某年辖区内产妇系统管理人数/同期辖区内活产数×100%。

41、孕产妇死亡率=某年辖区内孕产妇死亡人数/同期辖区内活产数×1/10 万。

42、产后访视率=某年辖区内产妇产后访视人数/同期辖区内的产妇总数×100%。

43、高危产妇管理率=某年辖区内高危产妇管理人数/同期辖区内高危产妇人数×100%。

44、XXX 应负责高危孕妇的专册登记，并在保健手册上作特殊标记。

1、各级卫生行政部门应建立健全辖区内孕产期保健工作管理体系和高危孕产妇转诊、会诊网络，明确各级职责，实行统一管理。

2、新生儿出生后1小时内，应实行早接触、早吸吮、早开奶。

3、孕前保健是指为准备妊娠的夫妇提供以健康教育与咨询、孕前医学检查、健康状况评估和健康指导为主要内容的系列保健服务。

4、在整个妊娠期间至少提供5次产前检查，发现异常者应当酌情增加检查次数。根据不同妊娠时期确定各期保健重点。

5、孕中期是筛查胎儿畸形的时机。

6、孕中期常规测血压、体重，查宫底高度、腹围、胎心、胎位等，妊娠16-20周知情选择进行唐氏综合症筛查，必要时转诊进行产前诊断。

7、孕中期妊娠24-28周进行妊娠期糖尿病筛查。

8、孕中期妊娠16-24周超声筛查胎儿畸形。

9、产程中应当以产妇及胎儿为中心，提供全程生理及心理支持、陪伴分娩等人性化服务。

10、正常分娩的产妇至少住院观察24小时，以便及时发现产后出血。

11、医疗保健机构应当开设高危门诊，指派具有较丰富临床经验的医生承担会诊、转诊，并作好记录。

12、卫生部负责全国孕产期保健工作管理和质量控制，定期组织专家进行检查、督导和评价。

13、省级卫生行政部门、妇幼保健机构每年至少进行1次孕产期保健工作质量抽查。

14、市（地）、县级卫生行政部门、妇幼保健机构每半年对辖区的孕产期保健工作质量进行1次全面检查。

15、描述错误的是：A.糖尿病孕妇易发生羊水过少、胚胎发育异常。

16、孕中期钙的适宜摄入量每天1000毫克。

17、对本级不能处理的高危孕产妇，应当转至上级医疗保健机构作进一步检查、确诊。

18、孕晚期建议检查项目：妊娠36周后进行胎心电子监护及超声检查等。

19、孕晚期基本检查项目：进行一次肝肾功能复查。

20、孕产期保健是指各级各类医疗保健机构为准备妊娠至产后42天的妇女及胎婴儿提供全程系列的医疗保健服务。

21、孕产妇保健服务对象是辖区内居住的孕产妇。

22、基本公共卫生要求孕12周前由孕妇居住地的乡镇卫生院、社区卫生服务中心建立《孕产妇保健手册》。

23、开展孕早期个人卫生、心理和营养保健指导，特别要强调避免致畸因素和疾病对胚胎的不良影响，同时进行产前筛查和产前诊断的宣传告知。

24、孕晚期督促孕产妇在孕28～36周、37～40周去有助产资质的医疗卫生机构各进行1次随访。

25、孕前保健一般指的是孕前6个月。在这段时间里，医生会提供健康教育和咨询，进行孕前医学检查，评估健康状况，并提供健康指导。

26、对怀孕的妇女（包括流动人口）要求在孕前12周建立孕产期保健册，并按照孕产妇系统管理要求进行保健。

27、孕中期从16-20周开始描绘妊娠图，以了解胎动出现的时间。

28、产妇在分娩室内观察1小时，由专人检测生命体征、宫缩及出血情况。

29、根据检查结果填写第 1 次产前随访服务记录表。对于具有妊娠危险因素和可能有妊娠禁忌症或严重并发症的孕妇，应及时转诊到上级医疗卫生机构，并在 3 周内进行随访转诊结果。

30、乡镇卫生院、村卫生室和社区卫生服务中心（站）在收到 XXX 转来的产妇分娩信息后，应在 2-3 天内到产妇家中进行产后访视。

31、孕产期保健是指各级各类医疗保健机构为准备妊娠至产后 42 天的妇女及胎、婴儿提供全程系列的医疗保健服务，包括孕前、孕期、分娩期及产褥期各阶段的系统保健。

32、孕产期保健应当以保障母婴安全为目的，遵循保健与临床相结合的工作方针。

33、完善妇幼卫生服务网络和孕产妇危重症急救网络，确定承担孕产妇危重症抢救工作的医疗保健机构，确保辖区内至少有一所承担抢救任务的医疗保健机构。

34、乡镇（街道）以下医疗卫生机构还应当承担宣传动员孕产妇接受产前检查和住院分娩，进行产后访视等孕产期保健服务工作。

35、乡镇卫生院、社区卫生服务中心为正常产妇做产后42天健康检查，异常产妇到原分娩医疗卫生机构检查。

36、县级以上地方人民政府卫生行政部门应对开展孕产期保健工作的各级各类医疗保健机构和人员进行监督。

37、产后42天健康检查应包括性保健、避孕、预防生殖道感染、纯母乳喂养（持续时间为D个月）、婴幼营养等方面的指导。

38、加强宣传，公示（A）内容于基层医疗卫生机构，以提高育龄妇女的早孕建册率，使更多的人接受服务。

39、（C）是指辖区内按照规范要求在孕期接受5次及以上产前随访服务的人数与该地该时间内活产数的比例，用来衡量孕妇健康管理的效果。

40、各级（C）受到辖区卫生行政部门的委托，负责孕产期保健技术管理的具体组织和信息处理工作。

41.孕妇最佳的卧位是左侧卧位（C）。

42.正常胎动数为 12 小时内应达到（D）次，即超过 30 次。

43.当胎动数 12 小时内少于（A）次时，说明胎儿宫内缺氧。

44.胎膜早破达到或超过（D）小时后，应给予抗生素预防感染。

45.分娩结束时，子宫底高度在脐下（B）。

46、产后（D）周，子宫回复到未孕时的大小。

47、产后 24 小时内出血量达到或超过（C）ml 者称为产后出血。

48、滞产是指分娩总产程达到或超过（C）小时。

49、从优生角度来讲，女性的最佳生育年龄是（D）岁。

50、合适的生育年龄应为（A）：大于 20 岁，小于 35 岁。

51、吸烟会影响受精卵和胚胎质量，造成胎儿发育不良。因此，计划怀孕的夫妇应在怀孕前 3 个月内停止吸烟（D）。

52、产后 1 周，子宫会缩小至大约（C）妊娠大小，即 12 周左右。

53、孕早期保健不包括（C）骨盆内外测量，其他项目包括全面询问病史、全身体格检查和孕期营养指导。

54、以下哪项不是胎儿宫内窘迫的表现？（C）正确的表现应该是胎心 170 次/分、胎动 5 次/12 小时和胎儿电子监护出现晚期减速。

55、下列选项中，哪一项不是孕产妇高危因素？（D）其他选项包括年龄≥35 岁、有流产史和体重≥65kg。

56、下列选项中，哪一项不属于产伤？（D）其他选项包括产妇的软产道损伤、难产所致的胎儿骨折和难产所致的神经损伤。

57、下列选项中，哪一项不属于五防一加强的内容？（D）其他选项包括防滞产、防感染、防窒息。

58、《孕前保健服务工作规范（试行）》是在（B）2007年颁布实施的。

59、孕前保健服务的目的是在孕前至少（C）个月为准备怀孕的夫妇提供教育、咨询、信息和技术服务。正确答案是6个月。

60、孕前保健的目的是选择适宜的受孕时机，以便为胎儿提供最佳的生长环境和保障其健康发展。（D）

61、关于孕前指导，下列哪项是错误的？（B）正确的是经济困难、居住拥挤属于妊娠心理社会的影响因素。

62、下列哪项与职业有害因素无关？（D）其他选项包括先天缺陷、低出生体重和子代智力发育。

63、怀孕和分娩是人类繁衍的生理过程，应当做到有计划、有准备。准备生育的夫妇，应当到医疗保健机构接受（B）孕前保健服务。

64、关于孕前保健，下列哪项是错误的？（B）正确的是较为理想的妊娠时机应当选择男女双方、尤其是女方的身体、精神心理均为最佳的时期。

65、接触铅、汞、放射性等职业性有害因素的人员，应在停止本职工作至少（B）3个月再怀孕。

B、经胎盘传播

C、经乳汁传播

D、经血液传播

79、孕妇感染巨细胞病毒可导致胎儿出现哪些问题？（A）

A、先天性心脏病、智力低下、听力障碍等

B、肺炎、腹泻、发热等

C、皮疹、发痒、头痛等

D、关节炎、肝炎、肾炎等

80、孕妇患有风疹病毒感染可导致胎儿出现哪些问题？（B）

A、肺炎、腹泻、发热等

B、先天性心脏病、耳聋、智力低下等

C、皮疹、发痒、头痛等

D、关节炎、肝炎、肾炎等

66、孕前应接种乙肝疫苗等，一般在接种后（B）个月再怀孕。

67、停止长效口服避孕药需要（C）个月后再怀孕，以消除药物的影响。

68、从孕前3个月开始，每日应口服叶酸（B）。

69、为预防感染，接产要进行四消毒。以下哪一项不属于四消毒的内容（A）

70、为防止产生伤害，以下哪一项是正确的？（B）

71、如孕早期高度怀疑胎儿有异常，可于（C）周进行羊膜腔穿刺抽取羊水进行细胞学检查。

72、产后访视的内容不包括：（A）

73、产后访视率=辖区内产妇产后访视人数/（D）×100%。

74、早孕建册率=辖区内早孕建册人数/（D）×100%。

75、按照基本公共卫生服务规范，以下哪项孕产妇健康管理服务要求不合理？（D）

76、下列哪种药物不能在妊娠合并淋菌感染时使用？（D）

77、妊娠合并淋菌感染下列哪项是不恰当的？（D）

78、孕妇巨细胞病毒不能通过哪种途径感染胎儿？（B）

79、孕妇感染巨细胞病毒可导致胎儿出现哪些问题？（A）

80、孕妇患有风疹病毒感染可导致胎儿出现哪些问题？（B）

B、巨细胞病毒感染只能通过呼吸道传播

C、巨细胞病毒感染的症状轻微，常被忽略

D、巨细胞病毒感染可能导致胎儿畸形和发育迟缓

79、对于妊娠合并梅毒，以下哪项说法不正确？(C)

A、早期梅毒可通过胎盘传给胎儿。

B、早期梅毒表现为皮肤损害，晚期能侵犯心血管等重要脏器。

C、梅毒病原体不会在胎儿内脏和组织中繁殖。

D、可能与死胎、早产及胎盘病变有关。

80、临床听诊胎心率的变化是诊断胎儿窘迫的最简单实用的方法，正常胎心率为（A）

A、110—160 次/分。

B、120—160 次/分。

C、120—180 次/分。

D、100—160 次/分。

81、胎儿窘迫是指胎儿在宫内发生（B）。

A、缺血。

B、缺氧。

C、营养缺乏。

D、羊水污染。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/928030112116007021