

精神科护士护理专科知识考核

一、单选题

1、关于抗精神病药的使用原则，下列哪项描述是正确的（ ）[单选题]。

- A、初始计量宜大
- B、老年患者用药剂量通常与成年人无明显差异
- C、对于首发的精神分裂症患者，在症状消失后，即可停用药物
- D、对于反复发作的精神分裂症患者，建议出院后维持用药 1~2 年
- E、对于药物依从性差的患者，可考虑注射针或口服液✓

2、下列哪项属于抗精神病药（ ）[单选题]。

- A、地西洋
- B、氟哌啶醇✓
- C、舍曲林
- D、碳酸锂
- E、文拉法辛

3、下列哪项属于抗抑郁（ ）[单选题]。

- A、奥氮平
- B、卡马西平
- C、帕罗西汀✓
- D、美金刚
- E、劳拉西洋

4、躁狂发作急性期治疗的最佳血清锂浓度范围是 () [单选题]。

A、 0.4~0.8mmol/L

B、 0.8~1.2mmol/L ✓

C、 1.2~1.4mmol/L

D、 1.4~1.6mmol/L

E、 1.6~1.8mmol/L

5、不属于锥体外系反应的是 () [单选题]。

A、 体位性低血压 ✓

B、 急性肌张力障碍

C、 迟发性运动障碍

D、 静坐不能

E、 药源性帕金森综合征

6、不属于锂盐早期中毒表现的是 () [单选题]。

A、 高热 ✓

B、 手细颤变为粗颤

C、 困倦或烦躁不安

D、 反复呕吐或腹泻

E、 轻度意识障碍

7、下列哪项因素会降低患者的药物依从性 () [单选题]。

A、 患者对药物治疗持积极的态度

B、 患者能正确应对药物不良反应

C、 患者存在严重的被害妄想症、木僵 ✓

D、患者对坚持服药有充足的信心

E、患者能主动的按时复诊

8、下列哪项不属于精神药物治疗相关的常见护理问题 () [单选题]。

A、不合作

B、便秘

C、焦虑

D、体重增加

E、尿失禁✓

9、关于精神药物的给药护理措施，描述正确的是 () [单选题]。

A、静脉滴注舒必利，速度宜快，每分钟 100 滴

B、发药时，如患者不在，应将药物留在患者床头上

C、肌肉注射氟哌啶醇时，应选择臀大肌✓

D、肌肉注射氯硝西泮后，为加快药物吸收，可揉搓注射部位

E、使用长效缓释片的患者，如果拒绝服药，可将药物研碎后强制患者服药

10、关于抗抑郁药使用的原则描述正确的是 () [单选题]。

A、多数抗抑郁药采用早餐后顿服

B、当抑郁症缓解后，可以停药

C、一般小剂量起始，1~2 周加至最高治疗有效剂量✓

D、维持剂量宜与有效治疗剂量相当

E、反复发作者建议间断大剂量冲击治疗，在症状缓解期可以停止使用抗抑郁药

11、下列哪项属于抗精神病药所致的锥体外系反应 () [单选题]。

A、意识障碍

B、过度镇静

C、体重增加

D、急性肌张力障碍✓

E、体位性低血压

12、阿片类药物平均使用多长时间即可形成依赖 () [单选题]。

A、半个月

B、1个月✓

C、2个月

D、3个月

E、4个月

13、《中华人民共和国精神卫生法》正式实施时间 () [单选题]。

A、2013年4月1日

B、2013年5月1日✓

C、2013年6月1日

D、2013年3月1日

E、2013年7月1日

14、精神科护理中最重要的一环 () [单选题]。

A、环境管理

B、心理护理

C、安全管理✓

D、病人管理

E、精神疾病特性的管理

15、新入院病人应安置于（ ）[单选题]。

- A、隔离病房
- B、一级病房
- C、二级病房✓
- D、三级病房
- E、抢救病房

16、精神科最为常见的危急事件（ ）[单选题]。

- A、出走
- B、暴力✓
- C、自杀自杀
- D、跌倒
- E、噎食

17、精神患者暴力攻击风险按严重程度分为几级（ ）[单选题]。

- A、2级
- B、3级
- C、4级✓
- D、5级
- E、6级

18、患者有主动的言语攻击，被动的躯体攻击，及既往有主动的躯体攻击等，严重程度属于几级（ ）

[单选题]。

- A、I级
- B、II级

C、Ⅲ级✓

D、Ⅳ级

E、Ⅴ级

19、下列哪项因素会降低患者的药物依从性（ ）[单选题]。

A、患者对药物治疗持积极的态度

B、患者能正确应对药物不良反应

C、患者存在严重的被害妄想症、木僵✓

D、患者对坚持服药有充足的信心

E、患者能主动的按时复诊

20、下列哪项不属于精神科常见的危急状态（ ）[单选题]。

A、出走

B、暴力

C、自杀自杀

D、跌倒

E、缄默✓

21、交接班重点做到（ ）[单选题]。

A、书面交接

B、口头交接

C、床边交接

D、以上都是✓

E、以上都不是

22、对于有自杀倾向的抑郁症患者，首要的护理措施是（ ）[单选题]。

- A、饮食护理
- B、睡眠饮食
- C、日常生活护理✓
- D、安全管理
- E、环境管理

23、下列哪项是精神科常见的级危状态 () [单选题]。

- A、暴力、嗜食、自缢、锥体外系不良反应
- B、自缢、暴力、嗜食、流涎
- C、暴力、嗜食、自缢、出走
- D、暴力、嗜食、锥体外系不良反应✓
- E、出走、暴力、流涎、出走

24、出院后精神病人的家庭护理必须做到一个“定期”是 () [单选题]。

- A、定期预检
- B、定期服药
- C、定期做好心理护理
- D、定期复查✓
- E、定期康复

25、目前抗抑郁药物起效时间为服药后几天左右 () [单选题]。

- A、3天
- B、7天
- C、10天
- D、14天✓

E、24 天

26、抑郁症的典型临床表现 () [单选题]。

A、晨重夕轻✓

B、自我评价过低

情绪低落

D、夕重

E、心境

27、躁狂发作病人首选药物 () [单选题]。

A、丙戊酸镁

B、碳酸锂✓

C、丙戊酸钠

D、卡马西平

E、托吡酯

28、一般静脉输液钢针穿刺处的皮肤消毒直径;外周静脉留置针穿刺处皮肤消毒直径;PICC.穿刺处的皮肤消毒直径。() [单选题]。

A、 ≥ 5 cm、 ≥ 10 cm、 ≥ 20 cm

B、 ≥ 5 cm、 ≥ 8 cm、 ≥ 20 cm✓

C、 ≥ 8 cm、 ≥ 10 cm、 ≥ 20 cm

D、 ≥ 5 cm、 ≥ 10 cm、 ≥ 15 cm

E、 ≥ 5 cm、 ≥ 8 cm、 ≥ 20 cm

29、心脏性猝死是指在急性症状开始的多少小时内发生心脏骤停 () [单选题]。

A、6 小时内

B、2小时内

C、3小时内

D、1小时内✓

E、4小时内

30、静脉留置针的进针角度 () [单选题]。

A、5-10°

B、15-45°

C、15-30°✓

D、30-55°

E、15-25°

31、跌倒/坠床风险评估分值多少属于高危人群 () [单选题]。

A、≥35分

B、≥55分

C、≥45分✓

D、≥25分

D、≥65分

32、DVT 常见好发部位 () [单选题]。

A、上肢

B、下肢✓

C、四肢肢端

D、关节部位

E、腕部

33、踝肱指数正常值 : () [单选题]。

- A、 0.5-1.5
- B、 1.0-1.5
- C、 0.5-1.0
- D、 0.9-1.3 ✓
- E、 0.5-1.3

34、糖尿病足患者，进行充分的血糖控制，糖化血红蛋白控制 () [单选题]。

- A、 HbA1c > 7%
- B、 HbA1c < 7% ✓
- C、 HbA1c < 6.5%
- D、 HbA1c < 7.5%
- E、 HbA1c > 7.5%

35、口臭患者应选用的漱口液是 () [单选题]。

- A、 1% ~ 4%碳酸氢钠
- B、 0.1%乙酸
- C、 等渗盐水
- D、 2%呋喃西林
- E、 稀释后双氧水溶液 ✓

二、多选题

1、下列哪些属于精神药物 () [多选题]。

- A、 抗精神药 ✓

B、抗抑郁药✓

C、抗焦虑药✓

D、心境稳定剂✓

E、中枢神经兴奋药✓

2、药物依从性的评估内容包括（ ）[多选题]。

A、患者是否积极配合药物治疗✓

B、患者有无拒绝服药、治疗等现象的发生✓

C、有无影响治疗依从性的精神症状，如被害妄想、木僵等✓

D、患者对药物不良反应有无担心或恐惧✓

E、患者对坚持服药的信心如何✓

3、当患者接受精神药物治疗时，护理评估内容包括（ ）[多选题]。

A、药物依从性✓

B、患者的躯体状况✓

C、患者的精神状况✓

D、药物不良反应✓

E、药物知识与社会支持✓

4、药物不良反应的评估内容包括（ ）[多选题]。

A、既往使用精神药物后出现的不良反应✓

B、患者对不良反应的耐受性、情绪变化✓

C、患者自我处理不良反应的经验✓

D、患者使用精神药物后的疗效

E、哪些不良反应是患者无法接受的✓

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/928031116017006032>