北京住院医师儿外科Ⅰ阶段《小儿骨科试题预测》模拟练习卷

姓名:_____ 年级:_____ 学号:_____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

1、单项选择题：肱骨髁上骨折最严重的并发症为（　）。A.正中神经损伤

B.肘内翻

C.前臂缺血性挛缩

D.骨化性肌炎

E.肘关节僵硬

2、单项选择题：在尺神经损伤的临床表现中，下列哪项是正确的（　）。A.手的第二蚓状肌麻痹

B.拇背伸功能障碍

C.猿手畸形

D.第三、四蚓状肌及骨间掌、背侧肌麻痹

E.桡侧皮肤感觉迟钝

3、单项选择题：幼儿，7岁，骤然起病，恶寒高热3周，左小腿肿痛，膝关节活动受限，左小腿弥漫性红肿、广泛压痛，膝关节积液，浮髌试验阳性，关节穿刺为浆液性渗出，X线片示左胫骨上端骨皮质散在虫蚀样骨破坏，骨膜反应明显，血象：白细胞总数15.6×109/L，分层穿刺见软组织内与骨膜下大量积脓，切开引流后体温下降，急性症状消退，其转归是（　）。A.痊愈

B.形成慢性骨髓炎

C.形成硬化性骨髓炎

D.形成Brodie骨脓肿

E.以上都不是

4、单项选择题：男性患儿，5岁，因右肩部摔伤2小时就诊，哭闹，查体不配合，肩部无畸形，患儿不愿活动上肢，哪项诊断可能性最大（　）。A.肱骨髁上骨折

B.肱骨干骨折

C.臂丛神经损伤

D.桡骨小头半脱位

E.锁骨骨折

5、单项选择题：男性患者，20岁，半年前曾患左股骨急性化脓性骨髓炎，经治疗后好转，但局部有窦道形成，常有少许稀黄色脓汁流出，近4日窦道口闭合，但出现高热，局部压痛明显，并有红肿，X线片示有死骨存留，而且包壳形成充分，应立即（　）。A.瘘道切除，一期缝合

B.骨钻孔手术

C.死骨摘除，植骨术

D.切开引流

E.窦道搔刮术

6、单项选择题：有关腘窝囊肿，下列哪项不正确（　）。A.又名 Baker 囊肿

B.一旦确诊应立即手术治疗

C.可局部穿刺、抽液、注射强的松龙

D.多发生在半膜肌腱滑囊和腓肠肌腱内侧头与半膜肌之间的滑囊

E.常与关节腔相通

7、单项选择题：最容易导致上肢缺血性肌挛缩的骨折是（　）。A.前臂双骨折

B.Colles 骨折

C.桡骨小头骨折

D.尺骨鹰嘴骨折

E.肱骨髁粉碎骨折

8、单项选择题：有关”骨关节炎”的论述，以下哪项是正确的（　）。A.患病率随着年龄而增加，女性比男性多见

B.主要病理改变为软骨退行性变性和消失、骨赘形成

C.临床表现和 X 线变化往往不尽一致

D.血清类风湿因子阴性、血沉不增快、C 反应蛋白不升高，X 线片检查有助于诊断

E.以上都正确

9、单项选择题：肱骨髁上骨折伸直型骨折的最严重并发症是（　）。A.正中神经损伤

B.畸形愈合形成肘内翻 l　　C.肘后三角改变

D.压痛

E.淤斑

12、单项选择题：胸部脊髓横断伤患者刺激足部皮肤时，出现脊髓自主反射，表现为（　）。A.伸髋、屈膝、背屈踝关节

B.伸髋、伸膝、背屈踝关节

C.屈髋、屈膝、背屈踝关节

D.屈髋、伸膝、跖屈踝关节

E.屈髋、屈膝、跖屈踝关节

13、单项选择题：原发性恶性骨肿瘤的一般 X 线表现是（　）。A.骨质缺损，边缘清楚，骨膜反应明显

B.骨质破坏，边界不清，骨膜反应不明显

C.骨质密度增高，境界不清，骨膜反应明显

D.骨质破坏，边缘不清，骨膜反应明显

E.骨质缺损，边缘清楚，骨膜无反应

14、单项选择题：运动员百米赛跑途中突然闻及左膝撕裂声，然后倒地。查体左膝不能主动伸屈，X 线片示髌骨中段骨折，考虑造成骨折的原因是（　）。A.直接暴力

B.间接暴力

C.病理性骨折

D.肌肉拉力

E.积累性劳损

15、单项选择题：骨关节炎疼痛最主要的特点是（　）。A.运动痛

B.静止痛

C.不定时痛

D.阴雨天痛

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/928051032015006063