

2024 湖南省新晃侗族自治县《执业药师之西药学专业二》资格考试必背 200 题题库及参考答案（考试直接用）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 不会引起直立性低血压的药物是

- A: 利血平
- B: 硝普钠
- C: 阿替洛尔
- D: 氨氯地平

答案：D

2. 可直接中和胃酸，发挥快速、持久的抗酸作用，且有平衡肠动力作用，不易导致便秘和腹泻不良反应的是

- A: 三硅酸镁
- B: 氢氧化铝
- C: 碳酸钙
- D: 铝碳酸镁

答案：D

3. 维生素 A 缺乏时引起

- A: 坏血病
- B: 角膜软化症
- C: 脚气病
- D: 成人佝偻病

答案：B

4. 下列哪种属于长效青霉素

- A: 阿莫西林
- B: 苄星青霉素
- C: 青霉素 V
- D: 苯唑西林

答案：B

5. (2016 年真题) 属于促胰岛素分泌剂的是

- A: 二甲双胍
- B: 阿卡波糖
- C: 艾塞那肽
- D: 那格列奈

答案：D

6. 阿托品引起便秘的原因是()

- A: 抑制排便反射
- B: 松弛肠道平滑肌
- C: 抑制胃肠道腺体分泌
- D: 使括约肌兴奋

答案：B

7. 属于膨胀性泻药的是()

- A: 蓖麻油
- B: 聚乙二醇 4000
- C: 乳果糖
- D: 硫酸镁

答案：B

8. 可单独用于轻度、早期高血压的是

- A: 乙酰唑胺
- B: 呋塞米
- C: 氢氯噻嗪
- D: 阿米洛利

答案：C

9. (2015 年真题) 长期使用可使血钾水平升高的药品是 ()。

- A: 呋塞米
- B: 呋达帕胺
- C: 氨苯蝶啶
- D: 乙酰唑胺

答案：C

10. 以肝细胞膜损害为主的急慢性肝炎患者, 宜使用的药物是

- A: 多烯磷脂酸胆碱
- B: 还原型谷胱甘肽
- C: 甘草酸二铵
- D: 葡醛内酯

答案：A

11. 有或曾有充血性心力衰竭病史的心室功能障碍患者禁用 ()

- A: 氟康唑
- B: 伏立康唑
- C: 伊曲康唑
- D: 氟胞嘧啶

答案：C

12. (2021 年真题) 关于美罗培南使用注意事项的说法，错误的是 ()

- A: 与中枢神经系统 γ -氨基丁酸受体的亲和力较亚胺培南弱，故癫痫等中枢神经系统不良反应的发生率显著低于亚胺培南
- B: 肝功能不全者需调整剂量
- C: 可用于治疗妊娠期呼吸系统感染
- D: 有其他 β -内酰胺类药物过敏性休克史的患者禁用

答案：B

13. 能使凝血因子 I 降解为纤维蛋白单体的药物是 ()

- A: 蛇毒血凝酶
- B: 甲萘氢醌
- C: 鱼精蛋白
- D: 卡巴克络

答案：A

14. 急性化脓性中耳炎局部治疗，鼓膜穿孔后可使用

- A: 2%过氧化氢溶液
- B: 2%酚甘油滴耳液
- C: 3%酚甘油滴耳液
- D: 3%过氧化氢溶液

答案：D

15. 奎尼丁对心肌细胞膜的作用主要是 ()

- A: 促进 K
- B: 抑制 Na
- C: 抑制 Ca
- D: 促进 Ca

答案：B

16. 下列选项中，属于四环素禁用的人群有()

- A: 精神病患者
- B: 月经期妇女
- C: 妊娠期妇女
- D: 中、老年人

答案：C

17. 属于第四代头孢菌素的药物是

- A: 头孢哌酮
- B: 头孢氨苄
- C: 头孢吡肟
- D: 头孢拉定

答案：C

18. 临床常用于治疗结核病的药物是

- A: 甲硝唑
- B: 两性霉素 B
- C: 阿奇霉素
- D: 链霉素

答案：D

19. 关于钙制剂临床应用中的注意事项描述，错误的是()

- A: 钙在体内的吸收随着钙的摄入量增加而增加
- B: 钙制剂与肾上腺皮质激素、异烟肼、四环素或含铝抗酸药不宜同时服用
- C: 补钙应选用含钙量高、生物利用度好、溶出度高的制剂

D: 同时补充维生素 D

答案：A

20. 与神经-肌肉阻滞剂合用，可加重神经-肌肉阻滞作用的是

A: 阿米卡星

B: 阿莫西林

C: 头孢氨苄

D: 克拉霉素

答案：A

21. 用药后可使尿液呈橘红色的药物是

A: 链霉素

B: 乙胺丁醇

C: 异烟肼

D: 利福平

答案：D

22. 作用于前列腺平滑肌，减轻膀胱出口梗阻的是()

A: 坦洛新

B: 西地那非

C: 普适泰

D: 吲达帕胺

答案：A

23. 以下不属于胰岛素不良反应的是

A: 皮下硬结

B: 脂肪萎缩与肥厚

C: 低血糖

D: 高钾血症

答案：D

24. 在动物骨髓造血组织中含量较多，有促进白细胞增生及抗放射线作用的是

A: 鲨肝醇

B: 小檗胺

C: 维生素 B₄

D: 丙酸诺龙

答案：A

25. 变异型心绞痛不宜选用的药物是()

A: 硝苯地平

B: 普萘洛尔

C: 胍乙啶

D: 硝酸甘油

答案：B

26. 患者，男性，26 岁，因“咳嗽、咳痰伴间断发热 1 周”入院，查体：T38.9℃，P90 次/分，R21 次/分，BP110/70mmHg，血常规：白细胞 $16.9 \times 10^9 / L$ ，中性粒细胞百分比 84.6%；胸部 CT 示右下肺炎症。诊断为“右侧肺炎”，入院后使用莫西沙星和氨溴索治疗。

A: 属于氟喹诺酮类

B: 对厌氧菌有效

C: 对链球菌感染疗效较好

D: 对非典型病原体无效

答案：D

27. (2018 年真题) 围手术期为预防革兰阴性杆菌感染, 可选用 ()

- A: 万古霉素
- B: 头孢唑林
- C: 氨曲南
- D: 青霉素 G

答案: C

28. 烟酸缺乏时发生

- A: 糙皮病
- B: 脚气病
- C: 夜盲症
- D: 成人佝偻病

答案: A

29. 属于抑制疟原虫的二氢叶酸还原酶, 阻碍核酸合成的抗疟药物是

- A: 乙胺嘧啶
- B: 吡喹酮
- C: 青蒿素
- D: 奎宁

答案: A

30. 关于利伐沙班注意事项的描述, 不正确的是 ()

- A: 用药期间需定期测定血红蛋白
- B: 用药过量可导致出血并发症
- C: 对于不同的手术选择的疗程不同
- D: 如伤口已止血, 首次用药应于术后立即给药

答案: D

31. (2015 年真题) 使用强心苷的心力衰竭患者，不宜选用的药品是 ()。

- A: 氯化钙
- B: 硫酸镁
- C: 氯化钾
- D: 果糖

答案：A

32. (2021 年真题) 可致超敏反应综合征 (AHS)，推荐用药前做 HLA-B*5801 基因筛查的抗痛风药物是 ()

- A: 非布司他
- B: 秋水仙碱
- C: 苯溴马隆
- D: 别嘌醇

答案：D

33. 柳氮磺吡啶的活性形式是

- A: 亚磺酰胺
- B: 巴柳氮
- C: 奥沙拉嗪
- D: 美沙拉嗪

答案：D

34. 雌激素替代疗法应在绝经后几年之内开始

- A: 8
- B: 6
- C: 2
- D: 4

答案：B

35. 在物理降温配合下，可使体温降至正常以下，用于人工冬眠疗法的药物是

- A: 地西泮
- B: 硫喷妥钠
- C: 氯丙嗪
- D: 阿司匹林

答案：C

36. 容积性泻药()

- A: 乳果糖
- B: 地芬诺酯
- C: 甘油
- D: 硫酸镁

答案：D

37. 硝酸甘油抗心绞痛的机制主要是

- A: 扩张静脉，降低前负荷；扩张动脉，降低心肌耗氧
- B: 阻断 β 受体，降低心肌耗氧量
- C: 选择性扩张冠脉，增加心肌供血
- D: 减慢心率，降低心肌耗氧量

答案：A

38. 单纯疱疹病毒感染的首选药是

- A: 碘苷
- B: 干扰素
- C: 阿昔洛韦

D: 金刚烷胺

答案: C

39. 与西地那非合用，可导致严重低血压的药品是()。

A: 非那雄胺

B: 甲睾酮

C: 硝酸甘油

D: 丙酸睾酮

答案: C

40. 须用专属性极强的解毒剂右雷佐生保护心肌的药物是

A: 环磷酰胺

B: 吉非替尼

C: 曲妥珠单抗

D: 多柔比星

答案: D

41. 钙通道阻滞剂的药理作用不包括

A: 抑制血小板活化

B: 松弛支气管平滑肌

C: 主要舒张静脉，对动脉影响较小

D: 抗动脉粥样硬化作用

答案: C

42. 可与吸入性糖皮质激素合用的长效 M 胆碱受体阻断剂是

A: 沙美特罗

B: 多索茶碱

C: 噻托溴铵

D: 孟鲁司特

答案：C

43. (2015 年真题) 治疗青光眼宜选用 ()。

A: 碘苷滴眼液

B: 毛果芸香碱滴眼液

C: 左氧氟沙星滴眼液

D: 复方托吡卡胺滴眼液

答案：B

44. 属于多巴胺受体阻断剂的止吐药是

A: 阿瑞吡坦

B: 托烷司琼

C: 维生素 B6

D: 甲氧氯普胺

答案：D

45. (2015 年真题) 辅助治疗不孕症的维生素是 ()。

A: 维生素 E

B: 维生素 B5

C: 烟酸

D: 维生素 B2

答案：A

46. 可预防环磷酰胺所致泌尿系毒性的药物是

A: 维生素

B: 美司钠

C: 呋塞米

D: 糖皮质激素

答案：B

47. 同时抑制 5-HT 及去甲肾上腺素（NE）再摄取而起到抗抑郁作用的药物是（）

A: 度洛西汀

B: 帕罗西汀

C: 吗氯贝胺

D: 马普替林

答案：A

48. （2017 年真题）长期大剂量服用维生素 D 可能引起的不良反应是（）

A: 高胆红素血症

B: 高钙血症

C: 颅内压升高

D: 血栓性静脉炎

答案：B

49. 抗血小板药西洛他唑属于

A: 二磷酸腺苷 P2Y₁₂ 受体阻断剂

B: 整合素受体阻断剂

C: 磷酸二酯酶抑制剂

D: 维生素 K 拮抗剂

答案：C

50. （2018 年真题）高致吐性化疗药物所引起的恶心、呕吐，宜选用的止吐治疗方案是（）

- A: 化疗前后联合使用地塞米松和甲氧氯普胺
- B: 化疗前联合使用昂丹司琼和地塞米松,化疗结束后给予 2 天的地塞米松或昂丹司琼
- C: 化疗前使用昂丹司琼,化疗后不需要继续使用止吐药
- D: 化疗前联合使用昂丹司琼、地塞米松和阿瑞吡坦,化疗结束后给予 2 天的阿瑞吡坦和 2~3 天的地塞米松

答案: D

51. 给药后易产生抗体, 5 天至 1 年内重复给药疗效可能下降, 1 年内不宜再次使用的溶栓药是

- A: 瑞替普酶
- B: 链激酶
- C: 阿替普酶
- D: 尿激酶

答案: B

52. 关于甲硝唑作用特点和用药注意事项的说法错误的是()

- A: 甲硝唑属于时间依赖型抗菌药物
- B: 甲硝唑代谢产物可能使尿液颜色加深
- C: 甲硝唑半衰期比奥硝唑短
- D: 甲硝唑有致突变和致畸作用

答案: A

53. 青霉素常见的不良反应

- A: 细胞缺氧、酸中毒、休克
- B: 恶心、腹痛、腹泻、食欲减退
- C: 过敏反应
- D: 锥体外系反应

答案：C

54. 关于哌替啶下列说法错误的是

- A: 本品与芬太尼可交叉过敏
- B: 未明确诊断的疼痛，可以使用本品
- C: 产妇分娩镇痛时及哺乳期间用量酌减
- D: 本品务必在单胺氧化酶抑制剂停用 14 日以上方可给药

答案：B

55. 患者，女，66 岁，5 天前无明显诱因出现发热，最高 39℃，伴寒战；无咳嗽、咳痰。于门诊阿莫西林抗感染治疗 4 日无改善，遂转入院治疗。入院查体：T38.8℃，R21 次，BP110 / 70mmHg，HR110 次 / 分。神清、精神差、颈软，咽不红、双扁桃体不大；双肺呼吸音清，无明显干湿啰音。查血常规白细胞 $13.4 \times 10^9 / L$ ，中性粒细胞 82.1%，胸片、肝肾功能未见明显异常。入院后给予亚胺培南西司他丁 0.59，每 6 小时一次。

- A: 氟康唑可延长口服降糖药的半衰期导致低血糖
- B: 氟康唑可使华法林代谢加快
- C: 氟康唑可减慢硝苯地平代谢引起下肢水肿
- D: 氟康唑抑制卡马西平代谢

答案：B

56. 可引起肌痛、骨关节病损、跟腱炎症和跟腱断裂的药物是()

- A: 咪康唑
- B: 灰黄霉素
- C: 克霉唑
- D: 环丙沙星

答案：D

57. 吗啉类抗真菌药()

- A: 两性霉素
- B: 阿莫罗芬
- C: 特比萘芬
- D: 氟康唑

答案: B

58. 以下 PPI 中，主要代谢酶是 CYP3A4 的是

- A: 奥美拉唑
- B: 兰索拉唑
- C: 雷贝拉唑
- D: 泮托拉唑

答案: B

59. 与噻嗪类利尿剂合用易发生高钙血症的药物是

- A: 奥关拉唑
- B: 莫沙必利
- C: 碳酸钙
- D: 枸橼酸铋钾

答案: C

60. ()用于耐青霉素的金黄色葡萄球菌引起的轻、中度感染或青霉素过敏者

- A: 万古霉素
- B: 克林霉素
- C: 红霉素
- D: 克拉霉素

答案：C

61. 属于破坏 DNA 的铂类化合物的抗肿瘤药物是

- A: 依托泊苷
- B: 顺铂
- C: 来曲唑
- D: 紫杉醇

答案：B

62. 患者，男，30 岁。近期出现乏力、心动过速，考虑为“甲亢”，遵医嘱服用药物后出现头痛、眩晕、关节痛、剥落性皮炎的是

- A: 甲巯咪唑
- B: 地塞米松
- C: 丙硫氧嘧啶
- D: 左甲状腺素

答案：C

63. 急性缺血性脑卒中发作，应用溶栓药治疗时间窗是在发病后

- A: 3 小时内
- B: 24 小时内
- C: 8 小时内
- D: 12 小时内

答案：A

64. 格列本脲的降糖作用机制是

- A: 二甲双胍
- B: 刺激胰岛 β 细胞释放胰岛素
- C: 静脉用胰岛素

D: 胰岛素皮下注射

答案：B

65. 使用羟甲唑啉滴鼻液期间，可能发生的不良反应是

A: 流泪

B: 鼻黏膜充血

C: 一过性针刺感

D: 心率加快

答案：D

66. （2019 年真题）既可用于男性性功能减退，又可用于女性绝经后晚期乳腺癌治疗的药物是（）

A: 西地那非

B: 特拉唑嗪

C: 十一酸睾酮

D: 坦洛新

答案：C

67. 下述药物中，不属于促动力药的是

A: 甲氧氯普胺

B: 氢氧化铝

C: 多潘立酮

D: 莫沙必利

答案：B

68. 替罗非班的作用机制是

A: 拮抗维生素 K

B: 抑制凝血因子 X

C: 阻断血小板糖蛋白 IIb/IIIa 受体

D: 抑制凝血酶

答案：C

69. 丙烯胺类抗真菌的代表药为()

A: 伏立康唑

B: 卡泊芬净

C: 特比萘芬

D: 伊曲康唑

答案：C

70. 用于低分子肝素过量时解救的药品是

A: 氨甲环酸

B: 酚磺乙胺

C: 维生素 K1

D: 鱼精蛋白

答案：D

71. 大剂量应用甲氨蝶呤后，可用()进行解救

A: 苯溴马隆

B: 亚叶酸钙

C: 丙磺舒

D: 别嘌醇

答案：B

72. (2020 年真题) 患者，女，68 岁。近期有急性心肌梗死病史。目前正在服用阿司匹林、氯吡格雷、普伐他汀和美托洛尔。近日因偶尔出现胃灼热不适感而就医，该患者应避免使用的药物是

- A: 奥美拉唑
- B: 雷尼替丁
- C: 雷贝拉唑
- D: 法莫替丁

答案：A

73. 精神紧张、情绪恐惧所致的失眠宜选用

- A: 谷维素
- B: 氯美扎酮
- C: 氟西泮
- D: 夸西泮

答案：B

74. 患者，女，66 岁，5 天前无明显诱因出现发热，最高 39℃，伴寒战；无咳嗽、咳痰。于门诊阿莫西林抗感染治疗 4 日无改善，遂转入院治疗。入院查体：T38.8℃，R21 次，BP110 / 70mmHg，HR110 次 / 分。神清、精神差、颈软，咽不红、双扁桃体不大；双肺呼吸音清，无明显干湿啰音。查血常规白细胞 $13.4 \times 10^9 / L$ ，中性粒细胞 82.1%，胸片、肝肾功能未见明显异常。入院后给予亚胺培南西司他丁 0.59，每 6 小时一次。

- A: 有可能引起维生素 D 缺乏症状
- B: 如需连续给药 1 周以上，应进行肝功能检查
- C: 需关注中枢神经系统不良反应
- D: 询问过敏史，使用期间密切关注过敏反应

答案：A

75. 下列属于 β 受体阻断剂的是

- A: 螺内酯

- B: 美托洛尔
- C: 阿利吉仑
- D: 卡托普利

答案：B

76. (2015 年真题) 可致前庭、耳蜗神经功能障碍，妊娠期妇女和新生儿禁止使用的抗菌药物是 ()。

- A: 酰胺醇类 (氯霉素)
- B: 林可霉素类
- C: 氨基糖苷类
- D: 四环素类

答案：C

77. 抗肿瘤抗生素

- A: 顺铂
- B: 喜树碱类
- C: 丝裂霉素
- D: 环磷酰胺

答案：C

78. 关于铂类药物的描述，下列说法错误的是 ()

- A: 细胞增殖周期非特异性抑制剂
- B: 作用机制是破坏 DNA 的结构和功能
- C: 顺铂是结直肠癌的首选药之一
- D: 广谱抗瘤药物

答案：C

79. 儿童使用阿托品最低致死量为

A: 10mg

B: 80mg~130mg

C: 50mg

D: 5mg

答案：A

80. 用于较严重的频繁干咳，极量一次 100mg 的药物是

A: 苯丙哌林

B: 右美沙芬

C: 可待因

D: 地塞米松

答案：C

81. 患者，男，41 岁。有吸烟史，间断少量饮酒。因“嗝气、反酸、上腹部疼痛”就诊。经查，医师诊断为“反流性食管炎”此时应给予治疗的药物是

A: 泮托拉唑

B: 东莨菪碱

C: 昂丹司琼

D: 雷尼替丁

答案：D

82. （2021 年真题）患者，女，27 岁，孕 34 周。诊断为轻度便秘，宜选用的药物是（）

A: 乳果糖

B: 蓖麻油

C: 普芦卡必利

D: 硫酸镁

答案：A

83. 关于噻嗪类利尿药的描述，错误的是

- A: 肾功能不良者禁用
- B: 痛风患者慎用
- C: 可引起低钙血症
- D: 糖尿病患者慎用

答案：C

84. 属于植物制剂，用于治疗前列腺增生的药物是()

- A: 非那雄胺
- B: 普适泰
- C: 特拉唑嗪
- D: 十一酸睾酮

答案：B

85. 下列关于袪利尿药使用的描述中，不正确的是()

- A: 单独使用可能会使利尿作用降低
- B: 可联用作用部位不同的利尿药
- C: 出现利尿药抵抗时，可使用低效利尿药增大剂量
- D: 可多次应用最小有效剂量

答案：C

86. 属于促凝血因子合成药的是

- A: 甲萘氢醌
- B: 鱼精蛋白
- C: 氨甲环酸

专业《执业药师之西药学专业二》资格考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

D: 酚磺乙胺

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/928066001042007022>