专业《执业药师之西药学专业二》考试必刷200题题库，word格式可自由下载编辑，附完整答案！

2024年广西壮族自治区隆安县《执业药师之西药学专业二》考试必刷200题真题【夺分金卷】

第Ⅰ部分 单选题（100题）

1.阿司匹林与华法林合用

A：诱发胃肠道溃疡出血

B：心源性水肿

C：头晕、头痛、血压下降

D：抗凝血作用增强

答案：D

2.对非磺酰脲类胰岛素促泌剂的描述正确的是()

A：此类药物需在餐前即刻服用

B：格列美脲属于本类药物

C：此类药物可降低2型糖尿病患者的餐前血糖

D：此类药物不能单独服用

答案：A

3.主要用于控制疟疾症状的药物是

A：吡喹酮

B：乙胺嘧啶

C：甲硝唑

D：氯喹

答案：D

4.与吲达帕胺合用，可导致心律失常的是

A：多巴胺

B：胺碘酮

C：拟交感药

D：考来烯胺

答案：B

5.不属于血管紧张素转化酶抑制剂（ACEI）类药物作用特点的是

A：ACEI可引起反射性心率加快

B：ACEI类禁用于双侧肾动脉狭窄者

C：ACEI可改善左心室功能

D：ACEI对肾脏有保护作用

答案：A

6.以下适应证与其他四个药物不同的是

A：制霉菌素

B：特比萘芬

C：克霉唑

D：联苯苄唑

答案：A

7.下述药物中用于缓解鼻黏膜充血肿胀引起的鼻塞的是

A：链霉素溶剂

B：盐酸麻黄碱滴鼻液

C：硼酸

D：利巴韦林滴鼻液

答案：B

8.长期大量应用可致视神经炎、视力下降、视野缩小，出现盲点的是

A：异烟肼

B：链霉素

C：乙胺丁醇

D：利福平

答案：C

9.磷酸二酯酶抑制剂的机制

A：抑制葡萄糖脱氢酶

B：抑制纤维蛋白原与血小板膜表面糖蛋白受体的结合

C：抑制血小板表面的ADP受体

D：使血小板内cAMP浓度增高而产生抗血小板作用

答案：D

10.用于预防及治疗深静脉血栓及肺栓塞，严重出血时可静脉注射维生素K1的是

A：维生素K1

B：肝素

C：香豆素类

D：维生素B12

答案：C

11.刺激胰岛细胞分泌胰岛素的是()

A：A和B均无效

B：二甲双胍

C：胰岛素

D：磺酰脲类

答案：D

12.特比萘芬属于

A：吗啉类

B：丙烯胺类

C：唑类

D：抗生素类

答案：B

13.（2015年真题）属于多巴胺D2受体阻断剂的是（）。

A：多潘立酮

B：法莫替丁

C：氯苯那敏

D：奥美拉唑

答案：A

14.容易引起周围神经炎的抗结核药物是

A：乙胺丁醇

B：利福平

C：异烟肼

D：链霉素

答案：C

15.需停5周才能换用单胺氧化酶抑制剂的药物是

A：文拉法辛

B：氟西汀

C：吗氯贝胺

D：吡拉西坦

答案：B

16.黄体酮属于

A：雌激素

B：雄性激素

C：皮质激素

D：孕激素

答案：D

17.轻症糖尿病患者宜选用

A：格列喹酮

B：珠蛋白锌胰岛素

C：二甲双胍

D：正规胰岛素

答案：C

18.()用于耐青霉素的金黄色葡萄球菌引起的轻、中度感染或青霉素过敏者

A：克林霉素

B：红霉素

C：克拉霉素

D：万古霉素

答案：B

19.头孢类药物作用机制

A：抑制细菌细胞壁合成

B：抑制细菌糖代谢

C：抑制细菌蛋白质合成

D：干扰细菌核酸代谢

答案：A

20.关于右美沙芬药理作用及临床评价的说法,正确的是

A: 通过阻断肺一胸膜的牵张感受器产生的质迷走神经反射而起到镇咳作用

B: 口服吸收缓慢,主要经肝脏代谢作用时间长

C: 镇咳作用弱于可待因

D: 主要用于干咳但左旋右美沙芬有镇痛作用

答案：D

21.抑制碳酸酐酶的药物是

A: 乙酰唑胺

B: 氢氯噻嗪

C: 呋塞米

D: 氨苯蝶啶

答案：A

22.（2018年真题）具有长效、平稳、血药浓度无峰值特点的胰岛素/胰岛素类似物是（）

A: 普通胰岛素注射液

B: 甘精胰岛素注射液

C: 精蛋白锌胰岛素注射液

D: 预混胰岛素注射液

答案：B

23.阻碍DNA合成的药物是

A: 氟尿嘧啶

B: 顺铂

C：高三尖杉酯碱

D：紫杉醇

答案：A

24.头孢曲松

A：与庆大霉素合用于铜绿假单胞菌感染

B：肾毒性较大

C：脑脊液中浓度较高，酶稳定性高，适用于严重脑膜感染

D：口服，肌内注射或静脉注射均可用于全身感染

答案：C

25.（2017年真题）可能引起持续性干咳的抗高血压药是（）

A：卡托普利

B：阿利克仑(阿利吉仑)

C：硝普钠

D：氨氯地平

答案：A

26.需与氨基糖苷类联合应用治疗布鲁菌病和鼠疫的是

A：氯霉素

B：青霉素

C：红霉素

D：四环素

答案：D

27.现有调脂药中降低LDL作用最强的一类药是

A：抗氧化剂

B：胆汁酸结合树脂

C：胆固醇吸收抑制剂

D：他汀类药物

答案：D

28.以下药物中，不属于散瞳类药物的是

A：复方托吡卡胺

B：卡波姆

C：去氧肾上腺素

D：阿托品

答案：B

29.以下关于非磺酰脲类促胰岛素分泌药使用的叙述，错误的是

A：瑞格列奈无肾脏功能不全者使用的禁忌，在体内无蓄积，适用于老年和糖尿病肾病者

B：对磺酰脲类敏感性差或效果不佳者可换此类药物，也可与磺酰脲类联合应用

C：可以作为初始治疗，用于不能耐受二甲双胍或磺酰脲类药物或存在使用这些药物的禁忌证患者，尤其是有低血糖风险的慢性肾脏病患者

D：常见不良反应是低血糖和体重增加

答案：B

30.在体外无抗凝作用，在体内有抗凝作用的是

A：肝素

B：噻氯匹定

C：华法林

D：尿激酶

答案：C

31.糖皮质激素的禁忌证不包括()

A：妊娠初期和产褥期

B：角膜炎、虹膜炎

C：严重的高血压、糖尿病

D：创伤或手术恢复期

答案：B

32.（2018年真题）同时具有短效和长效（双时相）作用的胰岛素/胰岛素类似物是（）

A：甘精胰岛素注射液

B：普通胰岛素注射液

C：精蛋白锌胰岛素注射液

D：预混胰岛素注射液

答案：D

33.服用地西泮后病情不会加重的是

A：COPD

B：重症肌无力

C：抑郁症

D：高血压

答案：D

34.可阻断钠通道，用于治疗室性心律失常的药品是

A：利多卡因

B：硝酸甘油

C：氨氯地平

D：氯沙坦

答案：A

35.对大多数肠杆菌科细菌和厌氧菌有活性，但对铜绿假单胞菌、不动杆菌及革兰阳性菌（尤其是肠球菌和耐青霉素肺炎球菌）的活性不及其他碳青霉烯类药物的是

A: 西司他丁

B: 美罗培南

C: 亚胺培南

D: 厄他培南

答案：D

36.可引起高钾血症，应避免与留钾利尿药联合应用的是()

A: 哌唑嗪

B: 地高辛

C: 卡托普利

D: 呋塞米

答案：C

37.氨曲南的作用特点不包括

A: 血浆半衰期较短

B: 低毒，与青霉素类及头孢菌素类无交叉过敏

C: 时间依赖性抗菌药物

D: 可用于治疗脑膜炎

答案：D

38.临床上最常用的内分泌治疗药物是

A: 雌激素

B: 氨氯米特

C: 他莫昔芬

D: 雄激素

答案：C

39.强心苷最常见的早期心脏毒性反应是()

A: 室性期前收缩

B: 房颤

C: 二联律

D: 房性期前收缩

答案：A

40.以肠内营养乳剂（TPF-D）作为唯一营养来源的患者，推荐剂量为一日

A: 10ml/kg

B: 40ml/kg

C: 30ml/kg

D: 20ml/kg

答案：C

41.（2018年真题）属于肾上腺受体激动剂的降眼压药是（）

A: 地匹福林

B: 拉坦前列素

C: 毛果芸香碱

D: 噻吗洛尔

答案：A

42.下列抗肿瘤药物中存在高致吐风险的是

A: 顺铂

B: 吉西他滨

C：甲氨蝶呤

D：依托泊苷

答案：A

43.中度致吐性化疗药所引起恶心呕吐的治疗应选

A：5-HT3受体阻断剂+口服地塞米松

B：奥美拉唑+口服地塞米松

C：5-HT3受体阻断剂+口服地塞米松+阿瑞吡坦

D：每日化疗前，应用5-HT3受体阻断剂或口服地塞米松

答案：A

44.（2018年真题）适应症仅应用于治疗失眠的药物是（）

A：地西泮

B：苯巴比妥

C：氟西汀

D：佐匹克隆

答案：D

45.毒性大，不能注射用的抗真菌药是

A：灰黄霉素

B：制霉菌素

C：咪康唑

D：克霉唑

答案：B

46.禁用于妊娠妇女和小儿的药物是()

A：氨基糖苷类

B：氟喹诺酮类

C：大环内酯类

D：头孢菌素类

答案：B

47.氯霉素的抗菌作用机制是()

A：抑制细菌的DNA合成

B：干扰细菌的细胞壁合成

C：抑制细菌的蛋白质合成

D：干扰细菌的RNA转录

答案：C

48.常引起体位性低血压的是

A：十一酸睾酮

B：普适泰

C：哌唑嗪

D：非那雄胺

答案：C

49.丙烯胺类抗真菌的代表药为()

A：伊曲康唑

B：卡泊芬净

C：伏立康唑

D：特比萘芬

答案：D

50.（2015年真题）属于润滑性泻药的是（）。

A：甘油（开塞露）

B：乳果糖

C：聚乙二醇4000

D：酚酞

答案：A

51.以下哪项不是糖皮质激素的不良反应

A：心律失常

B：诱发癫痫

C：伤口愈合缓慢

D：电解质紊乱

答案：A

52.通过与敏感需氧革兰阴性菌细胞膜上PBP3的高度亲合而发挥杀菌作用，仅对需氧革兰阴性菌包括铜绿假单胞菌具有良好抗菌活性，对革兰阳性菌和厌氧菌作用差的是

A：头孢噻肟

B：氨曲南

C：头孢美唑

D：头孢他啶

答案：B

53.（2019年真题）沙库巴曲缬沙坦钠片说明书的部分内容节选如下，请结合问题作答。

A：患者，男，47岁，慢性心力衰竭伴高钾血症（血K+5

B：患者，男，47岁，诊断为难治性高血压，使用依那普利、氢氯噻嗪、氨氯地平治疗仍未达标

C：患者，男，47岁，慢性心力衰竭，LVEF=35%，血压120/65mmHg

D：患者，男，47岁，诊断为高血压，生活方式干预无效，随机血压155/95mHg

答案：C

54.属于可供静脉注射的胰岛素/胰岛素类似物的是

A：地特胰岛素

B：普通胰岛素

C：预混胰岛素

D：精蛋白锌胰岛素

答案：B

55.破坏DNA结构和功能的抗恶性肿瘤药是

A：多柔比星

B：5-氟尿嘧啶

C：吉非替尼

D：环磷酰胺

答案：D

56.渗透性泻药()

A：甘油

B：地芬诺酯

C：硫酸镁

D：乳果糖

答案：D

57.（2020年真题）替罗非班的作用机制是

A：阻断血小板糖蛋白Ⅱb/Ⅲa受体

B：抑制凝血酶

C：拮抗维生素K

D：抑制凝血因子X

答案：A

58.洛伐他汀的作用是

A：影响脂蛋白合成、转运及分解的药物

B：主要影响胆固醇吸收

C：主要影响甘油三酯合成

D：主要影响胆固醇合成

答案：D

59.下列何药对心房颤动无治疗作用

A：利多卡因

B：奎尼丁

C：胺碘酮

D：普萘洛尔

答案：A

60.属于前列腺素FP受体激动剂的是

A：曲伏前列素

B：9%硼酸冰片滴耳液

C：1%碘甘油

D：四环素

答案：A

61.患者，男性，48岁，醉酒呕吐后出现发热、咳脓痰1周，头孢唑林治疗4天后体温稍下降，但痰量仍较多，有臭味，考虑厌氧菌感染，应加用以下哪种药物

A：阿奇霉素

B：甲硝唑

C：氟康唑

D：阿米卡星

答案：B

62.糖尿病选用

A：大剂量碘剂

B：丙硫氧嘧啶

C：放射性碘

D：格列齐特

答案：D

63.青霉素在体内的主要消除方式是

A：肾小球滤过

B：被血浆酶破坏

C：肝脏代谢

D：肾小管分泌排泄

答案：D

64.关于红霉素使用的叙述，错误的是

A：主要由肝脏代谢，代谢物由肾脏排出

B：在明确需要的情况下可在妊娠期使用

C：老年人使用发生尖端扭转型室性心动过速的风险增加

D：重症肌无力病史的患者使用有病情加重的风险

答案：A

65.属于抗孕激素药，用于终止早孕的是

A：黄体酮

B：米非司酮

C：甲地孕酮

D：左炔诺孕酮

答案：B

66.既有抗病毒作用又有抗肿瘤作用的免疫调节剂是

A：硫唑嘌呤

B：干扰素

C：环磷酰胺

D：更昔洛韦

答案：B

67.常用于引产或催产，亦用于产后出血和子宫复原不全

A：麦角新碱

B：缩宫素

C：地诺前列酮

D：普拉睾酮

答案：B

68.与HIV－1的逆转录酶直接结合并通过破坏该酶的催化位点来阻断RNA依赖和DNA依赖的DNA聚合酶的活性的是

A：蛋白酶抑制药

B：整合酶抑制剂

C：核苷类反转录酶抑制药

D：非核苷类反转录酶抑制药

答案：D

69.属于芳香酶抑制剂的抗肿瘤药是

A：阿那曲唑

B: 炔雌醇

C: 氟他胺

D: 他莫昔芬

答案：A

70.奥美拉唑属于

A: M受体拮抗药

B: H2受体拮抗药

C: 胃泌素受体拮抗药

D: H+，K+-ATP酶抑制剂

答案：D

71.我国研制的没有“金鸡纳”反应的药物是

A: 氯喹

B: 伯氨喹

C: 奎宁

D: 青蒿素

答案：D

72.属于硝基呋喃类的是()

A: 甲硝唑

B: 呋喃妥因

C: 夫西地酸

D: 磺胺甲噁唑

答案：B

73.出现流感样综合征，寒战、发热的药物是()

A: 对氨基水杨酸

B: 异烟肼
C: 链霉素
D: 利福平
答案：D

74.()用于耐青霉素的金黄色葡萄球菌引起的严重感染
A: 红霉素
B: 克林霉素
C: 克拉霉素
D: 万古霉素
答案：D

75.止吐方案：每日化疗前，联合应用5-HT
A: 中度致吐性化疗药所引起的恶心与呕吐
B: 低度致吐性化疗药所引起的恶心与呕吐
C: 重度致吐性化疗药所引起的恶心与呕吐
D: 微弱致吐性化疗药所引起的恶心与呕吐
答案：C

76.熊去氧胆酸的禁忌证不包括
A: 哺乳期妇女
B: 胆道完全梗阻
C: 高血压患者
D: 严重肝功能不全者
答案：C

77.瑞舒伐他汀用于原发性高胆固醇血症和混合型高脂血症的初始剂量是

A：15mg

B：5mg

C：10mg

D：20～40mg

答案：B

78.患者，男性，26岁，因“咳嗽伴间断发热1周”入院，查体：T38．9℃，P90次／分，R21次／分，BP110／70mmHg，血常规：白细胞16．9×109／L，中性粒细胞百分比84．6%；胸部CT示右下肺炎症。诊断为“右侧肺炎”。

A：在使用万古霉素的第4个维持剂量给药前测定谷浓度

B：该万古霉素浓度偏低

C：万古霉素是浓度依赖性抗菌药物

D：该患者用法不能维持全天稳定的血药浓度

答案：C

79.与瑞格列奈无药物相互作用的是

A：伊曲康唑

B：吉非贝齐

C：环孢素

D：克拉霉素

答案：D

80.（2018年真题）不易发生“双硫仑样”反应的药物是（）

A：头孢替安

B：头孢曲松

C：头孢他啶

D：头孢哌酮

答案：C

81.口服吸收少，用于肠道感染的是

A：呋喃唑酮

B：磺胺嘧啶

C：氧氟沙星

D：甲氧苄啶

答案：A

82.治疗酮症酸中毒及糖尿病昏迷的药物是

A：氢氧化镁

B：二甲双胍

C：罗格列酮

D：胰岛素

答案：D

83.噻托溴铵平喘的主要机制是ABCDE

A：阻断腺苷受体

B：激动肾上腺素β2受体

C：拮抗M胆碱受体

D：抑制白三烯受体

答案：C

84.（2017年真题）西酞普兰抗抑郁的药理作用机制是（）

A：抑制单胺氧化酶

B：抑制神经末梢突触前膜的α2受体

C：抑制5-羟色胺及去甲肾上腺素再摄取

D：抑制5-羟色胺再摄取

答案：D

85.左氧氟沙星用于治疗()

A: 伤寒、副伤寒

B: 钩端螺旋体病

C: 鼠疫、土拉菌病

D: 布鲁菌病

答案：A

86.患者，女，68岁。近期有急性心肌梗死病史。目前正在服用阿司匹林、氯吡格雷、普伐他汀和美托洛尔。近日因偶尔出现胃灼热不适感而就医，该患者应避免使用的药物是

A: 雷贝拉唑

B: 雷尼替丁德

C: 奥美拉唑

D: 法莫替丁

答案：C

87.属于嘌呤类抗代谢类药物的是

A: 甲氨蝶呤

B: 吉西他滨

C: 巯嘌呤

D: 长春瑞滨

答案：C

88.单独应用时止吐作用相对较弱，主要作为辅助药物，用于减轻地塞米松所致焦虑和甲氧氯普胺所致静坐不能，也可用于减少预期性的化疗所致恶心呕吐的是

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：
https://d.book118.com/928072054045007022