

2024 年广西壮族自治区《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试完整版含答案（培优）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 对混合型血脂异常，必须联用他汀类和贝特类，最佳的给药方案是

- A: 早晨用贝特类，晚上用他汀类
- B: 早晨用他汀类，晚上用贝特类
- C: 早晚联合服用他汀类和贝特类
- D: 晚上联合服用他汀类和贝特类

答案：A

2. 能抑制性腺，造成男性不育和女性闭经的抗风湿药物是

- A: 青藤碱
- B: 白芍总苷
- C: 肿瘤坏死因子(TNF- α)拮抗剂
- D: 雷公藤多苷

答案：D

3. 控制癫痫持续状态应首选

- A: 静脉注射丙戊酸钠
- B: 口服硫酸镁
- C: 肌肉注射地西洋
- D: 静脉注射地西洋

答案：D

4. 急诊处方印刷用纸的颜色是

- A: 淡红色
- B: 淡黄色
- C: 淡蓝色
- D: 淡绿色

答案：B

5. 目前推荐的绝经激素治疗窗口期是

- A: 绝经后 10 年之内或 60 岁以前
- B: 绝经后 15 年之内或 60 岁以后
- C: 60 岁以后
- D: 绝经后 5 年之内

答案：A

6. 通过拮抗 α 受体而用于前列腺增生症治疗的药物是

- A: 非那雄胺
- B: 前列康
- C: 黄酮哌酯
- D: 特拉唑嗪

答案：D

7. 医师用药咨询的内容是

- A: 栓剂、滴眼剂和气雾剂等外用剂型的正确使用方法
- B: 一种药品有多种适应证或用药剂量范围较大
- C: 减肥、补钙、补充营养素
- D: 抗菌药物的合理使用

答案：D

8. 抗高血压的药是()。

- A: 法莫替丁
- B: 二甲双胍
- C: 多粘菌素
- D: 卡托普利

答案: D

9. 可以迅速缓解哮喘症状，起效快的药品是

- A: 非甾体抗炎药
- B: β -受体阻断剂
- C: 吸入型糖皮质激素
- D: 短效 β_2 -受体激动剂

答案: D

10. 糖尿病患者一旦出现尿酮体阳性，可以提示患者

- A: 生长激素分泌过度
- B: 胰岛素分泌过度
- C: 病情尚未控制
- D: 伴甲状腺功能亢进

答案: C

11. 可引起血小板减少症的抗肿瘤药物是

- A: 阿昔洛韦
- B: 利巴韦林
- C: 阿洛司琼
- D: 甲氨蝶呤

答案: D

12. 据统计，妊娠期和哺乳期妇女不合理用药高达 80% 左右。故临床药师应熟悉妊娠期和哺乳期妇女用药原则，以确保胎儿及乳儿的安全。

- A: 氯霉素
- B: 阿昔洛韦
- C: 洛伐他汀
- D: 氯化钾

答案：C

13. 高血压合并冠心病，偶发窦性心动过速宜选用的药物是

- A: 缬沙坦
- B: 美托洛尔
- C: 氢氯噻嗪
- D: 非洛地平

答案：B

14. 降低夜间的眼压作用强，尤其用于其他降眼压药不能耐受的患者的药物是

- A: 拉坦前列素
- B: 噻吗洛尔
- C: 毛果芸香碱
- D: 溴莫尼定

答案：A

15. 有机磷农药中毒者体内血胆碱酯酶活力下降，中度中毒者可降至

- A: 30% 以下
- B: 50%~70%
- C: 20% 以下
- D: 30%~50%

答案：D

16. 长期应用可引起牙龈出血、手术创面渗血等出血倾向，需要合用维生素 K 的药物是

- A: 头孢菌素类
- B: 培高利特
- C: 加替沙星
- D: 氟西汀

答案：A

17. 属于癌症第二阶梯止痛药物的是

- A: 美沙酮
- B: 二氢可待因
- C: 对乙酰氨基酚
- D: 谷维素

答案：B

18. 格列本脲

- A: 宜餐前服用
- B: 宜睡前服用
- C: 宜餐后服用
- D: 宜清晨服用

答案：A

19. 抗癫痫药应从小剂量起始给药，滴定增量，长期规律用药。成年癫痫患者药物治疗时

- A: 卡马西平
- B: 拉莫三嗪

C: 丙戊酸钠

D: 苯妥英钠

答案: C

20. 老年（≥65 岁）帕金森患者，或伴认知障碍，首选

A: 金刚烷胺？

B: 普拉克索？

C: 苯海索？

D: 复方左旋多巴？

答案: D

21. 下面属于消化性溃疡发病机制中胃、十二指肠黏膜的攻击因素的是

A: 非甾体抗炎药

B: HCO_3^- 的分泌

C: 胃黏液

D: 胃黏膜屏障

答案: A

22. 目前，临床用药的单剂量药盒主要应用于

A: 住院患者

B: 门诊患者

C: 自购药品患者

D: 家庭患者

答案: A

23. 出血性脑血管病患者的卧床休息时间，脑出血

A: 4~5 周

B: 2~4 周

C: 1~2 周

D: 2~3 周

答案: B

24. (2018 年真题) 患者, 女, 34 岁, 因易疲劳、体重增加、反应迟钝、肌肉痉挛就诊, 化验结果显示 TSH 增高 FT3、FT4 减低, 临床诊断为甲状腺功能减退使用左甲状腺素钠 100 μ gqd 治疗。药师对该患者的用药指导, 正确的是 ()

A: 睡前顿服

B: 早餐前半小时, 顿服

C: 晚餐后顿服

D: 早餐后半小时, 顿服

答案: B

25. 患者男 62 岁无吸烟饮酒史患高血压、高脂血症数年, 未治疗。半年前就诊查肝肾功能正常, 按医嘱服用阿托伐他汀、氨氯地平。服药一个月后复查肝功能结果显示 AST145U/L, ALT134/L, 排除了其他疾病因素后停用阿托伐他汀肝功能逐步恢复正常。二个月后, 改用普伐他汀, 再次出现肝功能异常。肝功能异常的不良反应该与他汀类药物之间的因果关系应评价为 ()

A: 肯定

B: 很可能

C: 可能无关

D: 可能

答案: A

26. 更年期综合征最具特征性的症状为

A: 潮热、出汗

B: 月经周期延长，经量减少，最后绝经

C: 阴道萎缩

D: 心悸、胸闷不适

答案：A

27. 药物对孕妇的不良影响中，甲氨蝶呤可引起()。

A: 溶血

B: 畸形

C: 流产

D: 死胎

答案：B

28. 给失眠患者开具地西洋，医师应采用的处方纸是

A: 淡黄色处方纸

B: 淡绿色处方纸

C: 白色、右上角有标识处方纸

D: 白色、右上角无标识处方纸

答案：C

29. 医师咨询"他汀类药物合用伊曲康唑或环丙沙星等"，属于

A: 药物相互作用

B: 新药信息

C: 给药途径

D: 禁忌证

答案：A

30. 能减弱华法林的抗凝作用的食物是

A: 地瓜

B: 芒果

C: 维生素 K

D: 韭菜

答案: D

31. WHO 推荐 12 岁以下儿童碘的摄入范围是

A: 30~120 $\mu\text{g}/\text{d}$

B: 50~120 $\mu\text{g}/\text{d}$

C: 30~100 $\mu\text{g}/\text{d}$

D: 50~100 $\mu\text{g}/\text{d}$

答案: B

32. 可抑制血小板聚集和释放的是

A: 华法林

B: 肝素

C: 噻氯匹定

D: 尿激酶

答案: C

33. (2017 年真题) 用于评价肝功能不全严重程度的是 ()

A: 数字评分法

B: Cochrane 证据分级

C: APACHE 评分系统

D: CTP 评分标准

答案: D

34. 吩噻嗪类抗精神病药中毒的临床表现是 ()

A: 明显的锥体外系症状

B: 谵妄、躁狂、幻觉

C: 心血管毒性

D: 肌肉震颤、抽搐

答案: A

35. 应用 α -葡萄糖苷酶抑制剂时注意事项错误的是

A: 与胰岛素或磺脲类药联合应用，可增加发生低血糖的危险

B: 餐后服用可减少胃肠道刺激

C: 非磺酰脲类胰岛素促泌剂与 α -葡萄糖苷酶抑制剂合用易出现低血糖现象

D: 服用后常致胀气，可缓慢增加剂量和控制饮食减轻

答案: B

36. 用于中度疼痛和癌性疼痛宜选用的药物是

A: 可待因

B: 多奈哌齐

C: 阿司匹林

D: 吗啡

答案: A

37. 属于抗过敏非处方药的是

A: 异丙嗪

B: 依巴斯汀

C: 息斯敏

D: 氯雷他定

答案: A

38. 可导致胎儿颅面部畸形、腭裂的药物是

- A: 叶酸拮抗剂
- B: 雌激素、孕激素、雄激素
- C: 沙利度胺
- D: 苯巴比妥

答案：A

39. 药师审核后判定为合理处方，应该

- A: 调配处方并发药
- B: 拒绝调配处方，并依照有关规定报告
- C: 拒绝调配处方，联系处方医师并进行干预
- D: 拒绝调配处方

答案：A

40. （2018 年真题）患者，女，25 岁，产后 2 个月，哺乳期，因尿路感染需要给予抗感染治疗，首选的药物是（）

- A: 左氧氟沙星
- B: 头孢呋辛
- C: 多西环素
- D: 阿米卡星

答案：B

41. 给幼儿患者选用糖浆、水剂、冲剂等较合适，体现儿童用药原则中的

- A: 避免食物的影响
- B: 根据儿童特点选择适宜的给药方案
- C: 密切监护
- D: 严格掌握用药剂量

答案：B

42. 另有儿童处方集、护士处方集的是

- A: 《中国国家处方集（2010 年版）》
- B: 《英国国家处方集》
- C: 《国家基本药物处方集（2012 年版）》
- D: 《医师案头参考》

答案：B

43. 非甾体抗炎药的不良反应，偶可致无菌性脑膜炎

- A: 布洛芬
- B: 塞来昔布
- C: 保泰松
- D: 美洛昔康

答案：A

44. 伴有心脏病、高血压者应慎用的药品是

- A: 含咖啡因的抗感冒药
- B: 含伪麻黄碱的抗感冒药
- C: 含右美沙芬的抗感冒药
- D: 含氯苯那敏的抗感冒药

答案：B

45. 属于选择性 5-HT 再摄取抑制剂的是（）

- A: 氟伏沙明
- B: 阿夫唑嗪
- C: 特拉唑嗪
- D: 非那雄胺

答案：A

46. 患者男 56 岁因出现面色苍白、乏力、肢体麻木、共济失调等症状就诊查体舌面光滑,呈牛肉样舌”。化验结果提示血清叶酸和维生素 B12 水平下降, 下列药物中不会影响维生素 B12 吸收的是()

- A: 奥美拉唑
- B: 二甲双胍
- C: 对氨基水杨酸
- D: 氨氯地平

答案: D

47. 主要对成本进行量化分析、也同时考虑效果, 用于两种或多种药物治疗方案的选择是指

- A: 成本-效用分析
- B: 成本-效益分析
- C: 最小成本分析
- D: 最大效果分析

答案: C

48. 患者, 男, 26 岁, 自述头痛、咽喉痛、全身乏力、畏寒, 偶尔咳嗽, 并有鼻塞、流鼻涕、打喷嚏等症状。经检查后, 测量口腔体温 37.8℃, 脉搏 72 次/分, 白细胞计数 $3.7 \times 10^9/L$ 。医生为患者开具的处方如下:

- A: 3 日
- B: 4 日
- C: 5 日
- D: 2 日

答案: B

49. 患者，男，70 岁，2 周以来出现尿频、夜尿次数明显增多，且尿流变细、间断，排尿踌躇、费力等排尿困难现象，排尿后滴沥、尿不尽，近几天又出现睡眠障碍。

- A: 急性肾盂肾炎
- B: 膀胱炎
- C: 压力性尿失禁
- D: 急迫性尿失禁

答案：A

50. 以下临床联合用药中，药物相互作用主要影响药效学的是

- A: 维生素 C 与多潘立酮同服吸收减少
- B: 昆布片同服异烟肼导致药效降低
- C: 四环素同服硫酸亚铁降低疗效
- D: 氢氯噻嗪减弱甲苯磺丁脲的降糖作用

答案：D

51. I 期新药临床试验样本数要求查看材料

- A: 20~30 例
- B: ≥ 300 例
- C: 主要病种 ≥ 300 例
- D: 常见病 ≥ 12000 例

答案：A

52. 患者，男，38 岁，身高 175cm，体重 70kg。3 日前自觉全身肌肉酸痛、头疼，轻微咳嗽，自服抗感冒药物效果不佳，近 1 日觉畏寒，发热，体温 37.7℃，遂来本院就诊。检查结果：患者神清，查咽喉部红肿，扁桃腺（-），双肺呼吸音清，心脏听诊无异常，腹检无异常。血象 WBC 正常，其他正常。诊断为：上呼吸道感染（感冒）。

- A: 抗生素对导致感冒和流感的病毒都有作用
- B: 3 岁以下儿童不应使用非处方抗感冒药
- C: 感冒药连续服用不得超过 7 天
- D: 治疗成人感冒症状有效的药物仅限于非处方解热镇痛药和减轻鼻充血药

答案：A

53. 血管扩张剂、 α 受体阻滞剂、抗抑郁药等可能会诱发或加重的反应是

- A: 心血管系统与维持水电解质平衡的内环境稳定功能减弱，易发生体位性低血压
- B: β 受体阻滞剂普萘洛尔等减慢心率的作用亦钝化
- C: 肝脏合成凝血因子能力下降，对肝素及华法林非常敏感
- D: 对异丙肾上腺素的敏感性降低

答案：A

54. 以下药物中毒事例中不宜用硫酸镁导泻的是

- A: 降糖药中毒
- B: 抗结核药中毒
- C: 解热镇痛药中毒
- D: 镇静药中毒

答案：D

55. 氢氯噻嗪与地高辛同服出现心律失常的机制是

- A: 敏感化作用
- B: 减少不良反应
- C: 协同作用
- D: 竞争性拮抗作用

答案：A

56. 以下治疗咳嗽的药物中，白天工作的驾驶员可选用止咳的非处方药是

- A: 苯丙哌林
- B: 氨溴索
- C: 可待因
- D: 羧甲司坦

答案：A

57. 解救慢性重症铅性脑病患者给予

- A: 糖皮质激素
- B: 卫生教育
- C: 补充蛋白质
- D: 驱铅治疗

答案：A

58. 某患者，诊断为抑郁症，服用帕罗西汀 6 周，无明显效果，现考虑更换 MAOIs 类药物，必须先停用帕罗西汀

- A: 5 天
- B: 1 周
- C: 3 天
- D: 2 周

答案：D

59. 应用雷托那韦等蛋白酶抑制剂后，需要多饮水的主要机制是

- A: 加快排泄，减小肾毒性
- B: 患者伴血容量较低

C: 减小用药部位刺激性

D: 防止形成尿道结石或肾结石

答案: D

60. 目前推荐的绝经期激素补充治疗的窗口期是()

A: 大于 60 岁

B: 绝经后 5 年之内

C: 绝经后 5 年之内或大于 60 岁

D: 绝经后 10 年之内或 60 岁以前

答案: D

61. (2019 年真题) 下列通用名与别名的组合中，不是同一种药品的是

A: 醋酸氯己定与洗必泰

B: 氨甲苯酸与止血敏

C: 桂利嗪与脑益嗪

D: 利可君与利血生

答案: B

62. “冷处”所指温度范围是

A: $-5^{\circ}\text{C} \sim 10^{\circ}\text{C}$

B: $30^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$

C: $10^{\circ}\text{C} \sim 30^{\circ}\text{C}$

D: $2^{\circ}\text{C} \sim 10^{\circ}\text{C}$

答案: D

63. 可在尿中结晶，送服药物时要喝约 250ml 水，服药后也要多喝水，保持高尿流量的药物是

A: 左氧氟沙星

B: 头孢哌酮

C: 特拉唑嗪

D: 卡马西平

答案：A

64. 应在清晨服用，可迅速在肠道发挥作用的盐类泻药是

A: 维生素 B1

B: 噻氯匹定

C: 沙丁醇胺

D: 硫酸镁

答案：D

65. 患者，男，52 岁支气管哮喘病史 10 年。因间断喘息发作，长期自行服用泼尼松片 20mgq

A: 该患者可能出现的不良反应中，不包括的是（）

B: 低血压

C: 消化性溃疡

D: 骨质疏松

答案：A

66. 患者，男，69 岁，因高血压长期服用抗高血压药，近日患者出现足踝部水肿引起此不良反应的药物是（）

A: 普萘洛尔

B: 多沙唑嗪

C: 卡托普利

D: 非洛地平

答案：D

67. 属于 CYP1A2 强抑制剂的药物是

- A: 氟康唑
- B: 西咪替丁
- C: 红霉素
- D: 环丙沙星

答案: D

68. 患者，女，43 岁。近 3 月来午后低热，剧烈咳嗽，痰中带血，进食少，乏力，消瘦，应用抗菌药及止咳化痰药物无效，X 线检查未见异常，血沉未见增快，痰中找到结核菌，临床诊断为肺结核。

- A: 乙胺丁醇
- B: 利福平
- C: 异烟肼
- D: 吡嗪酰胺

答案: B

69. 患者，女，68 岁，既往有高血压，双侧肾动脉狭窄，因水肿复诊，体检和实验室检查：血压 172 / 96mmHg，尿蛋白 >29 / 24h (正常值 <150mg / 24h)，血尿酸 416 $\mu\text{mol} / \text{L}$ (正常值 180~440mmol / L)，血钾 6.1mmol / L (正常值 3.5~5.5mmol / L)。在已经服用氨氯地平的基础上，应考虑联合应用的抗血压药品是

- A: 依那普利
- B: 卡托普利
- C: 螺内酯
- D: 呋塞米

答案: D

70. 有关依从性的说法错误的是

- A: 药师加强对患者的用药指导可提高其依从性
- B: 患者如缺乏依从性可能会干扰临床试验结果
- C: 依从性仅限于药物治疗
- D: 采用缓释或控释制剂给药有利于提高患者的依从性

答案：C

71. (2018 年真题) 患者,男,46 岁,因类风湿性关节炎长期使用免疫抑制剂,近日因出现发热、咳嗽、咳痰入院经病原学检查,诊断为侵袭性肺曲霉病,临床欲使用伏立康唑治疗。患者同时合并肝功能不全 Child-TurcottePugh (CTP) 评分为 13 分 (CTPC 级)。根据 CTP 评分结果,药师的用建议是 ()

- A: 该患者重度肝功能不全,不建议使用伏立康唑
- B: 该患者轻度肝功能不全,伏立康唑维持剂量减少 25%
- C: 该患者中度肝功能不全,伏立康唑维持剂量减少 50%
- D: 该患者轻度肝功能不全,伏立康唑维持剂量不变

答案：A

72. 使用后不能饮酒或含酒精饮料,以免发生“双硫仑样反应”的药物是

- A: 西地碘含片
- B: 氯己定含漱液
- C: 地塞米松粘贴片
- D: 甲硝唑含漱液

答案：D

73. 患者，男，53 岁，季节性过敏性鼻炎病史 5 年，3 天前，受凉后出现流涕、鼻塞、咳嗽，咳痰，低热，头痛，无胸闷、气短等其他不适，已在医院发热门诊完成了鼻拭子检查，排除了甲型流感和 Z 型流感，诊断为普通感冒。

- A: 解热镇痛药
- B: 含伪麻黄碱的复方抗感冒药
- C: 鼻用减充血剂
- D: 神经氨酸酶抑制剂

答案：D

74. 某男性，53 岁，参加婚礼后 5 小时突发左脚第 1 跖趾关节剧痛，3 小时后局部出现红、肿、热、痛和活动困难。实验室检查示血尿酸为 $500 \mu\text{mol/L}$ ；足部 x 线示非特征性软组织肿胀。

- A: 苯溴马隆
- B: 丙磺舒
- C: 秋水仙碱
- D: 别嘌醇

答案：C

75. 饮食对粪外观的影响，食绿叶菜

- A: 暗绿色
- B: 酱色
- C: 黑褐色
- D: 红色

答案：A

76. 以硫酸镁治疗子痫，适宜

- A: 口服给药

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

B: 肌肉注射

C: 吸入给药

D: 直肠给药

答案: B

77. 服用保泰松、水杨酸钠可呈现

A: 白陶土便

B: 橘红至红色

C: 黄色

D: 红至黑色

答案: D

78. 属于选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂的是

A: 文拉法辛

B: 氟西汀

C: 吗氯贝胺

D: 阿米替林

答案: B

79. 脑出血

A: 4~5 周

B: 2~4 周

C: 1~2 周

D: 2~3 周

答案: B

80. 吩噻嗪类抗精神病药中毒时若癫痫发作应给予

A: 有机硫类

B: 地西泮

C: 间羟胺

D: 阿托品

答案: B

81. 可减弱华法林抗凝作用的食物有

A: 葡萄柚

B: 大蒜

C: 洋葱

D: 韭菜

答案: D

82. 患者,女,46岁,高血压病史3年,2年前出现关节晨僵、手关节及膝关节疼痛,诊断为类风湿关节炎。半年前症状加重,采用了联合用药方案:患者用药如下:

A: 双氯芬酸钠缓释片

B: 羟氯喹片

C: 甲氨蝶呤片

D: 氨氯地平片

答案: B

83. 治疗药源性疾病的方法如下,最先采用的是

A: 调整治疗方案

B: 对症治疗

C: 拮抗致病药物

D: 停用致病药物

答案: D

84. 患者,男,35岁,髋关节置换术后7天,患者右侧下肢肿胀、疼痛,抬高患肢后可好转。

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/928105054045007022>