

2024 年河北省盐山县《执业药师之西药学专业二》考试必刷 200 题题库附答案下载

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 癫痫大发作合并小发作选用

- A: 乙琥胺
- B: 丙戊酸钠
- C: 苯妥英钠
- D: 苯巴比妥

答案：B

2. 长春碱使细胞有丝分裂停止于

- A: G
- B: S 期
- C: G
- D: M 期

答案：D

3. 与西地那非合用，可导致严重低血压的药品是

- A: 非那雄胺
- B: 甲睾酮
- C: 硝酸甘油
- D: 丙酸睾酮

答案：C

4. 属于胞嘧啶抗代谢类药物的是()

- A: 甲氨蝶呤
- B: 巯嘌呤
- C: 吉西他滨
- D: 长春瑞滨

答案：C

5. 四环素联用麦角生物碱

- A: 增加麦角中毒的风险
- B: 肝毒性增加
- C: 口服吸收减少
- D: 调整抗凝血药的剂量

答案：A

6. 高血压伴有肾功能不全者最好选用

- A: 利血平
- B: 胍乙啶
- C: 卡托普利
- D: 氢氯噻嗪

答案：C

7. 对血吸虫具有杀灭活性的药物是()。

- A: 阿苯达唑
- B: 吡喹酮
- C: 甲硝唑
- D: 噻嘧啶

答案：B

8. 属于雄激素类的是()

- A: 睾酮
- B: 甲地孕酮
- C: 己烯雌酚
- D: 他莫昔芬

答案：A

9. 下述保肝药物中可导致低钾血症的是

- A: 多烯磷脂酰胆碱
- B: 复方甘草酸苷
- C: 门冬氨酸鸟氨酸
- D: 还原型谷胱甘肽

答案：B

10. (2016 年真题) 抗病毒药阿昔洛韦在静脉滴注时滴速必须缓慢，否则可能引起的不良反应 ()

- A: 胰腺坏死
- B: 肺部纹理加重
- C: 急性肾衰竭
- D: 急性肝衰竭

答案：C

11. 不明原因的腹痛、阑尾炎、胃肠道梗阻患者禁用 ()

- A: 乳果糖
- B: 甘油
- C: 聚乙二醇 4000
- D: 硫酸镁

答案：A

12. 可特异性拮抗肝素抗凝作用的是

- A: 甲萘氢醌
- B: 鱼精蛋白
- C: 酚磺乙胺
- D: 氨甲环酸

答案：B

13. 布地奈德的作用特点是

- A: 适用于轻度持续型（2 级以上）哮喘的长期治疗
- B: $10\mu\text{g/ml}$ 为有效治疗浓度， $15\text{--}20\mu\text{g/ml}$ 以上会出现毒性反应
- C: 舒张支气管作用弱且慢，适用于夜间哮喘和痰多的患儿
- D: 不宜长期、单一、过量使用，不宜用于重度哮喘患者，对小于 18 个月的婴幼儿和大多数儿童有效

答案：A

14. 属于钙通道阻滞剂的抗心律失常药是()

- A: 胺碘酮
- B: 利多卡因
- C: 维拉帕米
- D: 普鲁卡因胺

答案：C

15. （2016 年真题）属于神经激肽-1 受体阻断剂的止吐药是

- A: 托烷司琼
- B: 维生素 B6
- C: 甲氧氯普胺
- D: 阿瑞吡坦

答案：D

16. 成人使用美罗培南一日剂量不得超过

A: 4g

B: 3g

C: 6g

D: 5g

答案：C

17. 下列维生素中，属于水溶性的是()。

A: 维生素 A

B: 维生素

C: 维生素

D: 维生素

答案：D

18. 维生素 A 的适应证不包括

A: 坏血病

B: 角膜软化

C: 夜盲症

D: 干眼病

答案：A

19. (2016 年真题) 可抑制细菌 β -内酰胺酶的是

A: 舒巴坦

B: 磷霉素

C: 替考拉宁

D: 利福平

答案：A

20. 分子中含有强碱性基团，可与肝素分子中的硫酸根迅速结合，形成无活性的稳定复合物，使肝素失去抗凝活性的是

- A: 鱼精蛋白
- B: 氨甲环酸
- C: 维生素 K1
- D: 酚磺乙胺

答案：A

21. 有癫痫或精神病史的患者应慎用哪种药

- A: 乙胺丁醇
- B: 异烟肼
- C: 利福平
- D: 吡嗪酰胺

答案：B

22. 抗菌谱广，对厌氧菌也有强大抗菌活性，对 β -内酰胺酶高度稳定的药物是()

- A: 克拉维酸
- B: 他唑巴坦
- C: 氨曲南
- D: 美罗培南

答案：D

23. 可引起致死性肺毒性的抗心律失常药是()

- A: 利多卡因
- B: 胺碘酮
- C: 奎尼丁

D: 普萘洛尔

答案: B

24. 用于甲型和乙型流感的治疗，应及早在流感开始的第 1 或第 2 天开始治疗的药物是

A: 两性霉素 B

B: 奥司他韦

C: 制霉菌素

D: 膦甲酸钠

答案: B

25. 下述关于抗眼部细菌感染药物的描述中不正确的是()

A: 细菌性眼内炎可采用玻璃体腔内注射方式给予抗菌药物

B: 对淋球菌性结膜炎可采用全身及眼局部抗菌药物治疗

C: 对于衣原体感染的治疗主要是抗菌药物治疗

D: 全身给予抗菌药物是眼科细菌感染疾病的首选方法

答案: D

26. 下列药物使用期间需要缓慢停药的是

A: 依那普利

B: 比索洛尔

C: 地尔硫?

D: 氨氯地平

答案: B

27. 对耐药金黄色葡萄球菌感染有效的 β -内酰胺类抗生素是()

A: 苯唑西林

B: 喹诺酮类

C: 甲硝唑

D: 四环素

答案: A

28. 不属于中枢性镇咳药典型不良反应的是

A: 情绪激动

B: 心率增快

C: 成瘾性

D: 腹泻

答案: D

29. 属于高效利尿剂，耳毒性低，适用于有听力缺陷及急性肾衰竭患者的药物是

A: 托拉塞米

B: 依他尼酸

C: 布美他尼

D: 呋塞米

答案: C

30. 以下关于制霉菌素的描述中，错误的是

A: 口服吸收很少

B: 局部外用治疗浅表真菌感染

C: 对念珠菌属抗菌活性较高，但易产生耐药性

D: 作用机制与两性霉素 B 相似

答案: C

31. 口服存在首关效应的药物是

A: 氨溴索

B: 乙酰半胱氨酸

C: 溴己新

D: 羧甲司坦

答案：B

32. 慢性充血性心力衰竭宜

A: 快速洋地黄化

B: 停用洋地黄

C: 常规剂量的洋地黄

D: 不宜使用洋地黄

答案：C

33. 关于庆大霉素使用的叙述，错误的是

A: 避免该药耳部滴用

B: 与第一代注射用头孢菌素类合用时可能加重肾毒性

C: 应定期检查尿常规、血尿素氮、血肌酐，注意患者听力变化或听力损害先兆

D: 可静脉快速推注或静脉滴注给药

答案：D

34. 属于毛细血管止血药的是

A: 酚磺乙胺

B: 艾曲泊帕乙醇胺

C: 氨甲环酸

D: 甲萘氢醌

答案：A

35. (2016 年真题) 可使血小板内环磷腺苷 (cAMP) 浓度增高而产生抗血小板作用的药品是

- A: 替罗非班
- B: 氯吡格雷
- C: 阿司匹林
- D: 双嘧达莫

答案: D

36. 用药过程中需要监护迟发性腹泻的是()

- A: 紫杉醇
- B: 长春碱类
- C: 伊立替康
- D: 多柔比星

答案: C

37. 神经毒性较严重的是

- A: 顺铂
- B: 奥沙利铂
- C: 亚叶酸钙
- D: 卡铂

答案: B

38. 很少单独缺乏，常伴其他维生素缺乏，大量服用可使尿液变黄，该物质是

- A: 维生素 B2
- B: 维生素 AD
- C: 维生素 C
- D: 精氨酸

答案：A

39.（2018 年真题）不属于减鼻充血药的是（）

- A: 伪麻黄碱
- B: 麻黄碱
- C: 色甘酸钠
- D: 羟甲唑啉

答案：C

40.（2021 年真题）属于维生素 K 拮抗剂的抗凝血药物是（）

- A: 利伐沙班
- B: 依诺肝素
- C: 氯吡格雷
- D: 华法林

答案：D

41. 四环素联用红霉素使

- A: 增加麦角中毒的风险
- B: 肝毒性增加
- C: 口服吸收减少
- D: 调整抗凝血药的剂量

答案：B

42. 外用无效，口服治疗体癣，毛发癣的药物是

- A: 制霉菌素
- B: 灰黄霉素
- C: 克霉唑
- D: 咪康唑

答案：B

43. 用于治疗急、慢性支气管炎及各种刺激引起的刺激性干咳。缓释片一次 40mg，一日 2 次的药物是

- A: 可待因
- B: 右美沙芬
- C: 苯丙哌林
- D: 喷托维林

答案：C

44. 用于严重饥饿性酮症严重者的治疗方案是

- A: 一般采用 50%葡萄糖注射液 20~40ml，快速静脉注射
- B: 一般可给予 10%~25%葡萄糖注射液静脉滴注，并同时补充体液
- C: 应用高渗透压的 25%-50%葡萄糖注射液滴注，常与 20%甘露醇注射液联合应用
- D: 可予 10%~25%葡萄糖注射液滴注，每日 100g 葡萄糖即可控制病情

答案：D

45. 兰索拉唑属于

- A: M 受体阻断药
- B: 胃泌素受体阻断药
- C: H^+ , K^+ -ATP 酶抑制剂
- D: H_2 受体阻断药

答案：C

46. 为预防大剂量环磷酰胺引起的膀胱毒性，在充分水化，利尿的同时，还应给予的药物是（）

- A: 美司钠
- B: 二甲双肌
- C: 氯化钾
- D: 螺内酯

答案：A

47. 蒙脱石散是

- A: 吸附剂
- B: 微生态制剂
- C: 抗分泌药
- D: 抗动力药

答案：A

48. 属于抑酸药的是()

- A: 胃蛋白酶
- B: 胶体果胶铋
- C: 莫沙必利
- D: 奥美拉唑

答案：D

49. 对抗香豆素过量引起出血可选用

- A: 维生素 K1
- B: 维生素
- C: 鱼精蛋白
- D: 垂体后叶素

答案：A

50. 关于氢氯噻嗪临床应用的说法错误的是（）

- A: 服药期间应关注有无肌痉挛、耳鸣、听力障碍等症状
- B: 对血糖和尿酸无影响,可长期服用
- C: 老年患者服药后易发生低血压及肾功能损害
- D: 与磺胺类药物存在交叉过敏反应

答案：B

51. 可使人体对维生素 B2 的需求增加的是

- A: 雌激素
- B: 糖皮质激素
- C: 丙磺舒
- D: 异烟肼

答案：C

52. 通过改变虫体肌细胞膜的离子通透性发挥驱虫作用，适用于儿童，常见制剂为宝塔糖的药品是

- A: 噻嘧啶
- B: 青蒿素
- C: 哌嗪
- D: 氯喹

答案：C

53. 哺乳期妇女应用沙丁胺醇时，早产儿会出现

- A: 头痛
- B: 支气管痉挛
- C: 耐药性
- D: 暂时性低血糖

答案：D

54. 洋地黄的主要适应症不包括

- A: 心房扑动
- B: 急、慢性充血性心力衰竭
- C: 阵发性室上性心动过速
- D: 房室传导阻滞

答案：D

55. 患者，男，45 岁，因"咳嗽、咳痰 1 周，发热 2 天"入院，诊断为社区获得性肺炎，两次痰培养为金黄色葡萄球菌(MRSA)，适合选用的是

- A: 苄星青霉素
- B: 万古霉素
- C: 阿莫西林
- D: 双氯西林

答案：B

56. 是第一个 P2Y₁₂ 拮抗剂，可抑制血小板聚集的是()

- A: 华法林
- B: 尿激酶
- C: 噻氯匹定
- D: 肝素

答案：C

57. 抑酸剂泮托拉唑长期应用可引起的典型不良反应是

- A: 低镁血症
- B: 定向力障碍
- C: 血尿酸升高
- D: 血糖升高

答案：A

58. 下列药物中属于缩瞳药的是

- A: 毛果芸香碱
- B: 托吡卡胺
- C: 氢溴酸后马托品
- D: 硫酸阿托品

答案：A

59. 与吗啡合用可发生严重的、甚至致死的不良反应，包括躁狂、多汗、僵直、呼吸抑制、昏迷、惊厥和高热的药物是

- A: 吗氯贝胺
- B: 氯硝西泮
- C: 丙戊酸钠
- D: 苯巴比妥

答案：A

60. 患者，男性，26 岁，因“咳嗽伴间断发热 1 周”入院，查体：T38.9℃，P90 次/分，R21 次/分，BP110/70mmHg，血常规：白细胞 $16.9 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞百分比 84.6%；胸部 CT 示右下肺炎症。诊断为“右侧肺炎”。

- A: 肝功能不全者
- B: 肾功能不全者
- C: 推荐应用大剂量万古霉素来维持其血药浓度在 $15 \sim 20 \mu g/ml$ 并且长疗程的患者
- D: 老年人

答案：A

61. 熊去氧胆酸的禁忌证不包括

- A: 哺乳期妇女
- B: 严重肝功能不全者
- C: 胆道完全梗阻
- D: 高血压患者

答案：D

62. 与核糖体 30S 亚基结合，阻止氨基酰 tR-NA 进入 A 位的抗菌药是

- A: 万古霉素
- B: 四环素
- C: 青霉素
- D: 氯霉素

答案：B

63. 两性霉素 B 属于()

- A: 丙烯胺类抗真菌药
- B: 唑类抗真菌药
- C: 棘白菌素类抗真菌药
- D: 多烯类抗真菌药

答案：D

64. 应用硝普钠时的注意事项及用药监护不包括

- A: 避光使用
- B: 监测血压
- C: 缓慢静注
- D: 血硫氰酸盐水平

答案：C

65. 可能导致牙齿黄染的抗菌药物是

- A: 甲砜霉素
- B: 加替沙星
- C: 庆大霉素
- D: 多西环素

答案：D

66.（2017 年真题）药师在急诊药房值班时，接听病房咨询电话，得知一新入院耐甲氧西林金黄葡萄球菌肺部感染的 7 岁儿童患者，出现高热、肺纹加重，患儿肾功能正常。欲静脉滴注万古霉素。

- A: 头孢哌酮
- B: 替考拉宁
- C: 头孢曲松
- D: 阿米卡星

答案：B

67. 下列哪项不属于提高镇静催眠用药安全性的特点

- A: 服用后应避免高速高空作业
- B: 与易成瘾的药物合用不会产生依赖性
- C: 应尽量避免长期使用同一种镇静催眠药
- D: 镇静催眠药可交替使用

答案：B

68.（2019 年真题）对磺胺类药物有严重过敏史的患者可选择的利尿剂是（）

- A: 依他尼酸
- B: 呋塞米
- C: 布美他尼
- D: 托拉塞米

答案：A

69. (2016 年真题) 长期应用不但加速自身代谢，而且可加速其他合用药物代谢的肝药酶诱导剂是

- A: 地西泮
- B: 唑吡坦
- C: 佐匹克隆
- D: 苯巴比妥

答案：D

70. 人体内缺乏维生素 E 时会导致()

- A: 脚气病
- B: 夜盲症
- C: 不孕症
- D: 佝偻病

答案：C

71. 止泻药()

- A: 乳果糖
- B: 地芬诺酯
- C: 硫酸镁
- D: 甘油

答案：B

72. 通过分解产生新生态氧而发挥杀菌除臭作用用于治疗痤疮的药物是()

- A: 壬二酸
- B: 过氧苯甲酰

C: 维 A 酸

D: 阿达帕林

答案: B

73. 下列对皮肤真菌感染治疗药叙述错误的是()

A: 阿莫罗芬为唑类的局部抗真菌药

B: 环吡酮胺为吡啶酮类抗真菌药

C: 奈替芬是丙烯胺类抗真菌药

D: 酮康唑为咪唑类抗真菌药

答案: A

74. 存在中度致吐风险的抗肿瘤药物是

A: 卡莫司汀

B: 多西他赛

C: 泼尼松

D: 表柔比星

答案: D

75. 属于单酰胺菌素类，抗菌谱窄，与青霉素、头孢菌素无交叉过敏反应的药物是

A: 特比萘芬

B: 复方磺胺甲噁唑

C: 氨曲南

D: 卡泊芬净

答案: C

76. 以下属于胰高糖素样肽-1 受体激动剂的是

A: 利拉鲁肽

B: 吡格列酮

C: 瑞格列奈

D: 二甲双胍

答案: A

77. 有明显耳毒性的药物是()

A: 四环素

B: 青霉素

C: 磺胺嘧啶

D: 链霉素

答案: D

78. 对 I 型和 II 型单纯疱疹病毒作用最强的是

A: 奥司他韦

B: 阿糖腺苷

C: 干扰素

D: 阿昔洛韦

答案: D

79. 首选用于伤寒、副伤寒的是()

A: 克林霉素

B: 青霉素

C: 氯霉素

D: 两性霉素 B

答案: C

80. 甲睾酮的作用不包括哪一项()

A: 抗雌激素作用

- B: 抑制腺垂体分泌促性腺激素
- C: 促进男性性器官的发育与成熟
- D: 抑制蛋白质的合成

答案：D

81. 氨基糖苷类药的主要作用靶点是

- A: 核糖体的 30S 亚基
- B: 核糖体的 50S 亚基
- C: 细胞壁丙氨酰丙氨酸
- D: 细胞内膜 PBP

答案：A

82. 具有抑制胃酸分泌作用的药物是

- A: 奥美拉唑
- B: 莫沙必利
- C: 碳酸氢钠
- D: 西沙必利

答案：A

83. 避免同时使用“蜡质”脱毛方法的药物()

- A: 维 A 酸
- B: 阿达帕林
- C: 壬二酸
- D: 异维 A 酸

答案：B

84. 用于抢救肝素所致严重出血的药物是

- A: 亚叶酸钙

B: 对羧基苄胺

C: 维生素 K

D: 硫酸鱼精蛋白

答案：D

85. 硫脲类药物的基本作用是

A: 抑制 Na^+-K^+ 泵

B: 抑制甲状腺蛋白水解酶

C: 抑制碘泵

D: 抑制甲状腺过氧化酶

答案：D

86. 他昔莫芬为前药，主要在肝脏经肝药酶代谢，该肝药酶是

A: CYP2C19

B: CYP286

C: CYP3A4

D: CYP2D6

答案：D

87. 可引起眼睛疼痛不适的是

A: 乙酰半胱氨酸

B: 氨溴索

C: 异丙托溴铵

D: 茶碱

答案：C

专业《执业药师之西药学专业二》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。

如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/928122014044007022>