

地理标志产品 阿拉善蒙古牛

1 范围

本文件规定了阿拉善蒙古牛的保护范围、保护地域、自然生态环境、品种特征特性、体型外貌、生产性能。

本文件适用于阿拉善蒙古牛的品种鉴定、等级评定及品种登记。

2 规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

3 术语和定义

本文件没有界定的术语和定义。

4 保护范围

地理坐标东经 $97^{\circ}10' \sim 106^{\circ}52'$ 和北纬 $37^{\circ}21' \sim 42^{\circ}47'$,保护范围覆盖面积27万 Km^2 。

5 保护地域

阿拉善盟3旗3区22个乡镇、137个嘎查。

6 品种、外貌特征

6.1 品种特征

阿拉善蒙古牛属于地方良种肉牛，牛肉品质和风味独特，体质强健，具有适应性强，抗风沙、耐旱耐寒、耐粗饲和粗放管理、生产性能高、抓膘能力强、抗病能力强、遗传性能稳定等特点。

阿拉善蒙古牛体型偏小，属于小型肉牛品种。体躯小，呈长方形，头方而粗糙，颈部长短适中，下垂肉不发达，四肢健壮而较短，体质结实紧凑。

6.2 体型外貌

阿拉善蒙古牛毛色多样化，有黑色、黄褐色、红棕色、黧色、黄花白、黑花白纹，有的头部白色或有花斑、尾梢、四肢和腹部为白色等。阿拉善蒙古牛头短宽而粗重，眼眶隆起，眼大而有神，大部分牛角长，向上前方弯曲；额宽，额部与面部长度较相同，角间额部顶端较短，角间中部向下的枕骨部凹陷有沟；额顶部正中中线凹陷至眼眶间额部；额部与鼻梁接触部凹陷。部分公牛无角。颈短薄，垂皮不发达。

髻甲低平，背腰平直，胸部向前突出、宽而深，肋开张良好。四肢短，后腿肌肉发达，蹄质坚实。前躯发育比后躯好，后躯短窄、尻斜。腹大而圆。

6.2.1 外貌鉴定

包括整体结构、体躯、泌乳系统与生殖系统、四肢四部分，采用百分制表示。外貌鉴定评分标准见表1。

表 1 外貌鉴定评分标准

单位：分

项目	外貌特征标准	公牛 满分	母牛 满分
整体结构	整体结构偏小而呈长方正，头方而粗糙，颈部长短适中，下垂肉不发达，四肢健壮而较短，体质属于结实型紧凑型。毛色为黑色或棕（黄）色。	25	20
头部特征	头短宽而粗重。眼眶隆起，眼大而有神。牛角长，向上前方弯曲，颜色蜡黄或青紫色。颈短薄，垂皮不发达。额宽、额部与面部长度较相同。角间额部顶端较短。角间中部向下的枕骨部凹陷有沟。额顶部正中中线凹陷至眼眶间额部。额部与鼻梁接触部凹陷。部分牛无角。	25	20
体 躯	髻甲低平，背腰平直，胸部向前突出、宽而深，后肋开张良好。前躯发育比后躯好，部分牛后躯短窄而斜。后腿肌肉发达。腹大而圆。	20	20
泌乳系统 生殖系统	母牛乳房适中，乳头均匀。 公牛睾丸发育良好，有弹性，左右匀称。	20	30
四 肢	肢势端正，运步灵活有力，系部健强，蹄形正，蹄质坚实。	10	10

6.2.2 外貌评定

分特级、一级和二级3个等级，外貌评定等级见表2。

表 2 外貌评定等级表

等级 \ 性别	公	母
特级	≥ 85	≥ 80
一级	≥ 80	≥ 75
二级	≥ 75	≥ 70

6.3 体重体尺

6.3.1 各年龄牛体重评级指标（见表 3）

表 3 各年龄牛体重评级指标

性别	年龄	体重/kg		
		特级	一级	二级
公	6 月龄	特级 ≥ 100	80 $\leq$ 1 级 <100	<80
	12 月龄	特级 ≥ 120	100 $\leq$ 1 级 <120	<100
	36 月龄	特级 ≥ 230	150 $\leq$ 1 级 <230	<150
母	6 月龄	特级 ≥ 90	70 $\leq$ 1 级 <90	<70
	12 月龄	特级 ≥ 110	90 $\leq$ 1 级 <110	<90
	24 月龄	特级 ≥ 180	160 $\leq$ 1 级 <180	<160

6.3.2 各年龄牛体尺最低指标（见表 4）

表 4 各年龄牛体尺最低指标

性别	等级	12 月龄				24 月龄				36 月龄			
		体高 cm	体斜 长 cm	胸围 cm	管围 cm	体高 cm	体斜 长 cm	胸围 cm	管围 cm	体高 cm	体斜 长 cm	胸围 cm	管围 cm
公	特级	≥ 95	≥ 110	≥ 125	≥ 13	--	--	--	--	≥ 105	≥ 125	≥ 150	≥ 15
	一级	≥ 90	≥ 105	≥ 120	≥ 12	--	--	--	--	≥ 100	≥ 115	≥ 145	≥ 14.5
	二级	≥ 85	≥ 100	≥ 115	≥ 11	--	--	--	--	≥ 95	≥ 105	≥ 140	≥ 14
母	特级	≥ 90	≥ 100	≥ 115	≥ 13	≥ 105	≥ 125	≥ 150	≥ 16	--	--	--	--
	一级	≥ 85	≥ 95	≥ 110	≥ 12	≥ 100	≥ 120	≥ 140	≥ 15	--	--	--	--
	二级	≥ 80	≥ 90	≥ 105	≥ 11	≥ 95	≥ 115	≥ 130	≥ 14	--	--	--	--

6.3.3 综合等级评定指标（见表 5）

表 5 综合等级评定指标

单项等级	综合等级	单项等级	综合等级
特特特	特	特二二	二
特特一	特	一一一	一
特特二	一	一一二	一
特一一	一	一二二	二
特一二	一	二二二	二

7 生产性能

7.1 产肉性能

在自然放牧条件下，成年公牛屠宰率、净肉率分别为41.0% ~ 55.9%和32.9% ~ 41.1%，成年母牛屠宰率、净肉率分别为38.7% ~ 53.3%和23.7% ~ 40%。

7.2 繁殖性能

在自然放牧条件下，母牛补配年龄为24月龄，利用年限可达10年；发情周期为18d ~ 22d；妊娠期为284d。公牛一般30月龄开始配种。

附 录 A

(资料性)

阿拉善蒙古牛图片



图 A. 1 公牛正面照



图 A. 2 公牛后面照



图 A. 3 公牛侧面照

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/935112121304011321>