



主要诊疗选择



(一) 主要诊疗的选择原则

世界卫生组织和我国卫生部**要求**，当就诊者存在着一种以上的疾病、损伤或情况时，需选择其中的一种**主要诊疗**进行分类统计。



选择主要诊疗的意义

- ❖ 经过主要诊疗的编码和统计，能够形成医院住院病人的**疾病谱**，进而形成地域或国家的住院病人疾病谱。即主要诊疗的正确选择，从医院方面来讲，有**管理方面**的意义；从卫生部来讲，这些数据应有**流行病学**的意义，为其宏观管理提供基础数据。根据世界卫生组织对于主要诊疗选择原则的提议，各国或多或少地做了修改。

卫生部有关修订住院病案首页的告知

卫医政发〔2023〕84号

- 各省、自治区、直辖市卫生厅局，新疆生产建设兵团卫生局：
- 为进一步提升医疗机构科学化、规范化、精细化、信息化管理水平，加强医疗质量管理与控制工作，完善病案管理，为付费方式改革提供技术基础，我部组织教授对2023年下发的住院病案首页进行了修订，现印发给你们，请于2023年1月1日开始施行（可从卫生部网站下载）。

病历首页数据

1. 病人的基本情况：或称为病人的基本信息。
2. 医疗信息：主要为诊疗及手术操作。
3. 主要的统计和管理信息：主要是财务数据及管理项目指标。



病历首页数据轻易出现的问题

1

漏项

缺项

填写不精确

2

主要诊疗、手术
操作选择错误

其他诊疗漏填

其他手术及操作项目
漏填、乱填

3

医师署名、科室
及亚科漏项、缺
项、填写不精确
其他管理项目漏
填、不精确等





❖ 对病例主要诊疗的指定，应由医治病人的**临床医师**负责填写于病案首页主要诊疗栏内（列为第一条），因为医师直接负责疾病的诊治，所以一般情况下要尊重医师对主要诊疗的指定。若发觉医师指定不当，只要有可能应退还负责医师改正；假如不能，**编码统计人员**应根据主要诊疗选择原则予以修正。



❖ 住院病人情况很复杂，有因疾病就医，也有因创伤或中毒就医，也有因康复性治疗或疑诊而住院观察等等。鉴于临床情况复杂多样，目前医师书写诊疗又还未到达规范化要求，为了便于编码统计人员选准主要诊疗，根据ICD-10主要诊疗选择原则，结合我国医院住院病人疾病分类统计报表，制定了下列主要诊疗选择措施。详细应用时，各条目按普遍与特殊相结合的原则，后条受前面有关条目的制约。

1. 总则:

1

对患者健康危害最大

2

消耗医疗资源最多

3

住院时间最长





下列为细则：

2. 对于复杂诊疗的主要诊疗选择，假如病因诊疗能够涉及一般的临床体现，则选择**病因**诊疗。假如出现的临床症状不是病因的常规体现，而是疾病某种严重的后果，是疾病发展的某个阶段，那么要选择这个**主要的临床体现**为主要诊疗，但不选择疾病的**终末情况**，如呼吸循环衰竭作为主要诊疗。



**例1： 高血压动脉硬化性心脏病
心律不齐**

❖ 选择： 高血压动脉硬化性心脏病

**例2： 冠状动脉粥样硬化性心脏病
急性膈面正后壁心肌梗死**

❖ 选择： 急性膈面正后壁心肌梗死



例3：老年性慢性支气管炎急性感染
支气管哮喘
肺心病

❖ 选择：老年性慢性支气管炎急性感染，分类于J44.0
慢性阻塞性肺病，伴有急性下呼吸道感染。

例4：老年性慢性支气管炎
支气管哮喘
肺心病

❖ 选择：肺心病



3. 对已治和未治疗的疾病，选择已治的疾病为主要诊疗。

例1：急性胃肠炎（已治）

 高血压性心脏病（未治）

❖ 选择：急性胃肠炎

例2：重症肌无力（未治）

 流行性感冒（已治）

❖ 选择：流行性感冒



4. 病人因为某些症状或体征或异常检验成果而住院，治疗结束时仍未能确诊，那么症状、体征或异常发觉可作为主要诊疗。

例1：发烧

❖ 选择：发烧

例2：血红蛋白尿

❖ 选择：血红蛋白尿



5. 因怀疑诊疗住院，在出院时仍没有确诊，怀疑诊疗要按肯定诊疗编码，而且可作为主要诊疗。而经检验后排除的可能情况要分类到Z03.-（对可疑疾病和情况的医疗观察与评价）。

例1：急性胆囊炎待除外 选择：**急性胆囊炎**

例2：可疑肺癌 - 已排除 选择：**可疑恶性肿瘤的观察**

对于例1，急性胆囊炎待除外的诊疗，虽然在编码时按肯定情况分类，但在做索引时必须用某种方式表白它不是肯定诊疗，这么在检索时才干与其他肯定诊疗的病例区别开来。



6.当多种诊疗没有一种更为突出，而多诊疗又可分类到一种被称为“多发……”的类目时，选择“多发……”类目的编码为主要编码，而对所列出的逐一情况可加用附加编码。这的编码主要用于与HIV 病有关的情况以及损伤和后遗症。



例1：HIV病毒引起的分枝杆菌感染、脑病和卡波西肉瘤

- ❖ 选择：HIV病造成的分类于他处的多发性疾病为主要编码，对HIV病毒引起的分枝杆菌感染，HIV病毒引起的脑病和HIV病毒引起的卡波西肉瘤还要逐一编码，但作为附加编码。

例2：头、颈部擦伤

- ❖ 选择：选择头、颈部擦伤为主要编码，分别还要对头部擦伤和颈部擦伤编码，作为附加编码。



7. 当两个疾病或一种疾病伴有有关的并发症有合并编码时，就要选择合并编码作为主要编码，不能将其分开编码。

例1：肾衰竭

 高血压性肾病

❖ 选择：高血压肾病伴有肾衰竭

例2：慢性胆囊炎

 胆总管结石

❖ 选择：慢性胆囊炎伴有胆总管结石

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/935120321312011323>