

2023 年-2024 年主治医师之全科医学 301 精选试题 及答案二

单选题（共 45 题）

1、头痛伴剧烈呕吐

- A. 颅内压增高
- B. 椎-基底动脉供血不足
- C. 青光眼
- D. 蛛网膜下腔出血
- E. 神经功能性头痛

【答案】 A

2、出自杨泉的话是()

- A. “夫医者，非仁爱之士，不可托也；非聪明理达，不可任也；非廉洁淳厚，不可信也。”
- B. “无恒德者，不可以做医，人命生死之所系”
- C. “一存仁心，……二通儒道，……三精脉理，……四识病原，……十勿重利。”
- D. “人命至重，有贵千金，一方济之，德逾于此”
- E. “不为良相，愿为良医”

【答案】 A

3、男性，50 岁，患皮肤病 10 余年，反复发作，累及全身。躯干及四肢伸侧分布大小不一的红斑，绿豆大小，斑片状，肘、膝、腰、骶尾部更为明显，皮损边界清楚，红斑表面覆有分层云母样鳞屑；鳞屑易剥除，下方呈发亮淡红色薄膜状及点状出血。头皮皮损表面有较厚鳞屑，头发成束。手足甲呈凹陷点，甲床肥厚

- A. Stevens-Johnson 综合征
- B. Ramsay-Hunt 综合征
- C. Auspitz 征
- D. GREST 综合征
- E. Gottron 征

【答案】 C

4、肥胖是指体重超过标准体重的

- A. 10%
- B. 20%
- C. 5%
- D. 25%
- E. 15%

【答案】 B

5、在病例-对照研究中，病例组有暴露于危险因素的比例显著高于对照组，可认为

- A. 危险因素是该病的原因
- B. 危险因素与疾病有因果联系
- C. 该病与危险因素存在联系
- D. 该疾病与危险因素无关
- E. 危险因素的重要性

【答案】 C

6、结节性甲状腺肿的手术适应证中，下列哪项是不恰当的

- A. 病史较长
- B. 怀疑恶变
- C. 伴有压迫症状
- D. 伴有功能亢进
- E. 胸骨后甲状腺肿

【答案】 A

7、对缺血性脑血管疾病急救时应注意

- A. 保持病人安静，给予升压药物
- B. 保持病人安静，给予快速降压药物
- C. 保持病人安静，给予降压药物
- D. 保持病人安静，调整血压，给脑血管扩容剂
- E. 避免情绪激动，调整血压，给脑血管扩容剂

【答案】 D

8、男性 30 岁患者，发热伴牙龈出血 3 周。查体：皮肤黏膜苍白，有出血点，浅淋巴结未触及，肝右肋下 3cm，脾左肋下 2cm。骨髓检查：增生极度活跃，可见原始粒细胞 90%，过氧化酶染色阳性，未见 Auer 小体。初步诊断为

- A. 急性淋巴细胞白血病
- B. 急性非淋巴细胞白血病
- C. 慢性粒细胞白血病慢性期
- D. 慢性淋巴细胞白血病
- E. 骨髓异常增生综合征

【答案】 B

9、真性糖尿病性白内障的临床特征不包括

- A. 年龄较轻，多发生在 30 岁以下
- B. 双眼发病、进展迅速
- C. 晶状体呈雪花样混浊或点状混浊
- D. 伴有屈光变化
- E. 术前要控制血糖

【答案】 D

10、腰椎间盘突出患者拾地下物品时，应采用哪种方式

- A. 弯腰直取
- B. 屈髋弯腰
- C. 先屈膝，再屈髋下蹲式
- D. 先弯腰，再屈膝下蹲式
- E. 以上方式均不对

【答案】 C

11、患者，男，66 岁。患者昏迷，病历不详，巩膜轻度黄染，瞳孔等大，肌张力及腱反射亢进，无偏瘫，血糖 100mg/dl，血尿素氮 20mg/dl，血清白蛋白 2.0g/dl，球蛋白 3.0g/dl，最可能的诊断是

- A. 肝性昏迷
- B. 糖尿病昏迷
- C. 尿毒症昏迷
- D. 安眠药中毒
- E. 脑血管意外

【答案】 A

12、指合格药品在正常用法用量下出现的与用药目的无关或意外的有害反应是

- A. 药品不良反应
- B. 药品不良事件
- C. 药品严重不良反应 / 事件
- D. 新的药品不良反应
- E. 药品突发性群体不良反应 / 事件

【答案】 A

13、初产妇，40 孕周临产，子宫颈口已开全 3 小时，头盆不称，持续下腹痛、血尿，子宫下段压痛，缩复环高达脐平面，胎心率 160 次/分，不规则。首选措施是

- A. 产钳助产
- B. 胎头吸引助产
- C. 静滴缩宫素
- D. 剖宫产
- E. 肌注阿托品

【答案】 D

14、对于家庭权力结构表述恰当的是

- A. 家庭权力结构反映了家庭成员的位置
- B. 家庭权力结构可分为四种类型
- C. 家庭权力结构是家庭结构中最重要
- D. 家庭权力结构一般是固定的

E. 家庭权力结构不受情感因素影响

【答案】 B

15、治疗牙龈炎的首选方法是

A. 正确选用敏感抗生素

B. 消除牙石

C. 拔除附近病变牙齿

D. 注意保持口腔卫生

E. A+B+D

【答案】 B

16、男性，23岁，感冒后发热、咽痛，吞咽时咽痛加剧4天。检查：双侧扁桃体充血、肿大，腺窝口有黄白色脓性分泌物，易拭去。颌下淋巴结肿大、压痛。最可能的诊断是

A. 急性会厌炎

B. 急性喉炎

C. 急性扁桃体炎

D. 急性咽炎

E. 扁桃体周围脓肿

【答案】 C

17、下列哪项是封闭式问题的缺点

A. 填答简单

B. 应答率高

C. 在调查中无法得到更多的答案以外的丰富资料

- D. 便于统计分析
- E. 适用范围较广

【答案】 C

18、流行病学实验的双盲法是指

- A. 研究对象和负责分组及照顾病人的医师不知道试验分组情况
- B. 研究对象和资料收集及分析人员不知道试验分组情况
- C. 研究对象和试验设计者不知道试验分组情况
- D. 试验设计者和负责分组及照顾病人的医师不知道试验分组情况
- E. 以上均不正确

【答案】 A

19、全科医学与社区卫生服务的关系可以体现为

- A. 发展全科医学教育，培养全科医生
- B. 全科医疗是社区卫生服务的最佳服务模式，全科医生是社区卫生服务的主力军
- C. 全科医生在工作中应了解替代医学的知识，也应看到替代医学的局限性
- D. 发展社区护理
- E. 全科医生在工作中应充分掌握替代医学的方法，为患者提供及时的服务

【答案】 B

20、正常情况下儿童乳牙出齐的年龄为

- A. 2 岁
- B. 2 岁 3 个月

C. 2 岁 6 个月

D. 2 岁 9 个月

E. 3 岁

【答案】 C

21、患者，男性，28 岁。1 周前有牙痛病史，继而患“感冒”，出现畏寒、寒战、高热、胸痛、咳嗽，咳脓痰。查体：T39℃，呼吸急促，呈急性热病容，心肺查体未见异常，血常规：WBC 19×10^9 / L，中性粒细胞 90%。

A. CT 检查

B. 胸部 B 超

C. 痰培养

D. 支气管镜检查

E. 支气管造影

【答案】 C

22、属于医学伦理学基本范畴的是

A. 为病人保守医密

B. 有利、不伤害

C. 权利、义务

D. 按章办事

E. 医乃仁术

【答案】 C

23、已知男性的钩虫感染率高于女性。今比较甲、乙两乡居民的钩虫感染率，但甲乡人口女多于男，而乙乡人口男多于女。

- A. 资料的相对比应注意可比性
- B. 对样本率的比较应遵循随机抽样，要作假设检验
- C. 观察单位数不等的几个率，不能直接相加求其平均率
- D. 计算时分母不宜过小
- E. 分析时不能以构成比代替率

【答案】 A

24、男，12岁，发热10天，体温38~39.5℃，刺激性咳嗽明显，胸痛。查体：双肺散在干啰音，胸片：左肺下野淡薄片状阴影。为确诊，首选的检查是

- A. 血培养
- B. 结核菌素试验
- C. 冷凝集试验
- D. 血肥达氏反应
- E. 痰液病毒分离

【答案】 C

25、麻疹的皮疹为

- A. 红色瘀斑样皮疹
- B. 红色丘疹
- C. 红色斑丘疹
- D. 出血性皮疹
- E. 荨麻疹样皮疹

【答案】 C

26、辛伐他汀属于

- A. 主要降低血甘油三酯，也降低血胆固醇的药物
- B. 主要降低血胆固醇，也降低血甘油三酯的药物
- C. 降低 LDL 的药物
- D. 降低血总胆固醇的药物
- E. 降低 HDL 的药物

【答案】 B

27、肺炎球菌肺炎抗生素治疗停药指征是

- A. 热退停药
- B. 热退 3 天
- C. 热退 7 天
- D. 临床症状、体征消失
- E. 胸片炎变消退

【答案】 B

28、男性患者，28 岁，发现高血压半年，因头痛，多汗、烦躁，伴心悸、气促来院急诊，诊断为高血压危象，处理后血压降至 125/80mmHg，症状消失，嘱患者应

- A. 长期服降压药治疗
- B. 继续服药，查明病因
- C. 低钠饮食，注意休息，不用药
- D. 随访并根据血压高低间歇用药
- E. 血压稳定后可以停药

【答案】 B

29、患者，男性，25岁。发热 38.5℃，咳嗽，咳黄痰 1 周，左下肺闻及湿性啰音。

- A. 血常规
- B. 尿常规
- C. 胸片或胸透
- D. 气管镜
- E. 头颅 CT 或鼻窦 X 线片

【答案】 C

30、胃食管反流病

- A. X 线食管吞钡检查所见
- B. 未见明显 X 线改变
- C. 食管狭窄与正常食管段过渡、边缘整齐、无钡影残缺征
- D. 食管中下段可见虫样或蚯蚓样充盈缺损
- E. 食管不规则狭窄、充盈缺损，管壁蠕动消失，黏膜紊乱

【答案】 A

31、 9 岁女孩，咳嗽 3 周，眼睑水肿 3 天，尿量减少，尿色发红，查体 T37.5℃，咽部充血，心肺正常，血压 20/12kPa(150/90mmHg)。血 WBC $11.0 \times 10^9/L$

- A. 降血压利尿剂
- B. 暂不予特殊处理，临床观察
- C. 每日泼尼松 2mg/kg，分次服
- D. 口服抗生素
- E. 酚磺乙胺

【答案】 A

32、结核性腹膜炎

- A. 漏出液
- B. 浆液性渗出液
- C. 血性渗出液
- D. 乳糜性渗出液
- E. 脓性渗出液

【答案】 B

33、上消化道大出血最常见的病因是

- A. 糜烂性出血性胃炎
- B. 食管贲门黏膜撕裂征
- C. 消化性溃疡
- D. 肝硬化食管静脉曲张破裂
- E. 胃癌

【答案】 C

34、男孩 9 岁。1 天前进食简单冲洗后的瓜果。今日出现腹痛腹泻，伴里急后重，体温 38.7℃。查血常规白细胞 $11 \times 10^9/L$

- A. 食物中毒
- B. 病毒性肠炎
- C. 细菌性痢疾
- D. 霍乱

E. 肠伤寒

【答案】 C

35、女性患者，67岁，有2型糖尿病五年，血压180/80毫米汞柱，心率60次/分。

A. 呋塞米

B. 雅思达

C. 螺内酯

D. 氢氯噻嗪

E. 美托洛尔

【答案】 D

36、为预防牙颌畸形，人工哺乳时婴儿较合适的体位是

A. 平卧位

B. 坐位

C. 半坐位

D. 侧卧位

E. 以上均不是

【答案】 C

37、下列哪种皮肤病无痒感

A. 疥疮

B. 慢性单纯性苔藓

C. 过敏性皮炎

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/935243014313011340>