

医院感染预防与控制知识考试题及答案

第一篇：医院感染预防与控制知识考试题及答案

医院感染基础知识试题

一、单选题：（每题 2 分，共 60 分）

1、床单位首选消毒方法为（ ）

- A、日光曝晒
- B、紫外线照射消毒
- C、床单位臭氧消毒机消毒
- D、甲醛薰蒸

2、手术器械、腹腔镜、膀胱镜、导尿管、口腔科牙钻、输液器械、输血器按医用物品的危险度应属于（ ） A、高度危险用品 B、中度危险用品 C、低危险用品

3、卫生手消毒效果应达到的要求是（ ）

- A、细菌数应 $\leq 10\text{cfu/cm}^2$
- B、细菌数应 $\leq 5\text{cfu/cm}^2$
- C、细菌数应 $\leq 1\text{cfu/cm}^2$ 。

4、医院不合理用药情况主要表现为：（ ）

- A、过度使用抗菌药物
- B、不适当的联合用药
- C、无适应证或适应证不明确
- D、以上都是

5、医疗机构收治的隔离传染病病人或者疑似传染病病人产生的生活垃圾属于什么废物？（ ） A、病理性废物

- B、严重污染性废物
- C、生活垃圾
- D、感染性废物

6、凡进入人体无菌组织、器官或经外科切口进入人体无菌腔室的内镜及附件必须达到什么要求？（ ）

- A、消毒要求
- B、灭菌要求
- C、高水平消毒

D、中水平消毒

7、胃镜、肠镜、十二指肠镜采用 2%碱性戊二醛消毒时，浸泡时间为多少？（ ） A、不少于 60 分钟

B、不少于 30 分钟 C、不少于 20 分钟

D、不少于 10 分钟

8、《内镜清洗消毒技术操作规范》中规定，吸引瓶、吸引管清洗后，进行消毒的药物、剂量和方法是（ ）

A、有效氯含量为 500mg/L 的含氯消毒剂或 2000mg/L 的过氧乙酸浸泡消毒 30 分钟； B、有效氯含量为 500mg/L 的含氯消毒剂或 2000mg/L 的过氧乙酸浸泡消毒 20 分钟； C、有效氯含量为 500mg/L 的含氯消毒剂或 2000mg/L 的过氧乙酸浸泡消毒 10 分钟； D、有效氯含量为 250mg/L 的含氯消毒剂或 1000mg/L 的过氧乙酸浸泡消毒 30 分钟。

9、被 HBV 阳性病人血液、体液污染的锐器刺伤,应在（ ）小时内注射乙肝免疫高价球蛋白, 同时进行 科室姓名分数

血液乙肝标志物检查：

A、6 小时

B、12 小时

C、24 小时

D、48 小时

10、下列哪种手术宜预防性应用抗生素（ ） A、疝修补术

B、甲状腺腺瘤摘除术 C、乳房纤维腺瘤切除术

D、开放性骨折清创内固定术

11、医院各类环境的空气中、物体表面、医务人员手的检测均不得检出：（ ） A、乙型溶血性链球菌

B、沙门氏菌

C、埃希氏菌

D、致病性微生物

12、多重耐药菌患者采取的隔离措施是（ ）

A、标准预防+ 空气传播

- B、标准预防+ 飞沫传播 C、标准预防+ 接触传播
- D、标准预防+ 严密隔离

13、如果血培养标本不能及时运送，应暂存于何种（ ） A、4℃

B、-18℃

C、室温

14、能发生血源感染的医疗侵入性操作有（ ）

A、血液透析

B、器官移植

C、内窥镜检查

D、拔牙

E、以上都对

15、按照《医院感染暴发报告及处置管理规范》要求，当出现 5 例以上疑似医院感染暴发；3 例以上医院感染暴发，医院应当于几小时内向所在地县级卫生行政部门报告，并同时向所在地疾病预防控制机构报告（ ）

A、2

B、12

C、24

D、48

16、预防性用药应当在发生艾滋病病毒职业暴露后尽早开始，最好在几小时内实施，最迟不得超过 24 小时（ ）

A、2 小时

B、4 小时

C、6 小时

D、12 小时

17、呼吸机相关性肺炎（VAP）预防与控制措施不正确的是（ ）

A、严格掌握气管插管或气管切开的适应症

B、吸痰时严格无菌操作，医务人员为病人吸痰前后应做手卫生 C、呼吸机螺纹管和湿化器每天更换

D、每天停用镇静剂，评估是否撤机和拔管，减少插管天数

18、抽出的药液，开启的静脉输入用无菌液体，与启封抽吸的各种溶媒，有效期分别为（ ） A、1 小时、12 小时

B、1 小时、24 小时 C、2 小时、24 小时

D、2 小时、36 小时

19、根据《医院感染诊断标准》规定，无植入物手术后多少天发生的感染不能诊断为手术切口感染（ ）

A、10 天以后

B、20 天以后

C、30 天以后 20、下列情况何种是预防用药的适应（ ）

A、昏迷

B、中毒

C、上呼吸道感染

D、人工关节移植手术

21、盛装的医疗废物达到包装物或者容器的多少时，应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密。（ ）

A、4/5 时 B、3/4 时

C、2/3 时

D、3/5 时

22、实现安全注射的措施有哪些？（ ） A、改善病人和医护人员的行为。B、提供安全注射装置和容器。C、损伤性废物管理。

D、以上都对

23、各种治疗、护理及换药操作次序应为（ ） A、清洁伤口-感染伤口-隔离伤口

B、感染伤口-隔离伤口-清洁伤口 C、清洁伤口-隔离伤口-感染伤口 D、隔离伤口-感染伤口-清洁伤口

24、甲类、乙类、丙类传染病的报告时限是（ ） A、2、6、24 小时

B、6、12、24 小时

C、12、24、48 小时

25、接触皮肤、粘膜的医疗器械、器具和物品必须达到何种水平

()

- A、灭菌
- B、消毒
- C、清洁
- D、擦拭

26、对病室内的空气及地面应采取的措施包括 ()

- A、定时通风换气，必要时空气消毒；地面湿式清扫，遇污染时消毒
- B、定时空气消毒，必要时通风换气；地面干式清扫，遇污染时清洁
- C、定时通风换气，必要时空气消毒；地面干式清洁，遇污染时清扫
- D、定时空气消毒，必要时通风换气；地面湿式清扫，遇污染时消毒

27、透析管路预冲后必须几小时内使用，否则要重新预冲 () A、2 小时

- B、3 小时
- C、4 小时
- D、5 小时

28、医务人员被 HBsAg 阳性血污染的针头刺伤后，应定期进行乙型肝炎血清学检查多长时间 () A、3 至 5 个月

- B、6 至 9 个月
- C、半年至 1 年
- D、1 至 2 年

29、隔离病室应有隔离标志，空气传播、飞沫传播、接触传播的隔离标志分别为 () A、粉色、黄色、蓝色

- B、粉色、蓝色、黄色
- C、黄色、粉色、蓝色
- D、蓝色、粉色、黄色

30、某医务人员违反《医疗废物管理条例》规定，将污染针头放入感染性废物包装袋内，造成他人刺伤而感染了血源传播性疾病，该医务人员应依法承担什么责任？ ()

- A、刑事责任
- B、行政处罚
- C、民事责任

D、民事赔偿责任

二、多选题（每题 2 分，共 40 分）

31、血液透析室应开展哪些透析用水的水质监测项目（ ）A、PH 值

B、细菌总数及内毒素

C、化学污染物

D、软水硬度

E、游离氯

32、根据医疗废物分类目录，医疗废物分为：（ ）A、病理性废物

B、感染性废物

C、损伤性废物

D、化学性废物

E、药物性废物

33、对医疗废物收集的要求（ ）

A、各类医疗废物应分类收集，不能混合。

B、少量的药物性废物可以混入感染性废物中，但应当在标签上注明。
C、禁止将医疗废物混入生活垃圾。

D、病原体培养基、毒种保存液等高危险废物，应当先在产生地点消毒后，再按感染性废物处理。

34、手术切口感染常见的原因有（ ）A、未使用抗菌药物 B、术中止血不彻底，缝合留有死腔； C、未严格执行无菌技术； D、病人免疫功能低下；

35、牙科手机机械清洗需要注意的事项正确的是（ ）A、电源马达不应使用机械清洗机清洗

B、牙科手机清洗后内部管路应进行充分干燥 C、牙科手机可与其他口腔器械同时清洗

D、牙科手机不宜选用超声波清洗

36.符合下列条件之一即可临床诊断为血管相关性感染（ ）

A、静脉穿刺部位有脓液排出，或有弥散性红斑(蜂窝组织炎的表

现)。B、沿导管的皮下走行部位出现疼痛性弥散性红斑并除外理化因素所致。C、经血管介入性操作，发热 $>38^{\circ}\text{C}$ ，局部有压痛，无其它原因可解释。D、穿刺部位抽血培养出细菌

37、下列那些情况不属于医院感染？（ ）

A、皮肤粘膜开放性伤口有细菌定植而无炎症表现。B、由于创伤或非生物性因子刺激而产生的炎症表现。

C、新生儿经胎盘获得(出生后 48 小时内发病)的感染，如单纯疱疹、弓形体病、水痘等。D、患者原有的慢性感染在院内急性发作。

38、手足口病的传播途径包括（ ）A、空气传播

B、接触传播 C、飞沫传播

D、饮水传播

39、外科手术预防用药目的（ ）A、预防手术后切口感染 B、手术后手术部位感染

C、术后可能发生的全身性感染 D、促进手术愈合

40、抗菌药物的联合应用要有明确指征，单一药物可有效治疗的感染，不需联合用药，仅在下列情况时有指征联合用药。（ ）

A、原菌尚未查明的严重感染，包括免疫缺陷者的严重感染。

B、单一抗菌药物不能控制的需氧菌及厌氧菌混合感染（2 种或 2 种以上病原菌感染）。C、单一抗菌药物不能有效控制的感染性心内膜炎或败血症等重症感染。

D、需长程治疗，但病原菌易对某些抗菌药物产生耐药性的感染（如结核病、深部真菌病）

41、医疗机构应当加强对多重耐药菌医院感染的控制工作，多重耐药菌包括（ ）A、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌（MRSA）B、耐万古霉素肠球菌（VRE）

C、产超广谱 β -内酰胺酶（ESBLs）

D、沙门氏菌

E、以上都是

42、手卫生包括（ ）

A、洗手

- B、卫生手消毒 C、外科手消毒
- D、消毒剂泡手

43、有效预防和控制多重耐药菌传播的措施主要（ ） A、加强医务人员的手卫生； B、严格实施隔离措施；

C、切实遵守无菌技术操作规程； D、加强医院环境卫生管理。

44、外科手术预防应用抗菌药物适应症是（ ） A、清洁手术范围大、时间长、污染机会增加 B、头颅手术、心脏手术

C、异物植入手术 D、气性坏疽截肢手术

E、高龄或免疫缺陷者手术

45、防止医务人员在诊疗护理活动中发生利器伤的正确做法是（ ） A、利器盒应放在利器使用处，保证针头等离开病人身体后立即放入

B、医生为病人进行穿刺操作后，应把针头一并包入穿刺包内，由护士来处置 C、禁止将使用后的一次性针头重新套上针头套，必须回套时应单手操作 D、禁止用手直接接触使用后的针头、刀片等锐器

46、医务人员发生艾滋病病毒职业暴露后，医疗卫生机构应当给予随访和咨询，随访和咨询时间为（ ）

A、在暴露后的第 2 周 B、在暴露后的第 4 周

C、在暴露后的第 8 周 D、在暴露后的第 12 周 E、暴露后的第 6 个月

47、发生乙型肝炎病毒职业接触后预防措施为（ ） A、接触后预防措施与接种疫苗的状态无关

B、未接种疫苗者，注射乙肝免疫球蛋白和接种乙肝疫苗 C、以前接种过疫苗，已知有抗体者，无需处理；

D、以前接种过疫苗，没有抗体者，注射乙肝免疫球蛋白和接种乙肝疫苗

E、抗体反应未知者进行抗原抗体检测，如检测结果抗体不充分，注射乙肝免疫球蛋白和接种乙肝疫苗

48、以下哪些是属于突发公共卫生事件？（ ） A、新发现重大传染病疫情

B、群体不明原因疾病 C、重大食物中毒

D、重大职业中毒

49、医疗废物每个包装物、容器上应当有中文标签，中文标签的内容应包括：（ ）A、医疗废物产生单位

B、产生日期

C、类别

D、重量或数量

E、处置方法及去向

50、下列哪些措施是预防医院感染的主要措施（ ）A、认真洗手

B、合理使用抗生素 C、严格执行无菌操作

第二篇：医院感染预防与控制知识考试题

医院感染知识考试题

姓名：

专业：

分数：

一、单选题：（每题 0.5 分，共 25 分）

1.医疗机构住院床位总数在（ ）应当设立独立的医院感染管理部门？ A、100 张以上 B、1000 张以上 C、100 张以下 D、50 张以上

2.调查证实出现医院感染流行时，医院应在（ ）内报告当地卫生行政部门 A.12 小时 B.24 小时 C.36 小时 D.48 小时

3、床单位首选消毒方法为（ ）

A、日光曝晒 B、紫外线照射消毒 C、床单位臭氧消毒器消毒 D、甲醛薰蒸 4.各种治疗、护理及换药操作次序应为()A、清洁伤口-感染伤口-隔离伤口 B、感染伤口-隔离伤口-清洁伤口 C、清洁伤口-隔离伤口-感染伤口 D、隔离伤口-感染伤口-清洁伤口

5.置于无菌储槽中的棉球、纱布一经打开，使用时间最长不得超过多少小时？（ ）A、2 小时 B、4 小时 C、8 小时 D、24 小时

6.手术器械、腹腔镜、膀胱镜、导尿管、口腔科牙钻、输液器械、输血器按医用物品的危险度应属于哪一类()A.高度危险用品 B.中度危险用品 C.低危险用品 7.启封抽吸的各种溶酶超过多少小时不得使用？()A、4 小时 B、8 小时 C、24 小时 D、12 小时 8.医院不合理用药情况主要

表现为：() A.过度使用抗菌药物 B.不适当的联合用药 C.无适应证或适应证不明确 D.以上都是

9.医疗活动过程中产生的感染性废物、病理性废物，少量药物性废物应当分别投入以下那种颜色垃圾袋中()A、黄色垃圾袋 B、黑色垃圾袋 C、红色垃圾袋 D、以上都可投 E、以上都不可投

10.医疗活动中用过的医用针、缝合针、备皮刀、手术刀等锐器应投入以下那种颜色容器或垃圾袋()A、黄色垃圾袋 B、黑色垃圾袋 C、红色垃圾袋 D、黄色标志容器盒 E、以上都可投 F、以上都不可投

11.医疗废物的暂时贮存设施、设备，除应设置明显的警告标识外，还应有相关的安全措施是()A、防渗漏 B、防鼠 C、防蚊蝇 D、防蟑螂 E、防盗 F、预防儿童接触 G、以上都是 H、以上都不是 12.世界卫生组织提出的国际洗手日为哪一天？()

A、10月5日 B、10月10日 C、10月15日 D、10月25日

13.盛装医疗废物的每个包装物，容器外表面除应当标有明显警示标志外，还应有相关文字标识，其标识内容有()A、医疗废物产生单位 B、产生日期 C、主要内容物 D、运送目的地及特殊说明 E、以上都是 F、以上都不是

14.对从事医疗废物收集、运送、贮存等工作人员，应配备必要防护用具()A、帽子 B、防护口罩 C、橡胶手套 D、传统胶鞋 E、围裙 F、以上都是 G、以上都不是 15.终末消毒是指()

A、指病人出院、转院或死亡后，对其原居住点的最后一次彻底的消毒 B、指对医院周围环境的彻底消毒 C、指对医院空气进行全面的消毒 D、杀灭或抑制活体组织上微生物的生长繁殖，以防组织感染 16.

《医疗废物分类目录》将医疗废物分几类？() A、3类 B、4类 C、5类 D、6类

17.医疗机构收治的隔离传染病病人或者疑似传染病病人产生的生活垃圾属于什么废物？()

A、病理性废物 B、严重污染性废物 C、生活垃圾 D、感染性废物

18.凡进入人体无菌组织、器官或经外科切口进入人体无菌腔室的内镜及附件必须达到什么要求？()

A、消毒要求 B、灭菌要求 C、高水平消毒 D、中水平消毒 19.胃镜、肠镜、十二指肠镜采用 2%碱性戊二醛消毒时，浸泡时间为多少？

() A、不少于 60 分钟 B、不少于 30 分钟 C、不少于 20 分钟 D、不少于 10 分钟 20.结核杆菌、其他分枝杆菌等特殊患者使用的内镜采用 2%碱性戊二醛消毒时，浸泡时间为多少？()

A、不少于 45 分钟 B、不少于 30 分钟 C、不少于 20 分钟 D、不少于 10 分钟

21、需要灭菌的内镜采用 2%碱性戊二醛灭菌时，浸泡时间为多少？()

A、必须浸泡 5 小时 B、必须浸泡 6 小时 C、必须浸泡 8 小时 D、必须浸泡 10 小时 22.每日诊疗前，必须对当日拟使用的消毒类内镜进行再次消毒。如采用 2%碱性戊二醛浸泡，消毒时间为多少？()

A、不少于 60 分钟 B、不少于 30 分钟 C、不少于 20 分钟 D、不少于 10 分钟

23、《内镜清洗消毒技术操作规范》中规定，吸引瓶、吸引管清洗后，进行消毒的药物、剂量和方法是什么？()

A、有效氯含量为 500mg/的含氯消毒剂或 2000Lmg/L 的过氧乙酸浸泡消毒 10 分钟； B、有效氯含量为 500mg/的含氯消毒剂或 2000Lmg/L 的过氧乙酸浸泡消毒 20 分钟； C、有效氯含量为 500mg/的含氯消毒剂或 2000Lmg/L 的过氧乙酸浸泡消毒 30 分钟； D、有效氯含量为 250mg/的含氯消毒剂或 1000Lmg/L 的过氧乙酸浸泡消毒 30 分钟。 24.活检钳、细胞刷、切开刀、导丝、碎石器、网篮、造影导管、异物钳等内镜附件必须 () A.一用一消毒 B、一用一清洗 C、一用一灭菌 D、一用一除菌

25.《内镜清洗消毒技术操作规范》中规定，内镜储柜内表面或镜房墙壁内表面应光滑、无缝隙、便于清洁，多长时间清洗消毒一次？()

A、每周一次 B、每天一次 C、每三天一次 D、每五天一次 26.《内镜清洗消毒技术操作规范》中规定，医疗机构必须进行内镜消毒灭菌效果监测，对消毒剂浓度监测有何要求？()

A、必须每日定时检测并做好记录 B、必须每天监测 C、对消毒效果有怀疑时进行 D、每日随意监测

27.《内镜清洗消毒技术操作规范》中规定,消毒后的内镜应当多长时间进行生物学检测() A、每 15 天 B、每月 C、每季度 D、每半年

28.被 HBV 阳性病人血液、体液污染的锐器刺伤,应在()小时内注射乙肝免疫高价球蛋白,同时进行血液乙肝标志物检查:

A、6 小时 B、12 小时 C、24 小时 D、48 小时 29.引起医院内感染的致病菌主要是()

A、革兰阳性菌 B、革兰阴性菌 C、真菌 D、支原体 30.在细菌所引起的医院内感染中,以()感染在我国最常见。A、尿路感染 B、术后伤口感染 C、肺部感染 D、皮肤感染 31.下列哪种手术宜预防性应用抗生素()

A、疝修补术 B、甲状腺腺瘤摘除术 C、乳房纤维腺瘤切除术 D、开放性骨折清创内固定术 32.下列哪个不是艾滋病的传播途径:()

A、性接触 B、血、血制品、器官移植和污染的注射器 C、蚊虫叮咬 D、母婴垂直传播

33.2002 年版《消毒技术规范》自何时实施?()

A、2002 年 12 月 1 日 B、2003 年 1 月 1 日 C、2003 年 4 月 1 日 D、2003 年 5 月 1 日 34.仅可杀灭分枝杆菌、真菌、病毒及细菌繁殖体等微生物,达到消毒要求的是什么消毒剂?()

A、高效消毒剂 B、中效消毒剂 C、低效消毒剂 D、广谱消毒剂 35.仅可杀灭细菌繁殖体,达到消毒要求的是什么消毒剂?()

A、高效消毒剂 B、中效消毒剂 C、低效消毒剂 D、广谱消毒剂 36.微生物对消毒因子的敏感性从高到低的顺序是什么?() A、亲脂病毒、细菌繁殖体、亲水病毒、真菌、细菌芽孢、朊毒 B、亲脂病毒、细菌繁殖体、真菌、亲水病毒、细菌芽孢、朊毒 C、亲脂病毒、细菌繁殖体、真菌、亲水病毒、朊毒、细菌芽孢 D、细菌繁殖体、亲脂病毒、真菌、亲水病毒、细菌芽孢、朊毒 37.耐高温、耐湿的物品和器材,应首选什么灭菌方法?()

A、干热灭菌 B、环氧乙烷灭菌 C、压力蒸汽灭菌 D、化学消毒剂浸泡灭菌 38.压力蒸汽灭菌器根据排放冷空气的方式和程度不同,分为几大类 () A、两类、B、三类 C、四类 D、五类 39.消毒作用的水平分几级 ()

A、4级 B、3级 C、5级 D、2级 40.常用的消毒方法分几类 ()

A、2类 B、3类 C、4类 D、5类 41.医院感染按其病原体的来源可分为: ()

A、外源性医院感染 B、内源性医院感染 C、外源性医院感染和内源性医院感染 D、交叉感染

42.医院感染的感染源当中最重要的感染源是: ()

A、带菌者 B、已感染的病人 C、环境储源 D、动物感染 43. β -内酰胺类 (青霉素、头孢类) 抗生素的作用机制主要是: ()

A、干扰细菌细胞壁的合成 B、损伤细胞膜 C、影响细菌蛋白质的合成 D、抑制细菌核酸的合成

44.喹诺酮类抗生素的抗菌作用机制主要是: ()

A、干扰细菌细胞壁的合成 B、损伤细胞膜 C、影响细菌蛋白质的合成 D、抑制细菌核酸的合成

45.医院感染的流行方式主要有: ()

A、散发 B、暴发 C.散发和暴发 D、流行和暴发 46.下列选项中关于窗口期的叙述哪项是正确的? ()

A、人体受到病毒感染后,病毒激发人体免疫系统产生抗体,可在血液及其他体液中测出,从患者感染病毒到形成抗体有一个免疫应答过程这一过程所需要的时间 B、人体受到病毒感染后,病毒在体内复制,到出现临床症状的时间 C、人体受到病毒感染后,到出现实验室检查阳性结果的时间

D、人体受到病毒感染后,病毒在体内大量复制,造成组织细胞损伤的时间

47.医院各类环境的空气中、物体表面、医务人员手的检测均不得检出: () A、乙型溶血性链球菌 B、沙门氏菌 C、埃希氏菌 D、致病性微生物 48.医务人员手的卫生学标准是: ()

A、Ⅰ类环境中 $\leq 1\text{cfu}/\text{cm}^2$ B、Ⅱ类环境中 $\leq 5\text{cfu}/\text{cm}^2$ C、Ⅲ类环境中 $\leq 5\text{cfu}/\text{cm}^2$ D、Ⅳ类环境中 $\leq 10\text{cfu}/\text{cm}^2$ 49.普通手术室、产房、供应室无菌区属于几类环境？() A、Ⅰ类环境 B、Ⅱ类环境 C、Ⅲ类环境 D、Ⅳ类环境 50.环境为Ⅱ类区域的空气及工作人员手微生物监测合格的标准分别是：() A、细菌总数 $\leq 10\text{cfu}/\text{m}^3$ 、 $\leq 5\text{cfu}/\text{cm}^2$ B、细菌总数 $\leq 200\text{cfu}/\text{m}^3$ 、 $\leq 5\text{cfu}/\text{cm}^2$ C、细菌总数 $\leq 200\text{cfu}/\text{m}^3$ 、 $\leq 10\text{cfu}/\text{cm}^2$ D、细菌总数 $\leq 500\text{cfu}/\text{m}^3$ 、 $\leq 10\text{cfu}/\text{cm}^2$

二、多选题：(每题1分，共30分)

1.关于皮肤暂居菌的描述正确的是：()

A、机械清洗容易被去除 B、通过直接接触病人或被污染的环境表面获得 C、存活时间较短，会自行消亡 D、具有致病性，与医院感染有很大关系 2.下列哪些措施是预防医院感染的主要措施()： A、认真洗手 B、合理使用抗生素 C、严格执行无菌操作 D、认真落实消毒隔离制度 3.医院感染的易感人群有()：

A、机体免疫功能严重受损者 B、营养不良者

C、老年人 D、长期使用广谱抗菌药物者 4.有效预防和控制多重耐药菌传播的措施主要是：() A、加强医务人员的手卫生 B、严格实施隔离措施 C、切实遵守无菌技术操作规程 D、加强医院环境卫生管理 5.手消毒指征()：

A、进入和离开隔离病房、穿脱隔离衣前后 B、接触特殊感染病原体后 C、接触血液、体液和被污染的物品后 D、接触消毒物品后 6.关于手套戴法描述正确的是：()

A、进行侵入性操作时应当戴无菌手套 B、戴手套前应当洗手

C、摘手套后应当洗手 D、若不是无菌操作不同病人之间可以不换手套 7.常用的过氧乙酸有哪几种剂型？()

A、单元 B、两元 C、三元 D、多元 E、以上都不是 8.下列概念正确的是()

A、杀灭或清除传播媒介上病原微生物，使其达到无害化的处理为消毒； B、杀灭或清除传播媒介上一切微生物的处理为灭菌； C、杀灭或清除传播媒介上一切病原微生物的处理为灭菌； D、抑制传播媒介上病

原微生物的处理为消毒。E、清除传播媒介上病原微生物的处理为消毒。9.下列哪些方法可以达到灭菌（ ）

A、热力 B、洗必泰浸泡 C、甲醛、环氧乙烷气体 D、2%戊二醛浸泡 10.医务人员在消毒工作中应注意哪些个人防护？（ ）

A、干热灭菌时应防止燃烧；压力蒸汽灭菌应防止发生爆炸事故及可能对操作人员造成的灼伤事故；

B、使用紫外线、微波消毒应避免对人体的直接照射； C、避免锐利器械刺、割伤人体；

D、使用气体化学消毒、灭菌剂应防止有毒有害消毒气体的泄漏，经常检测消毒环境中该类气体的浓度,确保在国家规定的安全范围之内；对环氧乙烷气体灭菌剂，还应严防发生燃烧和爆炸事故；

E、使用液体化学消毒、灭菌剂应防止过敏和可能对皮肤、粘膜的损伤。11.消毒因子的作用水平分哪几级？（ ）

A、灭菌 B、高水平消毒法 C、中水平消毒法 D、低水平消毒法 E、除菌 12.常用的压力蒸汽灭菌包装材料有（ ）

A、全棉布 B、一次性无纺布 C、一次性复合材料（如纸塑包装） D、带孔的金属 E、带孔的玻璃容器

13.配置过氧乙酸时应注意哪些问题？（ ）

A、应临用前配置 B、用前测定有效含量 C、用塑料容器 D、戴手套 E、稀释液现用现配 14.碘伏具有以下哪些特点？（ ）

A、刺激性小 B、无腐蚀性（除银、铝和二价汞） C、毒性低 D、稳定性好 E、属中效消毒剂 15.被治疗乙肝病人的锐器刺伤后，常规遵循以下哪几种措施？（ ） A、立即在伤口旁轻轻挤压，尽量挤出伤口处血液，但禁止做伤口的局部挤压 B、肥皂水或流动水冲洗伤口 C、对伤口局部消毒处理 D、若伤者乙肝抗原抗体均阴性时，立即注射乙肝疫苗

16.免疫功能低下病人的医院感染预防，下列哪几项正确？（ ）

A、保护皮肤粘膜的完整性 B、使用广谱抗菌素肠道去污染 C、保护性隔离 D、疫苗注射

17.对血液透析用水进行一次细菌培养，下列不正确的有哪些？（ ）

A.一周 B.一月 C.一季度 D.半年

18.在透析液进入第一台透析机的入口处收集标本，细菌水平描述不正确的有哪些：（ ）

A.200cfu/ml B.500cfu/ml C.1000cfu/ml D.2000cfu/ml 19.下列哪些消毒剂属于灭菌剂（ ）

A.2%戊二醛 B.0.5%过氧乙酸 C.含氯消毒剂 D.75%酒精 20.下列说法不正确的是（ ）

A、不同部位的内镜诊疗可在同一诊室进行；

B、上消化道、下消化道内镜的诊疗工作不能分室进行的，应当分时间段进行；C 医疗机构应设单独的清洗消毒室；

D、不同部位的内镜可以共用同一台设备进行清洗消毒； E、清洗消毒室应当保证通风良好。

21.以下哪些内镜在使用前必须灭菌？()A、膀胱镜 B、关节镜 C、脑室镜 D、腹腔镜 E、宫腔镜 22.进行内镜清洗消毒登记时，主要登记哪些内容？（ ）A、诊疗病人的姓名 B、使用内镜的编号 C、清洗时间 D、消毒时间 E、操作人员姓名

23.《内镜清洗消毒技术操作规范》要求配备的清洗消毒剂有以下哪些？()A、多酶洗液 B、95%乙醇 C、75%乙醇 D、84 消毒液 E、适用于内镜的消毒剂 24.以下哪些物品属于损伤性废物？（ ）

A、载玻片 B、玻璃安瓿 C、医用针头、缝合针 D、备皮刀 E、玻璃试管

25.以下物品属于药物性废物有哪些？（ ）

A、废弃的疫苗、血液制品 B、废弃的免疫抑制剂 C、废弃的可疑致癌性药物 D、废弃的致癌性药物 E、废弃的抗生素、非处方类药品

26.医院感染是指住院病人在医院内获得感染，包括（ ）A、在住院期间发生的感染 B.在医院内获得出院后发生的感染 C.入院前已开始的感染 D.入院时已存在的感染

E.医院工作人员在医院内获得的感染 F.无明确潜伏期入院 48 小时后发生的感染 G.有明确潜伏期的感染，自入院时超过平均潜伏期后发生的感染 H.本次感染直接与上次住院有关的感染 27.引发医院感染暴

发的因素有 ()

A、医务人员携带特殊的耐药菌 B、共用呼吸机治疗 C、使用激素
D、一次性无菌医疗用品污染

28.各种诊疗活动所致的医院感染的传播，常见有以下几种 () A、
血液及血制品 B、输液制品 C、药品及药液 D、诊疗器械和设备 E、一
次性使用无菌医疗用品 29.灭菌后的物品在何种情况下视为已被污染？

()

A、手感潮湿 B、与潮湿物接触 C、在有效期内 D、包装松散 30.
下列哪些措施是预防医院感染的主要措施 ()

A、认真洗手 B、合理使用抗生素 C、严格执行无菌操作 D、消毒
隔离 E、禁止院内吸烟

三、是非题：(每题 0.5 分，共 10 分)

1.医疗卫生机构收治的传染病病人或者疑似传染病病人产生的生
活垃圾，按照医疗废物进行管理和处置。()。

2.自身感染又称外源性感染，其感染源来自病人自身()。

3.手皮肤消毒方法：用清洁剂认真揉搓掌心、指缝、手背、手指
关节、指腹、指尖、拇指、腕部，时间不少于 10-15 秒钟，流动水洗
手()。

4.新生儿在住院 48 小时内出现单纯疱疹，弓形体病、水痘等属于
医院感染()。 5.保护性隔离措施：是指为预防高度易感病人受到来
自其他病人、医务人员、探视者及病区环境中各种致病微生物的感染，
而采取的隔离措施。()

6.高效消毒剂是可杀灭一切微生物(包括细菌、芽胞)使其达到
灭菌要求的制剂。() 7.Ⅰ、Ⅱ类环境要求物体表面的细菌总数
 $\leq 5\text{cfu/cm}^2$ 。()

8.人感染高致病性禽流感是属于乙类法定传染病，流行时按甲类
传染病管理。() 9.目前发现引起手足口病的病原体几乎均为双链
RNA 病毒。()

10.感染手足口病后，可以获得较持久的免疫力，再次感染的机会
少，因此年龄越小越易感染，尤其是 6 月以下的小儿。()

11.医疗卫生机构发生医疗废物流失、泄漏、扩散时，应按照规定
的时限逐级上报卫生行政主管部门。（ ）

12.医院感染暴发是指在医疗机构或者其科室的患者中，短时间内
发生 5 例以上同种同源感染病例的现象。（ ）

13.抗菌药物品种的选用原则上应根据病原菌种类及病原菌对抗菌
药物敏感或耐药，即细菌药物敏感试验的结果而定。（ ）

14.病人一旦被怀疑为 H1N1 流感病毒感染，应马上由家属陪同，
多人监护，并送进医院（ ）。

15.对甲型 H1N1 流感疑似和确诊病例应进行就地隔离治疗，强调
早期治疗。（ ） 16.标准预防是将所有的病人均被视为具有潜在感染性
病人，即认为病人的血液、体液、分泌物、排泄物均具有传染性，必
须进行隔离。（ ） 17.洗手是最简单、经济、有效的预防医院感染方法。
（ ） 18.一次性血液透析器消毒后可重复使用。（ ）

19.艾滋病是由人类免疫缺陷病毒即艾滋病病毒引起的获得性免疫
缺陷综合症（ ）。 20.在盛装医疗废物前，应当对医疗废物包装物或容
器进行认真检查，确保无破损，渗漏和其他缺陷。（ ）

四、名词解释：（每题 1 分，共 10 分）

1、医源性感染：

2、医疗垃圾：

3、二重感染：

4、无菌区：

5、灭菌剂：

6、自然通风：

7、交叉感染：

8、厌氧菌：

9、内毒素：

10、芽孢：

五、简答题：（每题 5 分，共 25 分） 1.医院感染发生的危险因素
有哪些？

2.医疗机构发生以下情形时，应当按照什么要求进行报告？

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/935324210030011341>