北京住院医师儿内科Ⅰ阶段《新生儿专业微信做题》模拟卷

姓名:_____ 年级:_____ 学号:_____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

1、单项选择题：一胎龄 33 周早产儿，顺产。生后 2h 出现呼吸困难，发绀，进行性加重，伴呼气性呻吟。经头罩吸氧无效，诊断为新生儿肺透明膜病。该病的发病机制下述哪项不正确（　）。A.肺表面活性物质缺乏，肺泡萎陷

B.在肺组织缺氧缺血情况下，毛细血管和肺泡壁渗透性增加，纤维蛋白沉着

C.肺泡和细支气管壁肺透明膜形成

D.肺内液体吸收转运障碍，肺组织水肿，使小气道狭窄

E.肺血管痉挛引起动脉导管和卵圆孔水平右向左分流，加重缺氧

2、单项选择题：早产儿的定义是（　）。A.胎龄＞28 周至＜37 周的新生儿

B.胎龄＞37 周至 40 周的新生儿

C.体重＜2500g 的婴儿

D.体重＜1500g 的婴儿

E.胎龄＜28 周

3、单项选择题：足月顺产儿，25 天，出生体重 3.2kg，母乳喂养，生后第三天出现黄疸，至今黄疸不退，小儿吃奶好，体温正常。体检：体重 3.85kg，除皮肤黄染外，无其他异常，血、尿常规均正常，血清胆红素 170μmol/L，如何处理（　）。A.光照疗法

B.交换输血

C.口服泼尼松

D.停用苯巴比妥

E.停母乳，向家长解释

4、单项选择题：一早产儿胎龄 34 周，顺产后因早产送新生儿病房监护，下列哪种情况不易发生（　）。A.低血糖

B.低体温

C.呼吸暂停

D.肺透明膜病

E.红细胞增多症

5、单项选择题：新生儿生后 24 小时内出现黄疸，应首先考虑（　）。A.新生儿肝炎

B.新生儿溶血病

C.新生儿败血症

D.新生儿肺炎

E.母乳性黄疸

6、单项选择题：孕31周早产儿，体重1400g，生后不久发生呼吸窘迫，暂停头罩吸氧后血气结果为pH7.20，PaO45mmHg，PaCO68mmHg，BE-3。以下哪项处理最正确（　）。A.鼻塞CPAP

B.机械通气

C.给予氨茶碱兴奋呼吸

D.加大头罩给氧，浓度8L／min

E.5%碳酸氢钠纠正酸中毒

7、单项选择题：新生儿生后4天开始气促、发绀、口吐泡沫，体温不升，呼吸快而不规则，肺部听诊未闻及啰音，母体分娩早期破水24小时，最可能是（　）。A.新生儿窒息

B.新生儿呼吸窘迫综合征

C.新生儿肺炎

D.新生儿湿肺

E.新生儿颅内出血

8、单项选择题：新生儿出生体重3.2kg，生后48小时血清胆红素267μmol／L，未结合胆红素249μmol／L，在等待化验检查结果期间，首选治疗方法是（　）。A.光照疗法

B.白蛋白输注

C.口服苯巴比妥

D.交换输血

E.输血浆

9、单项选择题：新生儿溶血病最常见的是（　）。A.RhD血型不合

B.RhE血型不合

C.MN血型不合

D.Rh血型不合

E.ABO血型不合

10、单项选择题：新生儿出血症经典型，常见出血部位是（　）。A.肺出血

B.消化道出血

C.颅内出血

D.血尿

E.鼻出血

11、单项选择题：男婴，足月顺产，出生体重3500g，生后36h，血清总胆红素297．5μmol／L。以间接胆红素为主，首选的治疗方法是（　）。A.口服苯巴比妥

B.换血

C.输血浆

D.光照疗法

E.输注白蛋白

12、单项选择题：下列哪种药可以在新生儿安全使用（　）。A.氯霉素

B.丁胺卡那霉素

C.磺胺类药物

D.苯巴比妥

E.新霉素

13、单项选择题：关于足月儿的外观特点，下列哪项是错误的（　）。A.肤色红润，皮下脂肪丰富

B.鼻软骨发育良好

C.指（趾）甲过指尖

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/936032155021010123