

2024 年内蒙古自治区呼伦贝尔市护士执业资格考试《实践能力》模  
拟试题及答案解析

毕业院校：\_\_\_\_\_ 姓名：\_\_\_\_\_ 考场：\_\_\_\_\_ 考号：\_\_\_\_\_

一、选择题

1. 抗 Sm 抗体与下列那种疾病最相关

A、类风湿关节炎

B、SLE

C、原发性胆汁性肝硬化

D、皮炎

E、自身免疫性肝炎

答案：

B

答案解析：系统性红斑狼疮(SLE)的患者体内出现多种自身抗体和免疫复合物,抗 ds-DNA 抗体和抗 Sm 抗体是本病的特征性标志

2. 前列腺特异性抗原的英文代号是

A、AFP

B、AFU

C、PSA

D、NSE

E、CA50

答案:

C

答案解析: prostatespecificantigen, PSA,前列腺特异性抗原

3. (75~76 题共用题干) 患者, 男, 25 岁。患支气管肺炎。医嘱青霉素 40 万单位肌肉注射, 注射前先行青霉素皮试。进行皮试时, 宜选择的注射部位是前臂

A、掌侧上段

B、尺侧上段

C、掌侧下段

D、尺侧下段

E、尺侧中段

答案:

C

4. 下列不属于输液反应的是

A、发热反应

B、溶血反应

C、空气栓塞

D、静脉炎

E、循环负荷过重

答案:

B

5. 尿液 Addis 计数时,最好采用

A、晨尿

B、餐后尿

C、3h 尿

D、12h 尿

E、24h 尿

答案:

D

答案解析: 12h 夜尿较为浓缩,便于有形成分的检查及定量

6. 关于干化学法检查尿内 RBC, 错误的是

A、不同型号试纸带的敏感度不同

- B、易热酶,肌红蛋白或菌尿可引起假阴性
- C、其检测原理是根据 Hb 具有过氧化物酶样活性
- D、既可完整的 RBC 反应,又能测定游离的 Hb
- E、大量维生素 C 可引起假阴性

答案:

B

答案解析: 尿液中含有肌红蛋白、对热不稳定的酶、氧化剂或菌尿,可使干化学法尿隐血测定呈现假阳性结果

7. 关于血管性血友病下列说法不正确的是

- A、血小板计数正常
- B、凝血因子 IX 缺乏
- C、出血时间延长
- D、APTT 可延长
- E、阿司匹林耐量试验阳性

答案:

B

答案解析: 血管性血友病为血小板膜 GPIIb/IIIa 缺陷

8. PNH 简易重要的筛查试验是

A、红细胞渗透脆性试验

B、酸化血清溶血试验

C、Rous 试验

D、蔗糖溶血试验

E、高铁血红蛋白还原试验

答案:

D

答案解析: 蔗糖溶血试验是 PNH 简易重要的筛查试验

9. 不去蛋白时,血清中肌酐多采用下列何种方法进行测定

A、碱性苦味酸动力学法

B、碱性苦味酸终点法

C、酸性苦味酸动力学法

D、酸性苦味酸终点法

E、中性苦味酸动力学法

答案:

A

答案解析：碱性苦味酸动力学法已成为常规分析法,因为它不需去蛋白,方法简单、快速,可自动扣除血清及试剂空白吸光度

10. 关于毛细血管采血法,下列正确的是

- A、耳垂血的血红蛋白比静脉血低 10%
- B、耳垂采血时可用力挤压
- C、婴幼儿宜用耳垂或手指采血
- D、成人要推荐用手指采血,因其检查结果比较恒定
- E、耳垂采血结果恒定

答案:

D

答案解析：手指采血操作方便,检查结果比较恒定,世界卫生组织(WHO)推荐采集左手环指指端内侧血液

11. 下列疾病脑脊液中,均以淋巴细胞增高为主,但除外

- A、化脓性脑膜炎
- B、病毒性脑膜炎
- C、结合性脑膜炎
- D、脑脊髓梅毒

E、脑瘤

答案:

A

答案解析：化脓性脑膜炎脑脊液中增多的白细胞以中性粒细胞为主

12. 巨幼细胞性贫血属于

A、小细胞均一性贫血-

B、大细胞均一性贫血

C、小细胞非均一性贫血

D、大细胞非均一性贫

E、正细胞正色素性贫血.

答案:

D

13. 珠蛋白生成障碍性贫血可见

A、红细胞渗透脆性试验增高

B、蔗糖溶血试验阳性

C、抗人球蛋白试验阳性

D、变性珠蛋白小体检查阳性率升高

E、碱变性试验阳性

答案:

E

答案解析: 培养淋病奈瑟菌需加5%~10%二氧化碳培养,空肠弯曲菌是微需氧菌,产气荚膜梭菌是厌氧菌

14. 下列属于格拉斯哥昏迷评分表(GCS)项目的是

A、呼吸强弱

B、语言反应

C、血压情况

D、体温情况

E、皮肤反应

答案:

B

15. 关于恶性组织细胞病骨髓象特点,正确的是

A、一次骨髓穿刺未找到异常组织细胞可排除恶性组织细胞病

B、淋巴样组织细胞和单核样组织细胞对恶性组织细胞病具有诊断价值

C、异常组织细胞和多核巨组织细胞对恶性组织细胞病具有诊断价值

D、中性粒细胞碱性磷酸酶积分常增加

E、吞噬性组织细胞对恶性组织细胞病具有诊断价值

答案:

C

答案解析: 本题考查恶性组织细胞病的诊断性细胞,异常组织细胞和多核巨组织细胞对恶性组织细胞病具有诊断价值

16. 患者,男,30岁。急性阑尾炎合并穿孔,在硬膜外麻醉下行阑尾切除术,术后手术室护士送患者回病房。次日患者体温 39℃,主诉切口疼痛难以忍受,患者应取的体位是

A、端坐卧位

B、仰卧屈膝位

C、半坐卧位

D、右侧卧位

E、头高足低位

答案:

C

17. 关于 II型高脂血症描述错误的是

A、IDL ↑

B、血清外观浑浊

C、电泳宽β带

D、常见原因为LDL 异化速度加快

E、以上都对

答案:

D

答案解析: 考查高脂蛋白血症的分型和生化特征,发生 II型高脂蛋白血症的常见原因为LDL 异化速度降低

18. 关于中性粒细胞核象的叙述,错误的是

A、可分为核左移和核右移 2 种

B、反应粒细胞的成熟程度

C、核象变化反映某些疾病的病情和预后

D、正常外周血中性粒细胞核以分 2 叶的居多

E、杆状核与分叶核之比约为 1:13

答案:

D

答案解析: 正常时外周血中性粒细胞以 3 叶核居多

19. 患儿男，8岁。右股部下端疼痛伴高热 39.5℃1天，诊断为右股骨下端急性化脓性骨髓炎。

护士查体时最可能出现的症状是

- A、右股部下段皮温升高
- B、右股部下端深压痛
- C、右股部下段肿胀
- D、右股部下段浅表静脉怒张
- E、右膝关节活动受限

答案：

B

20. 患者，女性，39岁。因头部受伤入院。体检发现：BP 18 / 12kPa，鼻腔有脑脊液流出。以下护理措施不正确的是

- A、床头抬高 15～30cm 卧位
- B、清洁鼻前庭
- C、无菌棉球填塞鼻腔
- D、避免经鼻腔吸痰
- E、避免经鼻置胃管

答案:

C

21. 脑脊液中葡萄糖含量减少最明显的是

A、化脓性脑膜炎

B、病毒性脑炎

C、隐球菌性脑膜炎

D、结核性脑膜炎

E、脑肿瘤

答案:

A

答案解析: 化脓性脑膜炎,因 CSF 中细菌大量消耗葡萄糖而使葡萄糖浓度明显降低,在疾病发展至高峰时葡萄糖为零

22. 卵巢癌重要的相关抗原是

A、CA125

B、hCG

C、CA19-9

D、CA15-3

E、NSE

答案:

A

答案解析: 卵巢癌重要的相关抗原是 CA125

23. 结核性胸腔积液与恶性胸腔积液的生化鉴别指标是

A、ADA 和 CEA

B、ADA 和 ALP

C、ADA 和 AFP

D、ADA 和 GGT

E、ADA 和 AFU

答案:

A

答案解析: 结核性胸腔积液与恶性胸腔积液可以通过腺苷脱氨酶(ADA)、溶菌酶、CEA、铁蛋白、乳酸脱氢酶等指标进行鉴别

24. G-6-PD 酶缺陷症可见

A、红细胞渗透脆性试验增高

B、蔗糖溶血试验阳性

C、抗人球蛋白试验阳性

D、变性珠蛋白小体检查阳性率升高

E、碱变性试验阳性

答案:

D

25. 夏季从留取尿标本后到完成检验的时间应为

A、2h 内

B、3h 内

C、1h 内

D、1.5h 内

E、2.5h 内

答案:

C

答案解析: 一般尿标本应在采集后 2h 内分析完毕,但是由于夏天温度高,细菌繁殖快,故应尽快检测

26. II b 型高脂蛋白血症发病的可能生化缺陷是

A、VLDL 合成旺盛

B、ApoE 异常

C、LPL 异常

D、ApoB 异常

E、ApoD 异常

答案:

A

答案解析: 考查高脂蛋白血症的分型和生化特征, III型高脂蛋白血症主要病因为VLDL 合成旺盛, VLDL<sub>2</sub>-LDL 转换:1:进

27. 血清铁降低可见于

A、缺铁性贫血

B、肾性贫血

C、珠蛋白生成障碍性贫血

D、巨幼细胞性贫血

E、恶性贫血

答案:

A

答案解析: 血清铁降低可见于缺铁性贫血

28. 艾滋病免疫学检查一般主要包括

- A、HIV 抗体和 B 细胞
- B、T 细胞和 B 细胞
- C、HIV 和其他病毒抗体
- D、HIV 抗体和 T 细胞亚群
- E、细菌和真菌

答案:

D

答案解析: HIV 主要侵犯 T 细胞

29. 为该患者洗胃时, 应选择的洗胃液是

- A、1: 20 000 高锰酸钾溶液
- B、温水
- C、0.1%硫酸铜溶液
- D、2%~4%碳酸氢钠溶液
- E、3%~5%盐水

答案:

B

30. 采用苦味酸法测定尿肌酐,尿液应稀释多少倍合适

- A、2 倍
- B、5 倍
- C、50 倍
- D、500 倍
- E、1000 倍

答案:

C

答案解析: 尿液标本按照 1 : 20至 1 : 50稀释后测定

31. 该患者的血标本应放置于

- A、枸橼酸钠试管中密封
- B、清洁试管中密封
- C、肝素抗凝注射器中密封
- D、清洁试管中无须密封
- E、无菌试管中密封

答案:

C

32. 患儿，男，2岁。因发热、抽搐1次来院就诊，诊断为高热惊厥。护士遵医嘱给予水合氯醛保留灌肠，其浓度为

A、0.5%~1%

B、10%

C、5%

D、2%

E、15%

答案:

B

33. 使用无菌容器过程中，操作正确的是

A、盖的内面朝下，以便放置稳妥

B、物品取出后，未污染的物品可放回

C、手握容器边缘，以便持物牢靠

D、开盖30分钟内盖好，以防污染

E、手指不可触及容器内面及边缘

答案:

E

34. 慢性尿潴留患者尿液气味为

- A、大蒜臭味
- B、老鼠尿味
- C、烂苹果味
- D、腐臭味
- E、氨味

答案:

E

答案解析: 正常尿液有来自尿内的挥发性酸的气味,尿液长时间放置后,因尿素分解一可出现氨臭味 慢性膀胱炎及慢性尿潴留尿液氨味 糖尿病酮症酸中毒尿液苹果样气味; 有机磷中毒尿液大蒜臭味;苯丙酮尿症患者尿液鼠臭味;泌尿系统感染或晚期膀胱癌尿液腐臭味

(589~590 题共用备选答案)

35. 下列免疫学测定方法中敏感性最高的是

- A、沉淀反应
- B、凝集反应
- C、补体结合试验
- D、ELISA 测定

E、放射免疫测定

答案:

E

答案解析: RIA 检出限量达 ng 甚至 pg 水平, ELISA 一与 RIA 检测敏感性相仿

36. 正常粪便显微镜检查可见到下列成分,但除外

A、中性粒细胞

B、巨噬细胞

C、淀粉颗粒

D、脂肪颗粒

E、植物纤维

答案:

B

答案解析: 正常粪便中无巨噬细胞在细菌性痢疾时,常可见到较多的巨噬细胞,「1 此,巨噬细胞可作为诊断急性细菌性痢疾的依据;吞噬细胞也可见于急性出血性肠炎或偶见于溃疡性结肠炎

37. 深昏迷患者不能将痰液咳出的主要原因是

A、咳嗽反射迟钝

B、咳嗽反射消失

C、吞咽反射消失

D、痰液较稀薄

E、咳嗽较无力

答案:

B

38. 患儿，男，3岁。上呼吸道感染，咳嗽，咳痰。护士为其病室调节的适宜温度是

A、24~26℃, 65%~70%

B、22~24℃, 55%~65%

C、18~22℃, 50%~60%

D、18~22℃, 40%~50%

E、18~22℃, 50%~55%

答案:

C

39. 患者，女，66岁。因消化性溃疡入院。自护患认识后，每当患者遇到一些自己不能理解的治疗护理问题，完全依赖护士给予帮助。按照佩皮劳人际关系模式理论，她与护士的关系处于

A、解决期

B、认识期

C、确认期

D、开拓期

E、发展期

答案:

C

40. 外用溶液具有

A、清洁、消炎作用

B、润肤、软化痂皮、保护作用

C、保护、收敛作用

D、保护、消炎、润肤、止痒作用

E、消炎、止痒、杀菌作用

答案:

A

41. 患者因呕吐突然出现意识丧失、面色发绀、呼吸停止。首选的急救措施是

A、开放气道，清除呕吐物

B、通知麻醉科气管插管

C、迅速建立静脉通路

D、立即使用呼吸气囊

E、评估大动脉搏动情况

答案:

A

42. 关于男性患者的导尿操作, 正确的是

A、插管有阻力时嘱患者屏气

B、暴露尿道口, 自冠状沟向尿道口螺旋式进行消毒

C、提起阴茎与腹壁呈  $60^{\circ}$  角, 使耻骨前弯消失

D、嘱患者取截石位

E、导尿管插入尿道  $24\sim 26\text{cm}$

答案:

C

43. 胸外心脏按压的频率至少为

A、60 次 / 分

B、70 次 / 分

C、80 次 / 分

D、90 次 / 分

E、100 次 / 分

答案:

E

44. 护士因自信药物不会出错, 没有进行查对, 导致将错误的药物注入患者体内, 造成患者死亡。护士的行为属于

A、侵权行为

B、疏忽大意

C、过失犯罪

D、无过失犯罪

E、渎职罪

答案:

C

45. 护理程序的理论框架是

A、Roy 的适应模式

B、沟通理论

C、一般系统论

D、基本需要层次论

E、应激与适应理论

答案:

C

46. MIU 试验是

A、甲基红吲哚尿素酶试验

B、动力吲哚尿素酶试验

C、麦芽糖吲哚尿素酶试验

D、甘露酶吲哚尿素试验

E、动力吲哚枸橼酸盐利用试验

答案:

B

47. 此时降温的主要目的是

A、减轻充血

B、减轻出血

C、预防脑水肿

D、促进炎症局限

E、加速神经冲动传导

答案:

C

48. 大量不保留灌肠的禁忌证是

A、中暑

B、伤寒

C、急腹症

D、习惯性便秘

E、结肠检查前

答案:

C

49. 健康新视野的实施包括

A、提供基本药物

B、合理治疗

C、知识的培育

D、生命的保护

E、青年的生活质量

答案:

D

50. 对3岁以上的儿童评估疼痛的程度时,选择的最佳工具是

A、数学式评估工具

B、描述式疼痛评估工具

C、面部表情疼痛测量图

D、道坎式评估工具

E、文字式评估工具

答案:

C

51. 杀灭肉毒芽孢需要煮沸的时间为

A、4小时

B、1小时

C、5小时

D、3小时

E、2小时

答案:

D

52. 患者, 男, 37 岁, 出现向心性肥胖、痤疮、高血压, 疑为皮质醇增多症, 准备进行尿 17-羟皮质类固醇监测。24 小时尿中应加入浓盐酸的剂量是

A、1~2ml

B、3~4ml

C、5~10ml

D、15~20ml

E、25~30ml

答案:

C

53. 进行第二次消毒时, 消毒的顺序是

A、自下而上, 外→内

B、自上而下, 内→外→内

C、自下而上, 内→外→内

D、自上而下, 外→内→外

E、自下而上, 外→内→外

答案:

B

54. 患者，男，55岁。持续性高热（40～41℃），中毒面容，全身不适，乏力，咽痛，咳嗽。体格检查：脉搏缓慢，皮肤玫瑰疹，肝脾大，伴有腹胀、腹痛。3天未排便，腹部触诊较硬实且紧张。实验室检查：周围血象、白细胞计数低下，骨髓象中有伤寒细胞。为减轻腹痛、腹胀，护士遵医嘱给予灌肠。关于灌肠筒内液面距离肛门高度及液体量的叙述，正确的是

A、液面不得高于肛门60cm，液体量不得超过800ml

B、液面不得高于肛门30cm，液体量不得超过500ml

C、液面不得高于肛门20cm，液体量不得超过400ml

D、液面不得高于肛门50cm，液体量不得超过700ml

E、液面不得高于肛门40cm，液体量不得超过600ml

答案:

B

55. 对艾滋病患者应执行的隔离种类是

A、严密隔离

B、引流物-分泌物隔离

C、性隔离

D、血液-体液隔离

E、接触隔离

答案:

D

56. 做血液气体分析的血标本, 采集后应密封放置于

A、清洁试管中

B、草酸钾抗凝试管

C、无菌试管中

D、枸橼酸钠试管中

E、肝素抗凝注射器试管中

答案:

E

57. 可合成凝血因子, 促进血液凝固的维生素是

A、维生素 C

B、维生素 D

C、维生素 E

D、维生素 K

E、维生素 A

答案:

D

58. 下列属于一级医院的是

A、全国、省、市直属的市级大医院

B、一般市、县医院及直辖市的区级医院

C、农村乡镇卫生院和城市街道医院

D、诊治专科疾病而设置的医院

E、医学院校的附属医院

答案:

C

59. 患者，男，18 岁。尿蛋白定性检查（++

++），尿蛋白定量 3.5g / 24h，镜下血尿。眼

睑及双下肢轻度水肿，以肾炎收治入院。该饮食的试验期为

A、1 周

B、2 天

C、2 周

D、1 天

E、3 天

答案:

E

60. 患者，男，18 岁。尿蛋白定性检查（++

），尿蛋白定量 3.5g / 24h，镜下血尿。眼

睑及双下肢轻度水肿，以肾炎收治入院。护士应指导患者摄入

A、低脂肪饮食

B、低热量饮食

C、低优质蛋白质饮食

D、低胆固醇饮食

E、高磷饮食

答案:

C

61. 急诊一有机磷中毒患者，男性，35 岁。因与家人吵架，自服敌敌畏 100ml，瞳

孔明显缩小、轻度呼吸困难、大汗、腹痛、腹泻、意识轻度障碍，步态蹒跚。全血胆

碱酯酶活力降至 45%，属于

A、重度中毒

B、中度中毒

C、轻度中毒

D、慢性中毒

E、极度中毒

答案:

B

62. 原发性血小板减少综合症患者做有关的实验室检查时,下列结果哪一项是不符合的

A、出血时间延长

B、血小板计数减少

C、凝血酶原时间延长

D、血块收缩不良

E、束臂试验阴性

答案:

C

答案解析: 凝血酶原时间正常

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/936225051205010235>