

神经内科测试题库含答案

1、休克时病人的体位应取

- A、半卧位
- B、头低足高位
- C、头与躯干抬高 $10^{\circ} - 15^{\circ}$ ，下肢抬高 $20^{\circ} - 30^{\circ}$
- D、头高足低位
- E、侧卧位

答案：C

2、对心源性水肿的患者实施的护理措施要点中，哪项不妥

- A、嘱患者应保持身心休息，以减轻心脏负荷
- B、限制钠盐的摄入
- C、保持皮肤清洁、干燥，防止破损和感染
- D、使用排钾利尿剂后特别观察血压的变化
- E、老年病人尤其注意控制输液速度，不可太快

答案：D

3、一肝硬化患者有大量腹水，呼吸困难，用利尿剂后仍尿少，如需放腹水，第一次放多少合适

- A、1000ml
- B、1500~3000ml
- C、4000~6000ml
- D、6000~8000ml
- E、2000-3000

答案：A

4、急性心肌梗死最先出现的症状是

- A、心悸
- B、胸部不适
- C、疼痛
- D、呼吸困难
- E、胸闷

答案：C

5、下列神经递质的减少会引起帕金森病的是

- A、乙酰胆碱
- B、多巴胺
- C、组胺
- D、去甲肾上腺素

E、5-羟色胺

答案：B

6、脑栓塞最多见的栓子来源是

A、空气栓子

B、脂肪栓子

C、心源性栓子

D、肺动脉血栓

E、大动脉硬化斑块脱落

答案：C

7、患者，男，35岁，消化性溃疡病史5年，酒后突发中上腹剧烈疼痛并波及右下腹，右侧腹部有腹膜刺激征。护理措施错误的是

A、通知患者立即禁食

B、取半坐卧位

C、采取胃肠减压

D、给予止痛剂、准备手术

E、观察血压、脉搏等生命体征

答案：D

8、一位脑出血的病人，很快昏迷，双侧瞳孔极度缩小，四肢瘫痪，高热，呼吸障碍，出血部位应考虑

A、内囊内侧和丘脑附近

B、外囊附近

C、桥脑

D、小脑

E、内囊内侧扩延至外囊附近

答案：C

9、最能提示心肌梗死的心电图表现是

A、P—R间期延长

B、异常深而宽的Q波

C、S—T段弓背向上抬高

D、T波倒置

E、Q—T间期延长

答案：C

10、患者女性，78岁，高血压20年，家人探视后突然出现剧烈头痛，头晕，呕吐，进而意识障碍，血压206/110mmHg，CT显示高密度影，治疗需立刻降颅压和镇静，下列哪种药物禁用

- A、 吗啡
- B、 甘露醇
- C、 地西洋
- D、 硝苯地平缓释片
- E、 尼莫地平

答案： A

11、 下列属于高度危险性的医用物品的是

- A、 压舌板
- B、 痰盂、 便器和餐具
- C、 活体组织检查钳
- D、 胃肠道内镜和喉镜
- E、 呼吸机和麻醉机管道

答案： C

12、 不属于医院感染的高危人群的是

- A、 老年患者
- B、 早产儿和新生儿
- C、 免疫抑制剂使用者
- D、 ICU 住院患者
- E、 孕产期妇女

答案： E

13、 诊断呼吸衰竭的血气分析标准为

- A、 $PaO_2 < 6.7kPa$, $PaCO_2 > 5.3kPa$
- B、 $PaO_2 < 8.0kPa$, $PaCO_2 > 6.7kPa$
- C、 $PaO_2 < 6.7kPa$, $PaCO_2 > 8.0kPa$
- D、 $PaO_2 < 8.0kPa$, $PaCO_2 > 9.3kPa$
- E、 $PaO_2 < 9.3kPa$, $PaCO_2 > 8.0kPa$

答案： B

14、 男性， 65 岁， 晨起床时觉右上下肢麻木， 无力而跌倒。 体检： 神清， 右上下肢瘫， 口斜眼歪应采取

- A、 头部放冰袋
- B、 暂禁食
- C、 低流量吸氧
- D、 立即准备腰穿
- E、 头低左侧卧位

答案： E

15、SLE 最常见的皮肤损害部位为

- A、面部
- B、颈部
- C、腿部
- D、胸部
- E、背部

答案：A

16、输液过程中，患者突然出现呼吸困难、气促、咳血性泡沫痰的原因是

- A、输入致热物质
- B、输入速度过快
- C、输入药液浓度过高
- D、输入空气栓子
- E、输入变质液体

答案：B

17、肌内注射铁剂时，其用药护理除哪项外均妥：

- A、宜深部肌内注射
- B、剂量要准确
- C、不适注射者可静注
- D、避免硬结发生
- E、严密观察有无副反应

答案：C

18、关于甲亢患者的临床表现正确的是

- A、室性心律失常
- B、脉压正常或减小
- C、女患者均出现停经
- D、容易兴奋，不易疲乏
- E、食欲亢进但消瘦、体重减轻

答案：E

19、类风湿关节炎缓解期患者的主要护理措施是

- A、注意休息
- B、密切观察药物副作用
- C、关节功能锻炼
- D、保持乐观情绪
- E、控制感染

答案：C

20、目前诊断小肝癌和微小肝癌的最佳检查方法是

- A、甲胎蛋白
- B、超声检查
- C、肝穿刺活检
- D、X线肝血管造影
- E、CT

答案：E

21、急性炎症性脱髓鞘性多神经根病常用的护理诊断为

- A、低效型呼吸型态
- B、恐惧
- C、吞咽障碍
- D、清理呼吸道无效
- E、有皮肤完整性受损的危险

答案：A

22、患者女性，67岁，脑动脉硬化5年，因与家人发生矛盾，突然出现眩晕、枕后痛，呕吐伴共济失调、眼球震颤，很快出现意识模糊，CT显示高密度影，根据临床特点判断出血部位

- A、脑干
- B、脑桥
- C、小脑
- D、内囊
- E、蛛网膜下腔

答案：C

23、下列哪种为浅感觉

- A、触觉
- B、运动觉
- C、实体觉
- D、图形觉
- E、振动觉

答案：A

24、各型糖尿病最基本的治疗方法是：

- A、注射胰岛素
- B、口服降糖药
- C、饮食疗法
- D、卧床休息

E、纠正电解质紊乱

答案：C

25、患儿男，9岁，做作业时突然中断，发呆，手中铅笔落地，约10秒后又能继续做作业，但每次发作均无记忆，最可能的诊断是

- A、癫痫失神发作
- B、肌阵挛发作
- C、无张力发作
- D、癫痫精神运动性发作
- E、癫痫单纯部分发作

答案：A

26、处理针刺伤的首要步骤是

- A、挤出污血
- B、挤压伤口
- C、用清水清洗伤口
- D、用肥皂液清洗伤口
- E、用5%碘伏消毒伤口

答案：A

27、循环系统的功能一般不包括

- A、内分泌功能
- B、运输血液
- C、保持新陈代谢正常进行
- D、维持和调节血压
- E、调节酸碱平衡

答案：E

28、熟悉各种传染病的潜伏期，最重要的意义是

- A、有助于诊断
- B、预测疫情
- C、确定检疫期
- D、估计病情严重程度
- E、推测预后

答案：C

29、PDCA循环管理的四个阶段是

- A、计划、执行、检查、反馈
- B、组织、执行、检查、处理
- C、计划、执行、反馈、处理

D、计划、执行、检查、处理

E、组织、执行、评价、处理

答案：D

30、面神经炎急性期，下列哪一种药较为重要

A、青霉素

B、加兰他敏

C、维生素 B12

D、地巴唑

E、地塞米松

答案：E

31、气管插管的气囊应定时放松，一般每隔多长时间放松一次

A、4 小时

B、6 小时

C、8 小时

D、12 小时

E、24 小时

答案：A

32、慢粒白血病护理体检最突出的体征是：

A、巨大脾脏

B、肝脏肿大

C、浅表淋巴结肿大

D、胸骨压痛

E、皮肤瘀斑

答案：A

33、急性白血病患者突然出现高热，主要原因为

A、代谢亢进

B、严重贫血

C、白血病细胞浸润

D、化疗过敏反应

E、感染

答案：E

34、对进行胃肠镜的患者下列哪项护理措施不正确

A、检查前禁食 12 小时

B、检查前半小时给予阿托品皮下注射

C、检查前协助摘除义齿

- D、检查后无需禁食，可进少量流质
- E、检查后告诉病人出现的咽部不适会自行消失

答案：D

35、肝硬化最常见的并发症是：

- A、上消化道出血
- B、肝昏迷
- C、肝肾综合征
- D、感染
- E、肝癌

答案：A

36、以下哪项可作为心肌梗死与一般心绞痛鉴别的可靠依据

- A、胸骨后疼痛持续 20 分钟以上
- B、压榨样疼痛
- C、心电图常见 T 波倒置
- D、心电图见病理性 Q 波
- E、心电图见 ST 段抬高

答案：E

37、关于甲状腺功能亢进症的护理评估，错误的的项目为：

- A、食欲亢进
- B、心率增快
- C、多语多动
- D、可出现躁狂抑郁症
- E、脉压缩小

答案：E

38、患者男性，24 岁。劳动中突然发生剧烈头痛、呕吐和意识不清，查体：浅昏迷，血压 120/80mmHg, 体温 37，右侧上睑下垂眼球外展，右瞳 4mm、光反射迟钝、左瞳 2mm、光反射灵敏，左侧肢体活动差，左侧巴彬斯基征阳性。诊断蛛网膜下腔出血。患者颈抵抗、亥胸距 4 横指，克氏征阳性，提示患者存在

- A、浅反射异常
- B、深反射异常
- C、病理反射
- D、脑膜刺激征
- E、感知障碍

答案：D

39、血管内导管相关性感染的主要影响因素不包括

- A、导管的类型
- B、导管内置的时间
- C、对导管的日常护理
- D、置管时的无菌操作
- E、置管人的年资

答案：A

40、左心功能不全病人出现呼吸困难的主要原因是

- A、痰液堵塞气道
- B、. 支气管痉挛
- C、左肺受到扩大的心脏的压迫
- D、肺循环瘀血
- E、神经反应

答案：D

41、对肝硬化病人的护理是：

- A、应严格限制蛋白质，以预防肝性脑病发生
- B、可以进食普通食物，无特殊要求
- C、少量饮酒可以扩张血管改善门静脉循环
- D、避免粗糙食物
- E、腹水时，每天给水量也不能少于 1500ml

答案：D

42、慢性胃炎的发病与哪种细菌有关

- A、大肠杆菌
- B、沙门菌
- C、空肠弯曲菌
- D、幽门杆菌
- E、嗜盐杆菌

答案：D

43、左侧大脑半球（优势半球）外侧沟上方和额下回后部交界区为语言代表区（Broca 区），损害时出现

- A、感觉性失语
- B、命名性失语
- C、失写
- D、运动性失语
- E、失读

答案：D

44、原发性高血压病的主要病理生理是

- A、心排出量升高
- B、交感神经兴奋性增加
- C、肾素分泌过多
- D、周围血管阻力增加
- E、血液粘滞度增高

答案：D

45、原发性肝癌最早、最常见的转移方式是：

- A、淋巴转移
- B、肝内血行转移
- C、肝外血行转移
- D、种植转移
- E、直接蔓延

答案：B

46、为颅内压增高患者做腰穿测颅腔内压力，取脑脊液时，可能出现的症状是

- A、血压急剧下降
- B、小脑幕切迹疝
- C、枕骨大孔疝
- D、颅内压过低
- E、呼吸困难

答案：C

47、传染病在较小范围、短时间内突然出现大批同类病例，称为

- A、流行
- B、大流行
- C、散发
- D、暴发流行
- E、以上都不是

答案：D

48、慢性风湿性心脏病最常见的瓣膜病变为

- A、二尖瓣狭窄合并关闭不全
- B、二尖瓣合并主动脉瓣
- C、单纯主动脉瓣
- D、主动脉瓣合并肺动脉瓣
- E、肺动脉瓣合并三尖瓣

答案：B

49、慢性阻塞性肺气肿最突出的症状是

- A、长期反复咳嗽
- B、反复咳脓性痰
- C、间歇少量咯血
- D、逐渐加重的呼吸困难
- E、活动后喘息

答案：D

50、治疗肝昏迷正确的治疗措施有：

- A、高蛋白饮食
- B、肥皂水清洁灌肠
- C、静注多巴胺
- D、口服制酸剂
- E、谷氨酸钾静滴

答案：E

51、当患者发生室颤时，首选的抢救措施是

- A、气管插管
- B、开放气道
- C、电除颤
- D、开放静脉
- E、胸外心脏按压

答案：C

52、肝性脑病发生代谢性碱中毒时可用：

- A、谷氨酸钠
- B、谷氨酸钾
- C、乙酸谷氨酸胺
- D、精氨酸
- E、不作处理

答案：D

53、患者男性，65岁，因右侧肢体活动不便4小时入院，患者神志清楚，有高血压、糖尿病病史，曾有过TIA发作史，右侧肌力为3级，该疾病最常见的病因是

- A、劳累
- B、伤风感冒
- C、动脉粥样硬化

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/937020015101006161>