

2023 年执业药师之西药学综合知识与技能全真模拟 考试试卷 A 卷含答案

单选题（共 48 题）

1、对由营养不良、婴儿期所致的恶性贫血者应选用

- A. 叶酸+维生素 B12
- B. 富马酸亚铁
- C. 维生素 K1
- D. 甲磺酸去铁胺
- E. 亚叶酸钙

【答案】 A

2、以餐后血糖升高为主，伴餐前血糖轻度升高，应该首选的降糖药是

- A. 阿卡波糖
- B. 格列本脲
- C. 罗格列酮
- D. 二甲双胍
- E. 瑞格列奈

【答案】 C

3、为了与生物钟同步，适宜于睡前服用的是

- A. 维生素 C
- B. 二甲双胍
- C. 多潘立酮
- D. 普伐他汀

E. 米索前列醇

【答案】 D

4、在乳汁中较难排泄的弱酸性抗生素是

A. 四环素

B. 红霉素

C. 青霉素 G

D. 氯霉素

E. 华法林

【答案】 C

5、患者，男，50 岁，诊断为高血压、冠心病。医师处方：氨氯地平片 10mgpoqd；美托洛尔缓释片 47.5mgpoqd；贝那普利片 20mgpoqd；阿司匹林肠溶片 100mgpoqd；辛伐他汀片 40mgpoqd。

A. 氨氯地平片可于早上服用

B. 阿司匹林肠溶片必须于晚上在餐后服用

C. 若需减量，美托洛尔缓释片可掰开服用

D. 阿司匹林肠溶片应整片服用，不能嚼碎

E. 长期使用美托洛尔缓释片不能自行突然停药，须在医师、药师的指导下逐渐减少剂量

【答案】 C

6、不需要向指定的药品经营单位采购，但需要向具有相关药品经营资质企业购买的是

A. 高警示药品

- B. 贵重药品
- C. 麻醉药品和第一类精神药品
- D. 第二类精神药品
- E. 兴奋剂

【答案】 D

7、儿童空腹血糖检查（邻甲苯胺法）的正常参考区间是

- A. 4.2~6.5mmol/L
- B. 3.9~6.1mmol/L
- C. 3.3~5.5mmol/L
- D. 3.3~5.0mmol/L
- E. 3.1~5.0mmol/L

【答案】 C

8、三环类抗抑郁药中毒解救和治疗时，不宜使用的是

- A. 高锰酸钾溶液
- B. 吐根糖浆
- C. 普鲁卡因胺
- D. 毒扁豆碱
- E. 毛花苷丙

【答案】 D

9、患者，女，52岁，患有2型糖尿病，餐前血糖正常，餐后升高，一直服用阿卡波糖控制。近期反映常出现低血糖表现，应建议患者随身携带

- A. 巧克力
- B. 葡萄糖水
- C. 果糖
- D. 麦芽糖
- E. 胰岛素

【答案】 B

10、融合抑制剂

- A. 齐多夫定
- B. 依非韦伦
- C. 利托那韦
- D. 利巴韦林
- E. 雷特格韦

【答案】 D

11、“用药错误” I 级（9 级）的标准

- A. 差错导致患者死亡
- B. 差错导致患者永久性伤害
- C. 客观环境或条件可能引发差错
- D. 发生差错但未发给患者，或已发给患者但未使用
- E. 差错导致患者生命垂危，需要应用维持生命的措施

【答案】 A

12、慢性肾盂肾炎治疗的关键是

- A. 积极寻找并去除易感因素
- B. 选用敏感抗菌药物
- C. 联合使用抗菌药物
- D. 延长给药疗程
- E. 避免复发

【答案】 A

13、适宜餐中服用的是

- A. 吡哌美辛
- B. 奥利司他
- C. 氟伐他汀
- D. 多潘立酮
- E. 泼尼松龙

【答案】 B

14、治疗寻常痤疮给予锌

- A. 日服 80mg
- B. 日服 0.05mg
- C. 日服 180mg
- D. 日服 30~40mg
- E. 日服 0.0235~0.05mg 以下

【答案】 D

15、（2017 年真题）正常剂量维生素 D 的妊娠毒性分级是（ ）

A. C 级

B. D 级

C. A 级

D. X 级

E. B 级根据药物对胎儿的危害, 美国 FDA 将妊娠用药毒性分为 A. B. C. D. X 五个级别

【答案】 C

16、某女性, 64 岁, 既往高血压病病史 15 年, 活动后心悸、气短 3 年, 2 小时前无明显诱因突发发生喘憋。体检: 端坐体位, BP 190/110mmHg, R 30 次/分, Bp 108 次/分, 心界向左侧扩大, 双肺可闻及广泛湿啰音。

A. 心房颤动

B. 室性期前收缩

C. 心室颤动

D. 阵发性室上性心动过速

E. 阵发性室性心动过速

【答案】 A

17、血尿酸检查超过正常值

A. 诊断痛风

B. 诊断心肌梗死

C. 诊断消化性溃疡

D. 诊断急性胰腺炎

E. 诊断红细胞增多症

【答案】 A

18、长期大量应用容易导致体重明显增加的是

- A. 氯雷他定
- B. 酮替芬
- C. 盐酸异丙嗪
- D. 色甘酸钠
- E. 阿司咪唑

【答案】 B

19、阿米洛利及复方制剂

- A. 可使驾驶员视物模糊或辨色困难
- B. 可导致驾驶员多尿或多汗
- C. 可使驾驶员出现定向力障碍
- D. 可使驾驶员出现眩晕和幻觉
- E. 可引起驾驶员嗜睡

【答案】 B

20、关于他汀类和贝特类的联合使用，下列说法正确的是

- A. 早晨服用
- B. 晚间服用
- C. 早晚分别服用
- D. 早晨服用贝特类，晚上服用他汀类
- E. 晚上服用贝特类，早晨服用他汀类

【答案】 D

21、《中国药典》2015 年版分为几部

- A. 一部
- B. 二部
- C. 三部
- D. 四部
- E. 五部

【答案】 D

22、为防止血管扩张、促进毒物吸收。应用 1%氯化钠溶液洗胃应该避免的是

- A. 溶液事先加热
- B. 减小注入压力
- C. 最多不超过 500ml
- D. 多次反复进行冲洗
- E. 用于急性毒物中毒患者

【答案】 A

23、属于超短效的胰岛素制剂是

- A. 甘精胰岛素
- B. 低精蛋白锌胰岛素
- C. 赖脯胰岛素
- D. 精蛋白锌胰岛素
- E. 普通胰岛素

【答案】 C

24、钙制剂+维生素 D+双膦酸盐

- A. 原发性骨质疏松
- B. 老年性骨质疏松
- C. 妇女绝经后骨质疏松
- D. 抗癫痫药所致的骨质疏松
- E. 肾上腺皮质激素所致的骨质疏松

【答案】 B

25、关于乙型肝炎病毒表面抗体的描述错误的是

- A. HBsAb 是 HBsAg 的对应抗体，但非中和抗体
- B. HBsAb 是一种保护性抗体
- C. 大多数 HBsAg 的消失和 HBsAb 的出现，意味着 HBV 感染的恢复期和人体产生了免疫力
- D. 乙型肝炎恢复期可出现 HBsAb 阳性
- E. 接种乙肝疫苗可出现 HBsAb 阳性

【答案】 A

26、纳洛酮作解毒剂用于

- A. 阿片中毒
- B. 有机氟中毒
- C. 巴比妥类中毒
- D. 阿米替林中毒
- E. 阿普唑仑中毒

【答案】 A

27、无治疗指征盲目补钙，应评判为

- A. 过度治疗用药
- B. 无适应证用药
- C. 有禁忌证用药
- D. 联合用药不适宜
- E. 无正当理由超适应证用药

【答案】 A

28、患者，女，69岁，体型偏胖，BMI30.1kg/m²，患者诉平卧时常有反酸、烧心、胸痛，偶感背痛半年，近1周出现夜间咳嗽、咽部有异物感。自用止咳糖浆无效。查体：咽红，声音嘶哑；双肺听诊未闻及干、湿性啰音，偶有哮鸣音。既往史：高血压病史12年，服用氨氯地平片5mg qd，平素血压可控制在140/85mmHg左右；高脂血症病史10年，服用阿托伐他汀钙片20mg qd。

- A. 布地奈德干粉吸入剂
- B. 单硝酸异山梨酯缓释片
- C. 奥美拉唑肠溶胶囊
- D. 多潘立酮片
- E. 东莨菪碱片

【答案】 C

29、属于高选择性 $\alpha_4\beta_2$ 尼古丁-乙酰胆碱受体部分激动/部分拮抗药，可帮助吸烟者缓解戒断症状，减少对吸烟的渴求和满足感，但存在癫痫发作罕见不良反应的戒烟药物是

- A. 尼古丁替代药物

- B. 安非他酮
- C. 可乐定
- D. 伐尼克兰
- E. 去甲替林

【答案】 D

30、加速已经进入肠道的毒物排泄的方法不包括

- A. 洗胃
- B. 导泻
- C. 洗肠
- D. 利尿
- E. 血液净化

【答案】 A

31、在体外无抗凝作用，在体内有凝血作用的是

- A. 肝素
- B. 华法林
- C. 噻氯匹定
- D. 尿激酶
- E. 维生素 K

【答案】 B

32、过敏性鼻炎应首选的口服药是

- A. 氯苯那敏

- B. 赛庚啉
- C. 氯雷他定
- D. 泮托拉唑
- E. 法莫替丁

【答案】 C

33、血糖正常、尿葡萄糖阳性可以提示患者可能

- A. 伴心肌梗死
- B. 伴肾性肾小球肾炎
- C. 伴甲状腺功能亢进
- D. 伴活动性指端肥大症
- E. 伴肾上腺皮质功能亢进

【答案】 B

34、氨基糖苷类抗生素肾毒性大小的次序为. ()。

- A. 阿米卡星>新霉素>妥布霉素>链霉素
- B. 庆大霉素>新霉素>妥布霉素>链霉素
- C. 新霉素>阿米卡星>链霉素>妥布霉素
- D. 新霉素>阿米卡星>妥布霉素>链霉素
- E. 新霉素>链霉素>妥布霉素>庆大霉素

【答案】 D

35、患者，女，27岁，2年前开始出现多汗、多食，近期因消瘦、心悸就诊。查体：甲状腺肿大，根据血 T3、T4 及 TSH 检查结果，诊断为甲亢。目前该患者正处于哺乳期。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/937032044101006055>