专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必背200题题库，word格式可自由下载编辑，附完整答案！

2024年海南省定安县《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必背200题完整版【真题汇编】

第Ⅰ部分 单选题（100题）

1.（2019年真题）合并闭角型青光眼的前列腺增生患者，不宜选用的药物是

A：非那雄胺

B：托特罗定

C：坦索罗辛

D：多沙唑嗪

答案：B

2.匹维溴铵的作用机制为()

A：钙拮抗剂

B：M受体阻断剂

C：β受体阻断剂

D：M受体激动剂

答案：A

3.抗菌药物适宜

A：清晨服用

B：餐后服用

C：餐中服用

D：餐前服用

答案：D

4.（2019年真题）患者，男，72岁。诊断:高血压，心力衰竭，肋软骨炎。

A: 应注意观察是否有黑便

B: 在患者症状好转后，应立即停用比索洛尔

C: 应定期监测血压、心率

D: 应定期监测地高辛血药浓度

答案：B

5.解救急性乙醇中毒的是（）

A: 纳洛酮

B: 二巯丁二钠

C: 亚硝酸钠

D: 双复磷

答案：A

6.肝功能不全患者宜选用的药物是

A: 经肝肠循环消除的药物

B: 肝毒性小、经肾代谢的药物

C: 肾毒性小、经肝代谢的药物

D: 经肝肾双途径消除的药物

答案：B

7.胃黏膜保护药硫糖铝应该

A: 在餐前15分钟服用

B: 在早、晚餐前1.5小时服用

C: 在餐后1～2小时服用

D: 在餐前1小时服用

答案：D

8.首选用于治疗慢性荨麻疹的药物是

A: 氯苯那敏胶囊

B: 醋酸氟轻松软膏

C: 异丙嗪片

D: 西替利嗪片

答案：D

9.患者，女，45岁，常有上腹部饱胀、恶心、食欲不振等消化不良症状。宜选用的药物是

A: 干酵母片

B: 蒙脱石散

C: 复方阿嗪米特肠溶片

D: 奥美拉唑肠溶胶囊

答案：A

10.苯二氮（艹卓）类药物中毒的特异性治疗药物为

A: 纳洛酮

B: 去甲肾上腺素

C: 氟马西尼

D: 醒脑静

答案：C

11.药物信息按照其最初来源通常分为三级，即以期刊发表的原创性论著为主的一级信息源、引文和摘要服务为主的二级信息源以及参考书和数据库为主的三级信息源。

A: 内容全面、细致

B: 内容广泛、使用方便

C: 提供的信息丰富、详实

D: 能看到研究细节如试验设计、数据处理等

答案：B

12.一般成人血液总量约为

A: 2500～3000ml

B: 5000～6000ml

C: 1500～2000ml

D: 3000～3500ml

答案：B

13.癌症患者化疗出现腹泻合并中性粒细胞核左移时，需给予的预防性治疗药物是

A: 洛哌丁胺

B: 广谱抗生素

C: 奠沙必利

D: 药用炭

答案：B

14.保护药品免受破坏的联合用药是

A: 硫酸阿托品联用吗啡

B: 头孢哌酮/舒巴坦复方制剂

C: 磷霉素联用其他抗菌药物

D: 普萘洛尔联用硝苯地平降血压

答案：B

15.具有缩瞳和降低眼压的拟M胆碱药是

A: 毛果芸香碱

B: 噻吗洛尔

C: 拉坦前列素

D: 溴莫尼定

答案：A

16.（2015年真题）伴有高血压的患者应慎用的是（）。

A: 阿司匹林

B: 含伪麻黄碱的复方制剂

C: 对乙酰氨基酚

D: 氯苯那敏

答案：B

17.药物的成本与产生的收益之间进行对比，评价治疗方案的经济性，以货币为单位。该药物经济学评价方法是

A: 成本-效用分析

B: 最小成本分析

C: 成本-效益分析

D: 成本-效果分析

答案：C

18.患者，女，62岁，患有2型糖尿病，平时未规律监测血糖，今日来院复诊，欲了解近三个月的血糖总体控制情况，应检测的指标是()

A: 餐后2小时血糖

B: 空腹血糖

C: 糖化血红蛋白

D: 血红蛋白

答案：C

19.减轻前列腺张力和膀胱出口梗阻

A: 特拉唑嗪

B: 度他雄胺

C: 哌唑嗪

D: 索利那新

答案：A

20.患者，女，55岁，诊断为类风湿性关节炎，既往有十二指肠溃疡病史。医生给予甲氨蝶呤+柳氮磺吡啶治疗。甲氨蝶呤用法用量正确的是()

A: 75mgqd

B: 7.5mgqw

C: 7.5mgtid

D: 7.5mgqod

答案：B

21.患者，女，66岁，身高156cm，体重61kg。空腹血糖7.8mmol／L，餐后血糖11.2mmol／L，糖化血红蛋白8.7%。

A: 换用其他作用机制的口服降糖药

B: 增加现用口服降糖药的剂量

C: 增加一种口服降糖药

D: 启用胰岛素治疗

答案：D

22.有潜在的肺毒性的是

A: 呋喃妥因

B: 双嘧达莫

C：氯苯那敏

D：苯巴比妥

答案：A

23.患者，男，30岁，因反复发作呼吸困难，咳嗽、胸闷入院。每年春季发作，持续3年，查体：双肺满布哮鸣音，HR807欠/分，律齐，无杂音。

A：沙丁胺醇

B：普萘洛尔

C：青霉素

D：哌唑嗪

答案：A

24.（2015年真题）下列关于脑梗死急性期药物治疗的说法，正确的是（）。

A：血小板计数<100×109/L时应禁用溶栓药

B：甘油果糖脱水作用较甘露醇强且快

C：急性脑梗死的溶栓治疗时间窗是48小时内

D：应在使用溶栓药的同时联合使用阿司匹林

答案：A

25.溃疡或胃酸过多的人不宜饮用

A：咖啡

B：高盐饮食

C：吸烟

D：饮茶

答案：A

26.苯丙胺中毒的临床表现是（）

A：肌肉震颤、抽搐

B：明显的锥体外系症状

C：谵妄、躁狂、幻觉

D：心血管毒性

答案：C

27.必须立即用清水冲洗至少5分钟是清除（）

A：毛发被毒物污染

B：皮肤污染酚类毒物

C：眼内污染毒物

D：眼内进入固体腐蚀性颗粒

答案：C

28.更年期综合征最具特征性的症状为

A：月经周期延长，经量减少，最后绝经

B：潮热、出汗

C：心悸、胸闷不适

D：阴道萎缩

答案：B

29.根据时辰药理学，选择最适宜的给药时间，可增强药物疗效、避免不良反应、提高用药依从性减轻疾病症状(一般抑郁症状表现为晨重晚轻)的是

A：清晨服抗抑郁药

B：清晨服糖皮质激素

C：清晨服氨基糖苷类

D：清晨服利尿药

答案：A

30.用于铜中毒的解毒剂是

A: 乙酰胺

B: 维生素K1

C: 青霉胺

D: 硫酸阿托品

答案：C

31.在指导合理用药时，应交代宜在睡前服用的药物是()

A: 硫酸亚铁

B: 苯妥英钠

C: 双磷酸盐

D: 辛伐他汀

答案：D

32.在导致药源性胃肠道疾病的药品中，引起局部缺血性结肠炎、重者可致死亡等风险的药品是

A: 阿洛司琼

B: 利血平

C: 阿米替林

D: 呋塞米

答案：A

33.为避免重复用药，书写处方时，药品名称应采用

A: 通用名

B: 化学名

C: 专利名

D: 商品名

答案：A

34.具有留钾作用的利尿药是

A: 阿米洛利

B: 非那雄胺

C: 坦洛新

D: 乙酰唑胺

答案：A

35.临床给药可根据药物半衰期确定给药间隔时间和给药途径,半衰期12h的药物通常选择()

A: 2～3个半衰期给药1次

B: 每日给药1次

C: 每个半衰期给药1次

D: 静脉滴注给药

答案：C

36.某患者，女，14岁，尿频、尿急、尿痛3天，伴腰痛。肾区叩击痛，血分析见白细胞及中性粒细胞百分比升高，尿分析见尿液浑浊，尿白细胞+++，临床诊断为急性肾盂肾炎。

A: 阿奇霉素

B: 头孢噻肟

C: 林可霉素

D: 左氧氟沙星

答案：B

37.治疗急性细菌性扁桃体炎的首选药物是

A: 阿奇霉素

B: 阿莫西林

C: 克林霉素

D: 莫西沙星

答案：B

38.乙型肝炎病毒感染后在血清里最早出现的是

A: HBeAb

B: HBcAb

C: HBsAg

D: HBsAb

答案：A

39.不需要睡前服用的他汀类药物为

A: 普伐他汀

B: 辛伐他汀

C: 阿托伐他汀

D: 洛伐他汀

答案：C

40.患者，男，54岁，患冠心病3年，长期服用阿司匹林，近几天肢体多处出现瘀斑，故前来就诊。实验室检查：PLT70×109/L。下列药物中不会引起血小板减少的药物是

A: 阿司匹林

B: 氯霉素

C: 碳酸锂

D: 磺胺异噁唑

答案：C

41.能够给予当即解答的就当即解答

A: 及时回答不拖延

B: 保护患者的隐私

C: 特别关注特殊人群

D: 解释的技巧

答案：A

42.缺血性卒中发病应用阿替普酶溶栓的最佳时间是

A: 1小时内

B: 2小时内

C: 6小时内

D: 3小时内

答案：D

43.对中枢神经有抑制作用的是

A: 酒

B: 食盐

C: 食醋

D: 脂肪

答案：A

44.碘解磷定等胆碱酯酶复活剂不能与碱性溶液直接配伍的机制是

A: 碘解磷定等不稳定

B: 碘解磷定等不溶解

C: 碘解磷定等水解生成剧毒的氰化物

D: 碘解磷定等水解

答案：C

45.患者，女，24岁，已婚，因痤疮购药咨询，应告知患者对育龄妇女有严重的致畸作用，药师不应推荐的治疗药物是

A: 过氧化苯甲酰凝胶

B: 红霉素乳膏

C: 异维A酸片

D: 阿达帕林凝胶

答案：C

46.长期使用可降低血小板数量，可引起紫癜的药物是

A: 氟西汀

B: 文拉法辛

C: 卡马西平

D: 阿苯达唑

答案：D

47.开具新药或增加药物前需考虑患者总体情况和药物相互作用，是指

A: 实现个体化治疗

B: 医嘱完整不漏项

C: 修订医嘱及时沟通

D: 医嘱清楚准确

答案：A

48.（2017年真题）缺铁性贫血患者常表现为（）

A: 嗜酸性粒细胞增多

B: 中性粒细胞增多

C: 红细胞增多

D: 血红蛋白减少

答案：D

49.提示"每次用药前检查药品外观有无变化，发现异常立即停用"，是针对

A: 特殊剂型用法

B: 药品有效期

C: 特殊装置药品

D: 药品贮存

答案：D

50.《中国药典》2015年版分为几部

A: 一部

B: 三部

C: 二部

D: 四部

答案：D

51.药师应告知医师"血药浓度监测是提高治疗效果的重要措施"的事例是

A: 地高辛用于肾功不全者须监测血药浓度

B: 替加色罗存在心绞痛

C: 阿昔洛韦致急性肾衰竭

D: 利巴韦林致畸与肿瘤

答案：A

52.患者，男，33岁。中度哮喘急性发作，宜选用的药物是

A: 短效β2受体激动剂

B: β2受体阻断剂

C: 糖皮质激素

D: 白三烯受体阻断剂

答案：A

53.患者，男，52岁，诊断为高血压、冠心病。医师处方：

A: 左旋氨氯地平

B: 氟伐他汀

C: 雷米普利

D: 比索洛尔

答案：B

54.导致妊娠期妇女口服药物吸收减慢，达峰时间滞后，生物利用度下降的主要原因是

A: 妊娠时体液总量和细胞外液都有所增加

B: 妊娠时胃酸分泌减少，胃肠活动减弱

C: 妊娠时胃酸分泌增多，胃肠活动增强

D: 妊娠时雌激素分泌减少，孕激素分泌增多

答案：B

55.医师咨询"他汀类药物合用伊曲康唑或环丙沙星等"，属于

A: 禁忌证

B: 新药信息

C: 药物相互作用

D: 给药途径

答案：C

56.肠外营养1g氮能提供的热量是

A: 7kcal

B: 4kcal

C: 9kcal

D: 3kcal

答案：B

57.口服普萘洛尔用于解救的是（）

A: 硝西泮中毒

B: 氯丙嗪中毒

C: 苯丙胺中毒

D: 瘦肉精中毒

答案：D

58.患者,女,46岁,高血压病史3年,2年前出现关节晨僵、手关节及膝关节疼痛,诊断为类风湿关节炎。半年前症状加重,采用了联合用药方案:患者用药如下:

A: 双氯芬酸钠缓释片

B: 羟氯喹片

C: 甲氨蝶呤片

D: 氨氯地平片

答案：B

59.患者，男，58岁，患有高胆固醇血症，长期服用辛伐他汀40mgqd。患者用药期间应定期监测的生化指标是

A: Hb

B: BUN

C: RBC

D: AIT

答案：D

60.喝茶可降低多价金属离子、生物碱、苷类、胃蛋白酶、四环素类等药物的疗效，其机制主要是它们结合茶中的

A: 咖啡因

B: 茶碱

C: 鞣酸

D: 蛋白质

答案：C

61.患者，男，50岁，高血压病史3年，期间先后使用硝苯地平片和硝苯地平控释片控制血压，近日出差曾饮酒和饮用多种饮料，出现血压搏动情况。

A: 控释片比普通片含剂量高，不易嚼碎服用，不然会导致低血压

B: 控释片一般一日三次给药，与普通片给药次数相同

C: 控释片比普通片起效快，作用时间长

D: 控释片与普通片含量相同，可以固定时间，间替换服用

答案：A

62.吸附力强、可阻止毒物吸收的是

A: 药用炭混悬液

B: 1%硫酸镁溶液

C: 1%氯化钠溶液

D: 淀粉溶液

答案：A

63.洋地黄中毒的特征性表现为

A: 视力模糊

B: 恶心

C：黄视、绿视

D：快速房性心律失常伴传导阻滞

答案：D

64.下歹鼍关于硫脲类抗甲状腺药不良反应的描述，哪一项是错误的

A：咽痛、发热

B：药疹、瘙痒

C：中毒性肝炎

D：粒细胞缺乏

答案：A

65.卡托普利主要通过下列哪项而起抗慢性心功能不全的作用

A：拮抗钙

B：利尿降压

C：抑制血管紧张素转化酶

D：扩张血管

答案：C

66.禁止与单胺氧化酶抑制剂联用的药物不包括

A：三环类药物

B：苯二氮

C：5-HT

D：选择性5-羟色胺再摄取抑制剂

答案：B

67.患者女，6岁，因发热体温38.6℃、头痛、鼻塞、流清涕咳嗽、无痰就诊。实验室检查:白细胞、中性粒细胞计正常。临床诊断为普通感冒。

A: 美洛昔康
B: 双氯芬酸钠
C: 对乙酰氨基酚
D: 尼美舒利
答案：C

68.病毒性肝炎、肝硬化等可引起
A: 尿胆红素检测阳性
B: 尿酸碱度增高
C: 尿蛋白检测阳性
D: 尿酸碱度降低
答案：A

69.（2019年真题）可使乳儿出现易激惹、尖叫、惊厥等神经系统症状，哺乳期妇女不宜选用的药物是
A: 氯霉素
B: 左炔诺孕酮
C: 链霉素
D: 依那普利
答案：B

70.抗慢性阻塞性肺疾病药的用药监护，禁用于急性心肌梗死，并不得与其他黄嘌呤药同时使用的是
A: 多索茶碱
B: 二羟丙茶碱
C: 氨茶碱
D: 色甘氨酸
答案：A

71.服用环孢素不宜同食

A: 高蛋白食物

B: 食醋

C: 咖啡

D: 葡萄柚汁

答案：D

72.向患者发放合理用药宣传材料是

A: 被动方式

B: 质问方式

C: 指令方式

D: 主动方式

答案：D

73.90g/L≤Hb量＜正常参考范围下限可诊断为

A: 中度贫血

B: 基本正常

C: 重度贫血

D: 轻度贫血

答案：D

74.可提示骨骼疾病的是

A: A/G值低于1

B: γ-谷氨酰转移酶升高

C: 血清碱性磷酸酶升高

D: 丙氨酸氨基转移酶升幅很高

答案：C

75.常年性过敏性鼻炎的主要吸入性变应原不包括

A：动物皮毛

B：鱼虾

C：真菌

D：尘埃

答案：B

76.药物相互作用使毒性增加的事例是

A：铁剂联用维生素

B：阿托品联用普萘洛尔

C：山莨菪碱联用哌替啶

D：阿托品联用吗啡

答案：C

77.患者，男，70岁，2周以来出现尿频、夜尿次数明显增多，且尿流变细、间断，排尿踌躇、费力等排尿困难现象，排尿后滴沥、尿不尽，近几天又出现睡眠障碍。

A：压力性尿失禁

B：急迫性尿失禁

C：膀胱炎

D：急性肾盂肾炎

答案：D

78.无治疗指征补钙

A：过度治疗用药

B：非适应证用药

C：盲目联合用药

D: 超适应证用药

答案：A

79.由于心外副作用发生率较高，且不良反应较大，不宜作为治疗心房颤动一线用药的是()

A: 福辛普利

B: 美托洛尔

C: 胺碘酮

D: 地高辛

答案：C

80.急性结膜炎患者禁用的药品是

A: 酞丁安滴眼剂

B: 利福平滴眼剂

C: 硫酸锌滴眼剂

D: 醋酸可的松滴眼剂

答案：C

81.低张力性便秘

A: 羧甲基纤维素钠

B: 比沙可啶

C: 乳果糖

D: 开塞露

答案：D

82.胃食管反流病患者应避免使用的药物是（）

A: 美托洛尔

B: 特拉唑嗪

C：阿仑膦酸钠

D：维生素C

答案：C

83.提高药效、减少人体吸收的是

A：氨基糖苷类

B：阿苯达唑

C：抗忧郁药

D：利尿药

答案：B

84.以下的论述哪项是错误的

A：氢氯噻嗪不可与普萘洛尔合用于治疗高血压

B：硝普钠可用于高血压危象和慢性心功能不全

C：普萘洛尔不可抑制肾素的分泌

D：氢氯噻嗪作为基础降压药可单用于轻度高血压，也可与其他降压药合用，提高疗效，减少不良反应

答案：A

85.（2019年真题）患者，男，73岁，胃溃疡病史2年，半年前出现静止性震颤，搓丸样，运动迟缓，面具脸，慌张步态，该患者应使用的药物是

A：甲基多巴

B：多奈哌齐

C：多巴丝肼（苄丝肼左旋多巴）

D：司来吉兰

答案：C

86.糖皮质激素所致的骨质疏松治疗

A：单独用双膦酸盐

B：钙制剂+维生素D+双膦酸盐

C：长期口服维生素D

D：用甲状旁腺激素

答案：B

87.患者，男，50岁，诊断为高血压、冠心病。医师处方：氨氯地平片10mgpoqd；美托洛尔缓释片47.5mgpoqd；贝那普利片20mgpoqd；阿司匹林肠溶片100mgpoqd；辛伐他汀片40mgpoqd。

A：双嘧达莫片

B：氯吡格雷片

C：对乙酰氨基酚片

D：华法林片

答案：B

88.患者，女，55岁，因反复发作胸骨后疼痛2年，伴反酸、胃灼热、间断积食来诊，食管测压提示食管下括约肌压力小于6mmHg，结合胃镜检查结果，临床诊断为胃食管反流病。医师处方：奥美拉唑20mgqd强化抑酸治疗。

A：避免高脂饮食

B：禁烟戒酒

C：服用NSAIDs止痛

D：控制体重

答案：C

89.婴儿治疗佝偻病时，维生素D的初始口服剂量一般为

A: 400IU（10μg）/d

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：
https://d.book118.com/937036000051010024